

1. 2 北海道資源評価

1. 2. 1 エビ類 (トヤマエビ)

担当者 調査研究部 澤村 正幸

(1) 目的

道南太平洋のエビ類, 特に噴火湾のトヤマエビの生態特性と資源動向に関する調査を行い, 資源管理を実施するための基礎資料を得る。

(2) 経過の概要

ア 漁獲統計調査

エビ類全体の漁獲統計は, 2008 年までは北海道水産現勢, 2009 年以降は漁獲生産高報告を用い, 2010 年については各地区水産技術普及指導所調べに基づいて中央水試が集計した暫定値を使用し, 種類別, 管内別, 年別の漁獲量を集計した (表 1)。

この海域における漁獲の中心となる噴火湾海域 (砂原漁協〜いぶり噴火湾漁協伊達支所) のトヤマエビえびかご漁業について, 漁獲量, 及び渡島管内 (砂原漁協〜長万部漁協) における年間の延出漁隻数と CPUE (1

日 1 隻あたり漁獲量) の経年変化を集計した。漁獲量はエビ類全体と同様に北海道水産現勢, 漁獲生産高報告及び中央水試集計の暫定値を使用し, 漁獲努力量の算出にはえびかご漁業漁獲成績報告書を用いた。また, 参考値として噴火湾沖海域 (えさん漁協榎法華支所〜鹿部漁協および室蘭〜鶴川漁協) の漁獲量も集計した。(表 2, 図 1)

イ 生物測定調査

噴火湾海域におけるトヤマエビかご漁の漁期中 (春期: 3月1日〜4月30日, 秋期: 9月1日〜11月10日) に各月 1 回, 森漁業協同組合から購入した標本について生物調査を実施し, 銘柄別漁獲量と生物測定結果から年齢別漁獲尾数を求めた。なお年齢は 1994〜1998 年の漁獲物測定データを元に作成した年齢-甲長関係から推定した (表 3)。

銘柄別漁獲量と漁獲物の体長組成データが得られて

表 1 道南太平洋海域のエビ類の種類別, 管内別, 年別漁獲量

種名 年/管内	トヤマエビ				ホッコクアカエビ				その他エビ				合計			
	渡島	胆振	日高	計	渡島	胆振	日高	計	渡島	胆振	日高	計	渡島	胆振	日高	計
1985	75	15	33	123	185	116	7	308	4	11	6	21	263	143	46	452
1986	164	19	29	212	172	66	2	241	7	8	4	19	344	93	35	472
1987	126	19	12	158	131	37	4	172	6	7	3	16	263	63	20	346
1988	323	48	3	375	113	47	2	162	12	9	3	24	448	104	8	561
1989	306	37	17	360	63	24	1	88	7	6	2	15	376	67	20	463
1990	798	50	9	857	93	44	2	139	6	5	1	11	897	98	12	1007
1991	504	50	17	572	88	51	2	141	0	5	1	6	592	106	20	718
1992	398	51	36	485	44	30	3	76	2	1	2	5	443	82	40	566
1993	438	47	121	606	46	18	3	67	2	0	12	14	485	66	135	686
1994	168	30	104	302	44	19	1	64	4	1	2	6	216	50	107	373
1995	245	41	69	355	40	18	1	58	5	1	2	8	290	59	72	421
1996	322	43	147	513	60	34	1	95	11	1	3	14	392	78	152	622
1997	312	44	104	460	92	38	1	131	12	0	4	16	416	82	109	608
1998	242	37	60	339	124	28	1	153	39	0	3	43	405	66	64	535
1999	140	17	11	168	138	41	1	180	0.5	0	4	4.5	278	58	15	352
2000	326	17	9	352	62	18	0	81	0.1	0	1.6	1.7	388	35	11	434
2001	122	11	7	140	23	12	0	36	0	0	1.6	1.7	145	23	9	177
2002	279	24	15	318	61	30	0	91	0	0	3.5	3.5	340	55	19	413
2003	171	19	38	228	82	33	0	115	0	0	2.6	2.7	253	52	41	346
2004	262	18	28	308	77	31	0	109	0.2	0	2.4	2.6	340	49	31	420
2005	252	14	35	301	72	29	0	102	0.2	0	3.6	3.8	325	43	39	407
2006	256	31	23	310	75	31	1	108	2.4	0	1.9	4.4	334	62	26	422
2007	125	26	35	185	150	29	1	181	0.6	0	1.1	1.6	276	55	37	368
2008	131	21	14	166	47	14	1	63	0	0	1.1	1.1	178	36	16	230
2009	56	8	13	77	21	25	0	46	0	0	1.3	1.3	77	33	15	125
2010	149	16	9	174	29	27	0	56	0	0	1.4	1.4	178	43	10	232

資料: 北海道水産現勢、漁業生産高報告及び水試速報値。2010年の値は暫定値。

渡島管内は旧恵山町〜長万部町の合計値

表2 噴火湾周辺海域のトヤマエビ漁獲量

(出典:漁業生産高報告、水試集計速報値。漁獲量:トン CPUE:kg/隻)

年	噴火湾海域									噴火湾沖海域					総計				
	渡島管内			胆振管内			計			計	延出漁 隻数	CPUE :全体	春期 CPUE	秋期 CPUE		春期	秋期	その他	計
	春期	秋期	その他	春期	秋期	その他	春期	秋期	その他										
1985	33	33	1	0	0	0	33	33	1	67					1	10	11	23	90
1986	44	113	1	0	1	0	45	114	1	160					6	8	9	23	183
1987	60	47	0	0	0	0	60	47	1	107					8	7	23	38	145
1988	199	101	0	2	1	0	201	102	0	303					36	11	21	68	372
1989	151	138	1	2	3	0	152	141	1	294					23	6	21	49	343
1990	346	415	1	10	14	0	356	429	2	787					19	6	36	61	848
1991	220	248	1	7	7	0	228	255	2	484					41	6	24	70	554
1992	259	100	0	7	5	0	266	105	1	372					39	5	34	78	449
1993	258	145	0	10	3	0	268	148	0	416	4,704	88.5	116.9	61.4	24	11	34	69	485
1994	47	94	0	1	2	0	49	96	0	145	3,414	42.6	34.9	47.8	21	4	28	53	198
1995	94	118	0	2	3	0	96	121	1	218	3,636	59.8	55.0	64.0	36	2	30	68	286
1996	71	219	0	4	6	0	76	225	0	301	4,026	74.8	40.9	103.5	25	6	34	65	366
1997	167	111	0	4	4	0	171	115	0	287	4,265	67.3	84.3	51.7	35	3	31	69	356
1998	95	129	0	3	4	0	97	133	0	230	3,906	58.9	50.2	67.5	21	3	25	48	279
1999	66	59	0	2	1	0	67	60	0	128	3,302	37.9	37.6	38.1	13	2	14	29	157
2000	100	211	0	2	6	0	102	216	0	319	3,661	84.5	56.5	110.2	10	1	13	24	343
2001	33	78	0	1	1	0	34	79	0	113	2,597	42.3	25.1	57.0	9	1	9	19	132
2002	102	158	0	3	2	0	105	160	0	265	3,821	69.4	57.1	81.5	13	2	23	38	303
2003	60	92	1	2	2	0	62	94	1	156	3,395	44.9	36.9	51.8	16	1	18	34	190
2004	65	187	0	2	5	0	67	191	0	259	3,582	70.5	38.3	99.2	5	1	8	14	273
2005	83	146	0	3	1	2	86	146	2	235	3,465	66.1	51.2	79.0	7	2	23	31	266
2006	75	168	0	4	4	0	79	172	0	251	3,327	73.1	46.8	97.8	18	1	17	36	287
2007	29	74	1	1	0	0	30	74	1	104	2,878	36.0	20.8	50.1	16	2	28	46	151
2008	49	74	0	2	0	0	51	75	0	126	2,860	43.2	33.4	53.1	12	1	14	26	152
2009	16	36	0	1	0	0	16	36	0	52	1,700	30.3	20.5	38.1	4	1	7	12	64
2010	39	100	0	2	1	0	41	101	0	142	2,465	56.8	36.8	72.1	4	1	18	23	165

※1999年以降の延出漁隻数とCPUEは渡島管内のみの数字
※噴火湾沖海域はえさん漁協榎法華支所～鹿部漁協および室蘭～鶴川漁協の海域

いる1994年以降について、年齢別資源尾数を求め、VPAを実施した。表3にVPAに使用した各パラメータを示す。最高齢は5歳とし、2010年の各年齢及び各年の5+歳の資源尾数は(1)式、各年の1～4歳の資源尾数は(2)式、各年の4歳以下のFは(3)式に基づいて算出した。

$$N_{a,y} = \frac{C_{a,y}}{1 - e^{-F_{a,y}}} \cdot e^{\frac{M}{2}} \quad (1)$$

$$N_{a,y} = N_{a+1,y+1} \cdot e^M + C_{a,y} \cdot e^{\frac{M}{2}} \quad (2)$$

$$F_{a,y} = -\ln \left(1 - \frac{C_{a,y} \cdot e^{\frac{M}{2}}}{N_{a,y}} \right) \quad (3)$$

ここでaは年齢、yは年、Fは漁獲係数、Cは漁獲尾数、Nは資源尾数、Mは自然死亡係数を表す。最終年の各年齢のFは、2007年以降資源量の減少に伴い漁獲圧が変化したと考えられることから、過去3年の同じ年齢のFの平均に等しいと仮定し、算出した値を計算式に代入したのち、最終年について $F_{4,y} / F_{5,y} = 1$

となるようMicrosoft EXCEL ソルバーを用いた繰り返し計算を行って、収束した値を $F_{5,y}$ として採用した。さらに、各年齢の資源尾数に年齢別平均体重を乗ずることで資源重量を求めた。

再生産の成功率を求めるにあたって産卵数あたりの加入尾数(RPS)を用いた。y-1年の全てのメス個体が




図1 噴火湾海域のトヤマエビ漁獲量とCPUEの推移

(上: 通年, 下: 漁期別)

表3 解析に使用したパラメータと算出方法

項目	値または算出方法	備考
年齢—甲長関係	1歳:20~25mm、2歳26~30mm 3歳:31~35mm、4歳36~40mm 5+歳41mm~	1994~98年の漁獲物データから推定
自然死亡係数M	0.36	田中の方法 寿命7歳として計算
5歳以上のF	4歳のFに等しいと仮定	
現状のF	年別:2007~2009年のFの平均 漁期別:2007~2009年秋漁のFの平均	過去3年のFの平均に等しいと仮定
年齢別抱卵数	2歳:2324粒、3歳:3655粒 4歳:4491粒、5+歳:5991粒	1997年の甲長組成データ及び 1993年の抱卵数計数データから推定

抱卵して y 年の漁期初めにふ化するとし、 y 年級の RPS は 1 歳時における加入尾数を y 年における海域全体の産卵数で除したものとした。各年の産卵数は、表 3 に示した各年齢の 1 尾あたり抱卵数を VPA により算出された年齢別の資源尾数に乗じて算出した。3 歳のメスについては、2 歳の産卵期以前にオスからメスに性転換し抱卵を行う個体と産卵期以後に性転換し抱卵を行わないまま 3 歳の漁期初めを迎える個体が混在しているため、3 歳の資源尾数のうち抱卵メスの割合を 0.06 と推定して産卵数を算出した。4 歳以降は全てメスに性転換するとした。

(3) 得られた結果

ア 漁獲統計調査

道南太平洋のエビ類の全漁獲量は、1990 年の 1,007 トンを最高に、それ以降、増減を繰り返しながら減少傾向を示している。2010 年の海域全体の漁獲量は 232 トンであり、1985 年以降で最も低い値であった 2009 年 (125 トン) の 186% と大きく増加した (表 1)。

各管内の年間漁獲量は、渡島管内 (旧恵山町~長万部町) が最も多く、1985~2009 年の平均で 76%、次いで胆振管内 (14%)、日高管内 (10%) の順である。2010 年も同様に、渡島管内 (77%)、胆振管内 (19%)、日高管内 (5%) の順であった。

種類別では、トヤマエビが最も多く、1985 年以降の平均では 72% を占め、次いでホッコクアカエビ (26%) が多く、その他のエビ (2%) は少ない。

トヤマエビの漁獲量は、1990 年の 857 トンを最高として、その後は変動しながら減少傾向にあり、特に 2007 年以降大きく減少している。2010 年の漁獲量は 174 トンであり、1985 年以降で最も低い値であった 2009 年 (77

トン) の 225% と大きく増加した。

ホッコクアカエビの漁獲量は、1985 年の 308 トンから減少を続け、1995 年には 58 トンまで減少した。その後、増減を繰り返しながら低い値で推移し、2001 年には 36 トンと 1985 年以降で最も低い値となった。2002 年以降はやや増加して 100 トン前後で推移していたが、2008 年以降再び減少している。2010 年の漁獲量は 56 トンであり、2009 年 (46 トン) の 122% であった。

噴火湾海域のトヤマエビ漁獲量は 1988 年以降増加し、1990 年には 1985 年以降で最高の 787 トンとなったが、その後は変動しつつ減少傾向にあり、特に 2007 年以降大きく減少している (表 2, 図 1)。1999 年以降の漁獲量は隔年で増減を繰り返しており、2010 年の漁獲量は 142 トンで、1985 年以降で最低であった 2009 年 (52 トン) の 272% となったが、漁獲量が大きく減少する前の 2006 年までの水準には達していない。漁期別では、春期の銘柄が自主禁漁となった 1999 年以降、ほとんどの年で秋期の漁獲量が春期より多くなっている。2010 年の春期の漁獲量は 41 トン、秋期の漁獲量は 101 トンで、いずれも 2009 年 (春期 16 トン、秋期 36 トン) から大きく増加した。

表 2 及び図 1 に示した漁獲努力量及び CPUE は渡島管内のみの数字である。噴火湾海域のえびかご漁では、漁獲の減少に伴って努力量 (延出漁隻数) も減少する傾向が見られた。1993 年以降の努力量 (延出漁隻数) は、最高が 1993 年の 4,704 隻であり、2006 年まで 3,500 隻前後で推移していたが、漁獲量が減少した 2007 年以降は 3,000 隻を下回る値となっている。2010 年は 2,465 隻であり、過去最低であった 2009 年の 1,700 隻の 145% であった。1993 年以降の CPUE は、通年、春期、秋期共に、全体として漁獲量と同様の動向となっている (表

2, 図1)。2010年のCPUEは通年が56.8kg, 春期が36.8kg, 秋期が72.1kgであり, いずれも過去最低であった2009年(通年:30.3kg, 春期:20.5kg, 秋期:38.1kg)から増加した。

2001~2010年各月の銘柄別漁獲量をえびかご漁業漁獲成績報告書から集計し図2に示した。通年での漁獲量が最も多いのは, 秋期に漁獲される銘柄「小」であり, 2010年は年間漁獲量の38%を占めた。漁期別では, 春期(3~4月)は銘柄「中」が最も多く, 次いで銘柄「大」が多い。なお, 1999年以降, 春期の銘柄「小」は自主禁漁となっている。秋期(9月~11月)は銘柄「小」が最も多く, 次いで銘柄「メス大」が多い。

噴火湾沖海域の漁獲量は1992年に78トンと過去最高を記録した後に減少し, 1999年以降は10~40トンの範囲で増減を繰り返している(表2)。2010年の漁獲量は23トンで, 1985年以降で最も低い値であった2009年の12トンの191%となった。

イ 生物測定調査

漁期中の標本測定結果及び銘柄別漁獲量から求めた2006~2010年の漁期別の甲長組成を図3に示した。春期には甲長25~35mm程度の比較的大型の個体が多く性別ではメスが半数を超え, 秋期には年齢1歳, 甲長20~25mm程度の小型個体为中心となり性別ではオスが大部分を占める。2010年の春期の甲長のモードは, オスが28mm(2009年29mm), 性転換個体が31mm(2009年31mm), メスが32mm(2009年32mm), 秋期の甲長のモードはオスが23mm(2009年23mm), 性転換個体が26mm(2009年27mm), メスが35mm(2009年35mm)で, 2010年の全体的な大きさは春期, 秋期ともに2009年並みであった。

標本測定により得られた甲長および性別の組成から, 表3に示した甲長と年齢の関係を用いて, 噴火湾海域における通年(図4)及び漁期別(図5)の年齢別漁獲尾数の経年変化を求めた。この海域における漁獲物は, ほとんどの年で1歳が年間漁獲尾数の半分以上を占め, 3歳以上の割合は低い。漁期別では, 春期の「小」銘柄個体が自主禁漁となった1999年以降, 春期には1歳の漁獲がほとんどなく, 2~3歳が漁獲の中心となっている。一方, 秋期では1歳が漁獲尾数の大半を占めている。

各年の年齢別漁獲量から計算したVPAの結果を図6に示した。1994年から2006年までの間, 資源重量はおおむね300トンから500トン, 資源尾数はおおむね3,000万尾から5,000万尾の間で増減を繰り返

返していたが, 2007年に資源重量・資源尾数ともに大きく減少した。2010年の資源重量は266トン, 資源尾数は2,230万尾と算出され, いずれも1994年以降で最も低い値であった2009年(181トン, 1,597万尾)から増加したが, 2006年以前の水準には達しなかった。資源は重量・尾数ともに1歳と2歳で半分以上を占め, 4歳以上は少ない。

VPAにより求められた年齢別資源尾数と表3に示した年齢別抱卵数から, 噴火湾海域全体のトヤマエビの産卵数及びRPSの経年変化を求めた(図7)。1994年から2009年までの産卵数は9~64億粒, RPSは33~153尾/万粒の間で年により大きく変動する傾向が見られたが, 2006年以降の年級群については産卵数・RPSともに低い値となっている。産卵数とRPSの間には明確な相関関係は見られなかった。

噴火湾海域のトヤマエビの資源水準について, 1985年から2004年までの20年間の年間漁獲量の平均値を100として各年を標準化し, 100±40の範囲を中水準とし, その上下を高水準, 低水準として資源水準の判断を行った。2010年の漁獲量142トンは水準指数53であり, 低水準にあると判断された(図8)。




図2 2001～2010年各月の噴火湾海域のトヤマエビ銘柄別漁獲量の推移
(2004年以前の「大」銘柄は「メス大」「メス小」を含む)




図3 噴火湾海域におけるトヤマエビ漁獲物の漁期別甲長組成




図4 噴火湾海域におけるトヤマエビの年齢別漁獲尾数の経年変化




図5 噴火湾海域におけるトヤマエビの漁期別・年齢別漁獲尾数




図6 VPAにより算出された噴火湾海域トヤマエビの年齢別資源重量(上)及び資源尾数(下)の推移




図7 噴火湾海域におけるトヤマエビの卵数及びRPSの推移




図8 噴火湾海域におけるトヤマエビの資源水準の推移