



# シネンシス系スターチスの秋の切り花 品質向上と越冬株の上手な管理法

## 主要品種の栽培特性は？




**カナリーダイヤモンド**  
○ボリュームがある  
×6月定植は抽台不安定  
×越冬すると品質低下



**ゴールドダイヤモンド**  
○6月中旬定植でも抽台安定  
×越冬すると越冬率、抽台率、  
収量やや劣る



**キノブラン(標準品種)**  
道内で最も栽培多い  
○6月中旬定植でも抽台安定  
○越冬性が最も優れる



**キノルージュ**  
○7月上旬定植でも抽台安定  
○二番花の収量多い  
×越冬すると枯れる



**スーパービー**  
○ボリュームがある  
×5月中旬定植でも抽台不安定  
×越冬しても抽台しない



## 秋にとれる二番花に向けて遮光処理をしましょう！

5月定植 → 7月下旬～8月上旬採花 (一番花) →

**遮光**  
8月1ヶ月間

→ 9月～10月上旬採花 (二番花)

■ 2L(千本) ■ L(千本) ■ M(千本) ■ S(千本)



## 品質・収益性が向上します

- 2L,Lの二番花切り花本数が約1.3～1.6倍になります
- 粗収入額－直接経費が約5～16万円/10a増えます

## 越冬株は融雪後に地際で刈り込みましょう！

※前年10月にハウス被覆撤去、翌年3月にハウス被覆設置し4月上旬に刈り込んだ場合




刈り込み

刈らないと...



しおれて  
しまいます  
※病気では  
ありません



安定して  
採花できます

北海道立 花・野菜技術センター 研究部 花き科  
〒073-0026 北海道滝川市東滝川735番地  
TEL 0125-28-2800 FAX 0125-28-2299  
e-mail:seika@agri.pref.hokkaido.jp