（6） 優良品種特性一覧

小麦

区分	早晩性	品種名	耐寒性	耐雪性	赤さび病	うどんこ病	赤かび病
秋まき小麦	早生	タクネコムギ	中	やや強	やや弱	中	やや強
秋まき小麦	中生	ホクシン	中	やや強	やや弱	やや強	やや弱
秋まき小麦	中生	ホロシリコムギ	中	やや強	中	やや強	中
秋まき小麦	中生	チホクコムギ	中	やや弱	強	中	やや弱
秋まき小麦	中生	タイセツコムギ	中	中	強	やや強	やや弱
秋まき小麦	中生	きたもえ	中	やや強	やや弱	やや強	中
秋まき小麦	中生	北海 257 号	中	やや強	かなり強	強	中
春まき小麦	中生	ハルユタカ	―	―	やや強	やや強	やや弱
春まき小麦	中生	春よ恋	―	―	やや強	強	中
春まき小麦	中生	はるひので	―	―	中	やや弱	中

大豆

区分	早晩性	品種名	百粒重(g)	低温耐性	臍周辺着色	ｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ	わい化病
大粒白目	中生	トヨムスメ	32.5	中	弱	強	弱
中粒白目	中生	トヨコマチ	30.4	やや強	強	強	弱
中粒白目	中生	トヨホマレ	32.9	強	強	弱	弱
中粒白目	中生	カリユタカ	30.8	中	弱	弱	弱
中粒白目	中生	ユキホマレ	36.2	強	強	強	弱
極大粒白目	晩性	ユウヅル	41.3	弱	―	弱	弱
極大粒白目	中生	ツルムスメ	40.7	中	中	弱	中
中粒褐目	中生	キタムスメ	28.9	強	―	弱	弱
中粒褐目	中生	ハヤヒカリ	32.3	強	―	弱	弱
小粒白目	中生	ユキシズカ	13.2	やや強	強	強	中
小粒白目	中生	スズマル	13.4	やや強	強	弱	中
大粒黒豆	中生	トカチクロ	35.8	中	―	弱	弱
極大粒黒豆	中生	いわいくろ	46.1	やや強	―	弱	やや強
大粒黒豆	晩性	中生光黒	34.9	強	―	弱	弱
大粒青豆	中生	音更大袖	36.9	強	―	弱	弱
大粒青豆	中生	大袖の舞	34.4	中	―	強	弱

ダイズの茎疫病抵抗性は（レース群Ⅰ／レース群Ⅱ）に対する抵抗性。

小豆

区分	早晩性	品種名	百粒重(g)	低温抵抗性	落葉病	茎疫病	萎凋病
普通小豆	中生	エリモショウズ	13.8	中	弱	弱	弱
普通小豆	中生	しゅまり	15.0	弱	強	かなり強	強
普通小豆	中生	きたのおとめ	13.4	中	強	弱	強
普通小豆	早生	サホロショウズ	16.0	中	弱	弱	弱
白小豆	中生	ホッカイシロショウズ	14.2	弱	弱	弱	弱
大納言	中生	アカネダイナゴン	18.4	中	弱	弱	弱
大納言	中生	ほくと大納言	21.8	やや弱	弱	弱	弱
大納言	中生	とよみ大納言	25.9	やや弱	強	弱	強

品種名	縞萎縮病	耐倒伏性	穂発芽性	主要特性
タクネコムギ	やや強	やや弱	中	早生、短稈、耐倒伏性強、外観品質良、アミロ粘度高い
ホクシン	弱	強	中	耐雪性強、赤さび病抵抗性強、耐穂発芽性やや優れる
ホロシリコムギ	中	やや強	中	短強稈、耐倒伏性強、穂重型、多肥密植で増収
チホクコムギ	やや弱	強	やや易	良質、多収
タイセツコムギ	弱	やや強	中	製麺適性良、多収、耐倒伏性・赤かび病やや弱
きたもえ	やや強	強	やや難	縞萎縮病抵抗性
北海 257 号	弱	強	中	製パン適性良、赤さび病・うどん粉病抵抗性」、耐倒伏性
ハルユタカ	―	強	中	短強稈、多収
春よ恋	―	強	中	うどんこ病抵抗性、多収
はるひので	―	強	やや難	赤かび病抵抗性、多収

品種名	茎疫病	耐倒伏性	裂莢性	主要特性
トヨムスメ	強／強	強	易	シストセンチュウおよび黒根病抵抗性、短強茎
トヨコマチ	強／弱	強	易	シストセンチュウ抵抗性強、低温抵抗性強、着色粒発生少
トヨホマレ	―／弱	強	易	安定多収、着色・裂皮少、耐倒伏性強
カリユタカ	弱／弱	強	難	難裂莢性、良質、ダイズ黒根病抵抗性強
ユキホマレ	強／強	強	難	難裂莢性、臍周辺着色抵抗性、シストセンチュウ抵抗性
ユウヅル	強／―	中	易	晩生、やや長茎、良質、多収
ツルムスメ	強／強	強	中	良質、わい化病抵抗性やや強、耐倒伏性強
キタムスメ	弱／弱	中	易	耐冷性強、多収、中茎、褐毛
ハヤヒカリ	―／弱	強	難	耐冷性、多収、難裂莢性、褐毛
ユキシズカ	強／強	強	中	納豆加工用大豆、シストセンチュウ抵抗性
スズマル	強／弱	強	中	耐倒伏性、納豆加工適性良
トカチクロ	弱	中	易	中生種、安定多収、黒大豆（光黒銘柄）
いわいくろ	弱	中	易	極大粒でやや早熟な黒大豆、わい化病抵抗性やや強
中生光黒	強	弱	易	黒大豆（光黒大豆）
音更大袖	弱／弱	中	易	あお豆、良質多収
大袖の舞	強／弱	強	易	あお豆、白目、良質多収、耐倒伏性強、黒根病抵抗性強

品種名	ウイルス病	耐倒伏性	主要特性
エリモショウズ	弱	やや強	良質、多収、耐冷性
しゅまり	弱	やや強	落葉病・茎疫病・萎ちょう病抵抗性強、良質
きたのおとめ	弱	中	落葉病・萎ちょう病抵抗性強
サホロショウズ	中	強	耐冷性強、多収、良質
ホッカイシロショウズ	弱	中	中生の晩、白小豆
アカネダイナゴン	弱	中	中生、極大粒種
ほくと大納言	弱	中	極大粒種、良質
とよみ大納言	弱	中	極大粒種、良質

馬鈴しょ

区分	早晩性	品種名	澱粉価(%)	疫病	塊茎腐敗	軟腐病	青枯病
生食用	早生	男爵いも	16.1	弱	弱	中	弱
生食用	早生	エゾアカリ	16.1	弱	中	やや弱	弱
生食用	早生	とうや	15.6	やや強	弱	ー	やや強
生食用	早生	キタアカリ	17.1	弱	弱	中	弱
生食用	早生	十勝こがね	15.7	弱	ごく弱	ー	弱
生食用	中生	メークイン	15.5	弱	弱	弱	ー
生食用	中生	さやか	15.1	弱	ー	ー	弱
生食用	中生	スタークイン	17.0	弱	弱	ー	ー
生食用	中生	ユキラシャ	15.6	やや弱	やや強	ー	ー
生食用	中晩生	マチルダ	15.1	強	ー	ー	ー
生食用	中生	ベニアカリ	20.0	弱	中	弱	弱
生食用	中晩生	花標津	15.7	ごく強	やや強	ー	弱

品種名	粉状そうか	シスト線虫	そうか病	主要特性
男爵いも	弱	弱	弱	早生、食味良、粉質
エゾアカリ	強	強	ー	多収、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強、黄肉煮くずれ極少
とうや	弱	強	ー	大粒、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強、剥皮褐変･水煮黒変少
キタアカリ	やや弱	強	ー	多収、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強、黄肉水煮黒変無
十勝こがね	弱	強	弱	貯蔵性良、調理適性良、ジャガイモシスト線虫抵抗性強
メークイン	弱	弱	弱	中生、黄肉、粘質
さやか	弱	強	弱	大粒、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
スタークイン	やや強	強	やや強	そうか病抵抗性、ジャガイモシストセンチュ抵抗性強、大粒
ユキラシャ	強	弱	強	そうか病抵抗性、剥皮変色少ない、貯蔵性良
マチルダ	ー	弱	弱	多収、疫病抵抗性強
ベニアカリ	弱	強	ー	中生、高でん粉、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
花標津	弱	強	弱	疫病抵抗性、ジャガイモシストセンチュ抵抗性強