後志支庁(04)

| | | | ; | | < 小棒市 | 樽市 (203)> | | | 1 - 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | ı |
|-------------|----------|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 土壌区名 | 器。 | 簡略分級式 | (ha) 面積 | ———— 農耕地土壌分類第二次条权引版 : 工壌統群名 工壌統名 | 次案改引版 一 土壌統名 | 上 | ————— 北净追二次条分類 —— 小分類名 | 上 | ——— 農耕地土壌分類第二次矽訂版 土壌統群名 | ▼ □ 元 |
| 地目:水田 忍路 | 0 | plra | 6 | 中粗粒強グライ土 | 芝井統 | 14805 | 暗色表層グライ低地土 | 7323 | 細粒質還元型グライ低地土 | 13522 |
| | | 水田計: | 6 | | | | | | | |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 桃内 | M | tg dpi was | 7 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16411 |
| | | 知言十: | 7 | | | | | | | |
| 地目:樹園北 | 1 | | | | | | | | | |
| 畚部 | Ŧ | x tfn | 4 | 砂丘未熟土 | 内灘統 | 02A01 | 暗色表層砂丘未熟土 | 1221 | 腐植質砂丘未熟土 | 05200 |
| 種吉 | - | td gie xas | 64 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質山地褐色森林士 | 24511 |
| 伍助 | ഗ | ie tdgpxfna | 513 | 細粒暗赤色土 | 湯島透 | 11A01 | 暗赤色土 | 6211 | 酸性型暗赤色土 | 21200 |
| 蘭島川 | В | d xi tga | 19 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| | | 樹園地計: | 009 | | | | | | | |
| | | /l/楢木 計· 616 ha | 616 | e C | | | | | | 1 |

小樽市 計: 616 ha

| | | | | | < 島牧村 | 校村 (391) > | ^ (| | | |
|--------------------|----------|-------------|------|---------------------|---------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| | | | (ha) | ———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 久案改訂版 — | | ———— 北海道二次案分類 —— | | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 略号 | 톍略分級式 | 面積 | Π | 土壌統名 | ่ _ | 小分類名 | ่ | 土壌統群名 | 工 |
| 地国:水田 太平 | 0 | ep – | 30 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 二条統 | 12006 | 褐色低地土 | 7112 | 礫質普通褐色低地土 | 16414 |
| | | 水田計: | 30 | | | | | | | |
| 地回: 畑 | | | | | | | | | | |
| | Ψ | xn tf | 10 | 砂丘未熟土 | 内灘統 | 02A01 | 砂丘未熟土 | 1211 | 普通砂丘未熟土 | 02300 |
| 出 | 으 | t fnase | ∞ | 細粒褐色森林土 | 小坂統 | 06A02 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質台地褐色森林土 | 24620 |
| 中の三 三 の 一 | Z | tp dwnse | 93 | 細粒褐色森林土 | 長坂統 | 06A09 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質台地褐色森林土 | 24620 |
| 月越 | - | pn twase | 09 | 細粒褐色森林土 | 小坂統 | 06A02 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3221 | 細粒質湿性褐色森林土 | 24120 |
| 東本目 | Ŧ | t dgp fnse | 7 | 細粒褐色森林土 | 尾猿内統 | 06A06 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質台地褐色森林土 | 24620 |
| 毋衣月 | 눞 | t dpniae ws | 32 | 礫質褐色森林土 | 大瓜統 | 06C18 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 豊沃 | 王 | tdgi pwnase | 25 | 礫質褐色森林土 | 前川統 | 06C19 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 礫質台地褐色森林土 | 24610 |
| 永豊 | N | tse dwa | 6 | 礫質褐色森林土 | 前川統 | 06C19 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質山地褐色森林士 | 24511 |
| 鷹の巣 | တ | twnase | 10 | 細粒灰色台地土 | 喜久田統 | 07A05 | 暗色表層疑似グライ土 | 4121 | 典型腐植質灰色台地土 | 18130 |
| 歌島 | n | t na | 6 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 褐色低地土 | 7113 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 国内 | g | tdgi fna | 14 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16411 |
| | | 畑計: | 281 | | | | | | | |

島牧村 計: 311 ha

< 弄都(III (392) >

| | | | | | < 本色型 | 三世 (382) > | ^ | | | |
|-------|----------|--------------|------|----------------------|---------|------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | (ha) |) ——— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 《案改訂版 — | ` | ———— 北海道二次案分類 — | | —— 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 器品 | 簡略分級式 | 面積 | '' | 土壌統名 | т П | 小分類名 | <u>т</u> П | 土壤統群名 | 工 |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 製工 | | n tdgplfia | ∞ | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 褐色低地土 | 7112 | 礫質普通褐色低地土 | 16414 |
| 米馬 | ¥ | pn fa | တ | 細粒灰色低地土 ,灰褐系 | 諸橋統 | 13D13 | 灰色低地土 | 7214 | 細粒質普通灰色低地土 | 14623 |
| | | 水田計: | 17 | | | | | | | |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 韓岸 | - | n tf | 23 | 砂丘未熟土 | 内灘統 | 02A01 | 砂丘未熟土 | 1211 | 普通砂丘未熟土 | 02300 |
| 北作開 | တ | t dgi pwnase | 64 | 礫質褐色低地土 | 二条統 | 12C06 | 暗色表層褐色低地土 | 7122 | 火山礫質普通非701712質黒ボク土 | 10313 |
| 横澗 | > | tgise gpwna | 33 | 礫質褐色森林土 | 前川統 | 06C19 | 褐色森林士 | 3111 | 礫質山地黄色土 | 23611 |
| 丸山 | ΜY | tgs die xfna | 83 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 火山礫質普通非70171ン質黒ボク土 | 10313 |
| 月越 | ¥ | pn twfs | 101 | 細粒灰色台地土 | 江迎統 | 07A04 | 疑似グライ土 | 4111 | 細粒質普通灰色台地土 | 18222 |
| 政治 | M | tpw | 61 | 細粒グライ 台地士 | 滝川統 | 08A03 | グライ台地士 | 4211 | 細粒質普通灰色台地土 | 18221 |
| 湯別 | В | t fn | 65 | 細粒褐色低地土,斑紋あり | 常万統 | 12D10 | 暗色表層褐色低地土 | 7124 | 細粒質普通褐色低地土 | 16422 |
| | | 知言十: | 430 | | | | | | | |

寿都町 計: 447 ha

10330 18221 08130 16423 16414 08430 16122 16121 16412 14630 14622 08220 <u>₹</u> | | 農耕地土壤分類第三次改訂版一 多腐植質下層低地多湿黒ボク土 淡色普通非アロフェン質黒ボク土 淡色普通非70712質黒ボク土 典型下層台地多温黒ボク土 細粒質普通灰色台地土 細粒質湿性褐色低地土 細粒質湿性褐色低地土 細粒質普通褐色低地土 典型普通多湿黒ボク土 細粒質普通灰色低地土 中粒質普通灰色低地土 表層無機質高位泥炭土 礫質普通褐色低地土 礫質普通褐色低地土 土壌統群名 普通砂丘未熟土 <u>₹</u> | | 7114 7213 4141 4141 7124 7111 7223 2321 7324 北海道二次案分類 褐色森林土性疑似グライ土 褐色森林土性疑似グライ土 ローム質褐色火山性土 ローム質褐色火山性土 暗色表層グライ低地土 無機質表層高位泥炭土 暗色表層灰色低地土 暗色表層褐色低地土 小分類名 褐色低地土 灰色低地土 褐色低地土 褐色低地土 褐色低地土 灰色低地土 < 黒松内町 (393) > 了 | | 12006 13015 03E40 03E40 07A03 07A01 12A01 12A01 12A01 13E17 14A01 16A03 上サックル統 13131 清水沢統 富曽亀統 清水沢統 東滝川統 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統名 小向統 櫟下統 秦 秦 下統 二条統 金田統 外城統 安米統 美唄統 細粒褐色低地土,斑紋なし 細粒褐色低地士, 斑紋なし 礫質褐色低地土, 斑紋なし 中粗粒灰色低地土,灰褐系 細粒褐色低地士, 斑紋なし 礫質褐色低地土,斑紋なし 細粒灰色低地土,灰褐系 灰色低地士, 斑紋なし 土壌統群名 細粒灰色台地土 細粒灰色台地土 細粒強グライナ 淡色黒ボク土 淡色黒ボク土 (ha) 面積 155 212 60 281 684 258 553 211 173 80 170 畑計: 3560 dn tgwfise tgpwfia fe f tna 簡略分級式 tpnse tpwse tpfna f tpwse tpwfnse ра tdgpwse ţ пa tpwse tpwf dwa 器叩 SK SK Sh C SS = 3土壌区名 和曰: 盆 上目名 南作開 黒松内 北作開 西/沢 日井川 田/田 旭野 熱郛 豐幌 口炭 歌藏

黒松内町 計: 3560 ha

< (Manual 1994) >

| | | | | | 影 > | <蘭越町 (394 | (94) > | | | |
|-------|----------|------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| | | | (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 、案改訂版 - | | ———— 北海道二次案分類 — | | —— 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 | [土壌統群名 | 土壌統名 | ⊔ 1 | 小分類名 | П П Т | 土壌統群名 | 口 口 |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 胀 | SA | pa | 136 | 細粒グライ臼地士 | 吉井統 | 08A01 | グライ台地土 | 4211 | 細粒質普通グライ台地土 | 17221 |
| 二国 | λ0 | Ifna | 216 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 対統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 田田 | ΤA | dlf tpnia | 392 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 回回 | T0 | pfn | 1396 | 細粒褐色低地土, 斑紋あり | 屋形統 | 12D09 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質普通灰色低地土 | 14622 |
| 四四 | NA | Ina | 87 | 中粗粒灰色低地土,灰色系 | 豊中統 | 13809 | 灰色低地土 | 7212 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |
| 三和 | MT | p tfn | 114 | 細粒灰色低地土 ,灰褐系 | 緒方統 | 13D14 | 灰色低地土 | 7214 | 細粒質普通灰色低地土 | 14622 |
| 三和南 | MS | lfna | 487 | 中粗粒灰色低地土,灰褐系 | 安来統 | 13E17 | 灰色低地土 | 7213 | 典型表層グライ化灰色低地土 | 14330 |
| 御成 | N | tpa | 112 | 細粒強グライ土 | 西山統 | 14A03 | グライ低地士 | 7313 | 細粒質還元型グライ低地土 | 13521 |
| 大公 | T0 | fna | 226 | 細粒グライ士 | 千年統 | 14D18 | 下層グライ灰色低地土 | 7243 | 細粒質腐植質グライ低地土 | 13320 |
| 大谷南 | 08 | ١٢ | 162 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| | | 水田計 | : 3328 | | | | | | | |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 乗 | I | xfn te | 33 | 砂丘未熟土 | 内灘統 | 02A01 | 砂丘未熟土 | 1211 | 普通砂丘未熟土 | 02300 |
| 魚上川 | ΑУ | tpfse | 329 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質普通灰色台地土 | 18221 |
| 上目名 | KM | tpfse | 398 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質湿性褐色森林土 | 24120 |
| 清水 | SI | tdpwse | 20 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 聞コ | ₹ | tp dgfnise | 279 | 細粒褐色森林土 | 岳辺田統 | 06A10 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 火山礫質普通非アロフェン質黒ボク土 | 10311 |
| 初田 | НА | d tgpwise | 47 | 細粒褐色森林土 | 黒崎統 | 06A11 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質台地褐色森林土 | 24610 |
| | | 畑計: | : 1172 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

蘭越町 計: 4500 ha

<二七二町 (395)>

| | | | | | ļ , | う ユー・ | (000) | | | |
|------|----|-------------|------|---------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | (ha) | ———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 欠案改訂版 — | | ———— 北海道二次案分類 — | | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 器 | 簡略分級式 | 面積 | 77 | 土壌統名 | <u>↓</u> | 小分類名 | <u>т</u> П | 土壌統群名 | <u>т</u> П |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 福井 | 표 | tpfnise | 921 | 細粒褐色森林土 | 吉原統 | 06A05 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3222 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11542 |
| 海口 | ᄋ | p twnse | | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質普通灰色台地土 | 18221 |
| 光光 | 오 | tpwfnse | 700 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 有島 | AR | se tpfn | | 細粒褐色森林土 | 笠山統 | 06A08 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質普通赤色土 | 22222 |
| 世 | Κ | s pne tdgfi | 53 | 礫質褐色森林土 | 豊丘統 | 06C16 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質山地褐色森林土 | 24511 |
| 小花井 | Ā | s tdgpfnie | | 礫質褐色森林土 | 前川統 | 06C19 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 淡色普通非アロフェン質黒ボク土 | 10330 |
| 元町 | MO | f tn | (1 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| 二二 | γ0 | n tdgpfse | 33 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 褐色低地土 | 7113 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 米米 | Ϋ́ | tfise dgpn | 33 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 二条統 | 12006 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| | | /畑計: 3280 | 3280 | | | | | | | |

二七二町 計: 3280 ha

< 直 谷村 (396) >

| | | | | | <真邪村 | 帝村 (396) > | | | | |
|------------|----------|------------|------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------|---------------|--------|
| | | | (ha) |) ———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 、案改訂版 — | | ———— 北海道二次案分類 —— | | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 器号 | 簡略分級式 | 面積 | 事 土壌統群名 | 土壌統名 | 디 I 노 | 小分類名 | 工 | 土壌統群名 | П П |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 出雲東 | <u>×</u> | p tn | 284 | 細粒褐色低地土, 斑紋なし | 櫟下統 | 12A01 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質腐植質灰色低地土 | 14222 |
| 岩尾別東 | ш | pfn | 153 | 細粒灰色低地土,灰色系 | 鴫島統 | 13A05 | 灰色低地土 | 7213 | 細粒質普通灰色低地土 | 14622 |
| 扶桑 | ¥ | tpn | 29 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 久世田統 | 13C10 | 灰色低地土 | 7214 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| | | 水田計: | 496 | | | | | | | |
| 地回: 畑 | | | | | | | | | | |
| 比羅夫 | 王 | f t | 110 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 豊岡北 | N L | f tse | 423 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 三二 | 10 | f tn | 910 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11542 |
| 西ノ原 | Z | tfse | 740 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | ローム質褐色火山性土 | 2322 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 福井 | ᇤ | tpfnise | 18 | 細粒褐色森林土 | 吉原統 | 06A05 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3222 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11542 |
| 光西 | ΜH | fgpne | 141 | 中粗粒褐色森林土 | 萱場統 | 06B13 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 米 | ¥ | f ts | 203 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11632 |
| 軍人 | 99 | tdfns pie | 23 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11632 |
| 二十二 | γO | n tdgpfse | 16 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 褐色低地土 | 7113 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 社東 | SE | t dgfise | 217 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 礫質普通黒ボク土 | 11611 |
| 壮 栄 | KY | tfise dgpn | 13 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 二条統 | 12C06 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| | | ・ 十章 田小 | 2814 | | | | | | | |

畑計: 2814 真狩村 計: 3310 ha <留寿都村 (397)>

| | | | | | | < 單寿都柯 (39 | (397) > | | | |
|-------|-----|---------|----------|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | (ha) | ———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 7案改訂版 — | | ———— 北海道二次案分類 — | | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | .版 |
| 土壌区名 | 器 | 簡略分級式 | 回 | 土壌統群名 | 土壌統名 | <u>₹</u> | 小分類名 | <u>₹</u> | 土壤統群名 | 미 I 간 |
| 地目: 盆 | | | | | | | | | | |
| 岩路 | 오 | f tse | 9 | 表層多腐植質黒ボク土 | 藤沢統 | 03C10 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 八ケ原 | >- | f tnse | 129 | 表層多腐植質黒ボク土 | 藤沢統 | 03C10 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 泉川 | _ | f tdnse | 51 | 表層多腐植質黒ボク土 | 藤沢統 | 03C10 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 豐岡北 | TON | fse t | 110 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | ローム質黒色火山性土 | 2421 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 国 | 으 | f tn | 627 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 西/原 | Z | tse | 286 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | 口一厶質褐色火山性土 | 2322 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 出出 | × | f tnse | 281 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | ローム質褐色火山性土 | 2322 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 旭野 | AS | fse t | 29 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | 口一厶質褐色火山性土 | 2321 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 山口 | M | fn tse | 307 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | 口一厶質褐色火山性土 | 2321 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 如 | NO | f tdnse | 93 | 礫質褐色森林土 | 泉南統 | 06C20 | 火山灰表層酸性褐色森林土 | 3231 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 登延頃 | NOE | ftxna | 72 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 对統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| | | 一一一 | 烟計: 2730 | | | | | | | |

留寿都村 計: 2730 ha

| | | | | | 神 | < 喜茂別町(3 | (388) > | | | |
|-------|-----|-----------|--------|---------------|---------|-------------|-----------------|--------|---------------|------------|
| | | | (ha) | | 《案改訂版 — | | ———— 北海道二次案分類 — | | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | I |
| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 | 主類統群名 | 土壌統名 | ⊔ ፲ | 小分類名 | П П | 土壌統群名 | 厂 |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 伏見西 | FUW | tfn | 35 | 中粗粒褐色森林土 | 萱場統 | 06B13 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| 御園 | SIW | tdIf | 187 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 対統 | 12B03 | 褐色低地土 | 7113 | 礫質下層低地黒ボク土 | 11311 |
| 伏見東 | FUE | f tdn | 66 | 灰色低地土,斑紋なし | 登戸統 | 13133 | 灰色低地土 | 7213 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| | | 水田計 | : 321 | | | | | | | Ţ |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 田産 | ~ | f tdnse | 108 | 表層多腐植質黒ボク土 | 藤沢統 | 03C10 | ローム質黒色火山性土 | 2421 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11631 |
| 泉川 | _ | f tdnse | 71 | 表層多腐植質黒ボク土 | 藤沢統 | 03C10 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 知来別 | F | fse tn | 99 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | ローム質褐色火山性土 | 2321 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 花面 | HA | tfnse | 24 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | ローム質褐色火山性土 | 2321 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11542 |
| 比羅冏 | 豆 | f tdse | 180 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 瓦谷統 | 04405 | 湿性厚層黑色火山性土 | 2713 | 多腐植質厚層多湿黒ボク土 | 08320 |
| 伏見 | 급 | td | 69 | 細粒褐色森林土 | 吉原統 | 06A05 | 褐色森林土 | 3111 | 細粒質湿性褐色森林土 | 24120 |
| 御園北 | NIW | se tgf | 6 | 礫質褐色森林土 | 泉南統 | 06C20 | 褐色森林土 | 3111 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 相川 | Α | tpwfn | 31 | 細粒褐色低地土,斑紋なし | 櫟下統 | 12A01 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質普通褐色低地土 | 16422 |
| 伏見南 | FUS | tdfi | 148 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 細粒質腐植質褐色低地土 | 16220 |
| 登延頃 | NOE | f txna | 6 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 双葉西 | БТW | x d tgf | 147 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 対統 | 12B03 | 褐色低地土 | 7113 | 礫質淡色黒ボク土 | 11410 |
| 中軍 | NA | tpwf | 87 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 南京極 | W | x di tfn | 141 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 暗色表層褐色低地土 | 7122 | 礫質普通灰色低地土 | 14612 |
| 双葉 | ᇤ | x d tgfni | 219 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| | | : 出計: | : 1309 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

喜茂別町 計: 1630 ha

| | | 고 기 | Ī | 11530 | 11632 | 11632 | 11632 | 11642 | 06333 | 06333 | 11632 | 11642 | 11632 | 16430 | 14612 | Ī |
|-------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|
| | 農耕地土壤分類第三次改訂版 | 土壌統群名 | | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 多腐植質普通黒ボク土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 腐植質普通黒ボク土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 腐植質普通黒ボク土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 中粒質普通褐色低地土 | 礫質普通灰色低地土 | |
| | | Ц Т | | 2611 | 2612 | 2441 | 2441 | 2441 | 2131 | 2131 | 2331 | 2331 | 2331 | 7113 | 7221 | |
| ^ | ———— 北海道二次案分類 —— | 小分類名 | | 厚層黒色火山性土 | 厚層黒色火山性土 | 積層ローム質黒色火山性土 | 積層ローム質黒色火山性土 | 積層ローム質黒色火山性土 | 下層台地未熟火山性土 | 下層台地未熟火山性土 | 積層軽しょう褐色火山性土 | 積層軽しょう褐色火山性士 | 積層軽しょう褐色火山性土 | 褐色低地土 | 暗色表層灰色低地土 | |
| | | Ц Т | | 03A01 | 03A01 | 03C10 | 03C10 | 03C10 | 03C12 | 03C12 | 03C19 | 03C19 | 03C19 | 12006 | 13F22 | |
| < 炉極町 | 次案改訂版 — | 土壌統名 | | 知 谷統 | 知 谷統 | 藤沢統 | 藤沢統 | 藤沢統 | 加久藤統 | 加久藤統 | 七本桜統 | 七本桜統 | 七本桜統 | 二条統 | 栢山統 | |
| | 農耕地土壤分類第二次案改訂版 | 土壌統群名 | | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 表層多腐植質黒ボク土 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 礫質灰色低地土,灰褐系 | |
| | (ha) | 面積 | | 326 | 184 | 103 | 631 | 80 | 103 | 92 | 241 | 207 | 161 | 241 | 161 | 2560 |
| | | 簡略分級式 | | fn dxi | f txnse | fn x | fe txns | fn tx | df tgxnie | fnd tgwise | fs txne | fn tgxse | fns txe | dfni tx | di txfn | (知言) |
| | | 略号 | | ¥ | NI -3 | 9-IN | NI -1 | 0-2 | KC-1 | KC-2 | NI -4 | 0-1 | NI-2 | Ϋ́ | ≥ | |
| | | 土壌区名 | 地目:畑 | 三田 | 錦一3 | 錦一 5 | 錦一 1 | 大富-2 | 川西中央-1 | 川西中央-2 | 錦一 4 | 大富-1 | 錦一 2 | 春日 | 南京極 | |

京極町 計: 2560 ha

| | | | | | < 俱 | < 倶知安町(40 | (400) > | | | |
|-------|----------|--------|------------|---|------------------|---------------|-------------------------|----------|----------------------------|-------|
| 土壌区名 | 器 | 簡略分級式 | (ha) 面積 |) ———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版 責 土壌統群名 土壌統名 | 欠案改訂版 —— 土壤統名 | <u>Т</u> П | ———— 北海道二次案分類 — 小分類名 | <u>1</u> | ——— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壤統群名 | 表 |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 富士見 | IJ | f pn | 309 | 中粗粒褐色森林土 | 萱場統 | 06B13 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3222 | 多腐植質普通多湿黒ボク土 | 08420 |
| 出雲東 | <u>×</u> | p tn | 348 | 細粒褐色低地士,斑紋なし | 櫟下統 | 12A01 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質腐植質灰色低地土 | 14222 |
| 八幡兩 | ٨S | tlf | 227 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 褐色低地土 | 7112 | 粗粒質普通褐色低地土 | 16442 |
| 豐岡西 | 믣 | fn | 114 | 礫質褐色低地士, 斑紋なし | 二条統 | 12006 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| 八幡東部 | YE | di tIn | 112 | 礫質褐色低地土,斑紋あり | 井尻野統 | 12F17 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通灰色低地土 | 14612 |
| 岩尾別東 | ш | pfn | 191 | 細粒灰色低地土,灰色系 | 鴨島統 | 13A05 | 灰色低地土 | 7213 | 細粒質普通灰色低地土 | 14622 |
| 扶桑 | FK | tpn | 229 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 久世田統 | 13C10 | 灰色低地土 | 7214 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| 出調 | 71 | tln | 392 | 細粒灰色低地土,灰褐系 | 金田統 | 13D15 | 暗色表層灰色低地土 | 7223 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| 寒別 | ¥ | tpfn | 74 | 細粒灰色低地土,灰褐系 | 金田統 | 13D15 | 灰色低地土 | 7213 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| 八幡 | ΥН | dprn | 174 | 礫質強グライ土 | 蛭子統 | 14C11 | グライ低地土 | 7313 | 礫質還元型グライ低地土 | 13515 |
| 寒別北 | ¥ | ftpn | 74 | 細粒グライ 士 | 浅津統 | 14D19 | 下層グライ灰色低地土 | 7243 | 典型下層低地多湿黒ボク土 | 08230 |
| 八幡北 | ΥN | tprfn | 53 | グライ土,下層有機質 | 米里統 | 14G28 | 下層泥炭グライ低地土 | 7344 | 細粒質泥炭質グライ低地土 | 13212 |
| | | 水田計 | 水田計: 2297 | | | | | | | |

| | | 水田計: 229/ | 1677 : | | | | | | | |
|-------|------|-----------|----------|---------------|------|-------|-------------|------|-----------------|-------|
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 琴平-2 | K0-2 | f tn | 26 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 加谷統 | 03A01 | 厚層黑色火山性土 | 2612 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 比羅夫 | 豆 | ft | 205 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 琴平一 1 | K0-1 | f t | 765 | 表層腐植質黒ボク土 | 米神統 | 03D27 | 口一厶質黑色火山性土 | 2421 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 田一 | ΥA | tpwfnse | 137 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | ローム質褐色火山性土 | 2321 | 腐植質普通非和JIン質黒ボク土 | 10350 |
| 旭 | AS | fs tpe | 282 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | 口一厶質褐色火山性土 | 2321 | 淡色普通非アロフェン質黒ボク土 | 10330 |
| 末広 | S | tpfn | 30 | 淡色黒ボク土 | 清水沢統 | 03E40 | 口一厶質褐色火山性土 | 2321 | 淡色普通非アロフェン質黒ボク土 | 10330 |
| 六号 | RO | f twn | 23 | 細粒褐色森林土 | 吉原統 | 06A05 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3222 | 腐植質普通非加フェン質黒ボク土 | 10350 |
| 第台 | ᄋ | p twnse | 22 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質普通灰色台地土 | 18221 |
| 中世 | Κ | f tpnse | 78 | 中粗粒褐色森林土 | 東谷統 | 06B14 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3221 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 器 | TA | f tdnse | 225 | 礫質褐色森林土 | 杉谷統 | 06C22 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3221 | 礫質普通黒ボク土 | 11611 |
| 瑞穂 | W | tf wn | 113 | 細粒灰色台地土 | 東滝川統 | 07A01 | 暗色表層疑似グライ土 | 4121 | 多腐植質普通多湿黒ボク土 | 08420 |
| 豐岡南 | TS | f tdn | 111 | 礫質灰色台地土 | 塩田統 | 07C12 | 暗色表層疑似グライ土 | 4121 | 礫質普通黒ボク土 | 11612 |
| 岩尾別 | M | fi tgse | 30 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 暗色表層褐色低地土 | 7122 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 瑞穗北 | W | df tia | 46 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 礫質下層低地黒ボク土 | 11313 |
| 比羅夫東 | 뽀 | f tdnise | 197 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 二条統 | 12006 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 礫質淡色黒ボク土 | 11410 |
| | | 畑計 | 畑計: 2323 | | | | | | | |

俱知安町 計: 4620 ha

一 農耕地土壌分類第三次改訂版 一 土壌統群名 エ | | - 北海道二次案分類 --小分類名

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)>

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)

 (401)
 (ha) 面積 簡略分級式 器 土壌区名

<u>Т</u> П

| 5台土 18212 | 5黒ボク土 11220 | 3森林士 24610 | 11320 11320 | 22 に 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 3地十 18100 | 5低地土 14613 | 7色低地土 14623 | 3低地土 14615 | 3低地土 14612 | 7色低地士 14640 | 中粒質還元型グライ低地土 13530 | ブライ低地土 13513 | ブライ低地士 13512 | 細粒質グライ化灰色低地土 14412 | 22 にまずり土 08430 | 細粒質泥炭質グライ低地土 13212 | E位泥炭土 02310 | f位泥炭土 02310 | |
|--------------|-------------|------------|--------------|---|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 礫質普通灰色台土 | 淡色下層台地黒ボク土 | 礫質台地褐色森林土 | 礫質下層低地黒ボク土 | 典型普通多湿黒ボク土 | 腐植質灰色台地土 | 礫質普通灰色低地土 | 細粒質普通灰色低地土 | 礫質普通灰色低地土 | 礫質普通灰色低地土 | 粗粒質普通灰色低地土 | 中粒質還元型 | 礫質還元型グライ低地土 | 礫質還元型グライ低地土 | 細粒質グライ | 典型普通多湿黒ボク土 | 細粒質泥炭質 | 表層無機質低位泥炭 | 表層無機質低位泥炭土 | |
| 3111 | 3211 | 3211 | 7114 | 7214 | 4121 | 7213 | 7213 | 7212 | 7211 | 7222 | 7313 | 7323 | 7312 | 7244 | 7244 | 7344 | 8121 | 8121 | |
| 褐色森林土 | 酸性褐色森林土 | 酸性褐色森林土 | 褐色低地土 | 灰色低地土 | 暗色表層疑似グライ土 | 灰色低地土 | 灰色低地土 | 灰色低地土 | 灰色低地土 | 暗色表層灰色低地土 | グライ低地士 | 暗色表層グライ低地土 | グライ低地士 | 下層グライ灰色低地土 | 下層グライ灰色低地土 | 下層泥炭グライ低地土 | 無機質表層低位泥炭土 | 無機質表層低位泥炭土 | |
| 06A10 | 06A10 | 06A11 | 12A01 | 13A01 | 07A01 | 13A05 | 13406 | 13C11 | 13C11 | 13134 | 14A03 | 14A03 | 14B07 | 14D15 | 14D15 | 14628 | 16A01 | 16A05 | |
| 岳辺田統 | 岳辺田統 | 黒崎統 | 櫟下統 | 東和統 | 東滝川統 | 鴨島統 | 宝田統 | 追子野木統 | 追子野木統 | 姫島統 | 西山統 | 西山統 | 琴浜統 | 保倉統 | 保倉統 | 米里統 | 長富統 | 谷中統 | |
| 細粒褐色森林土 | 細粒褐色森林土 | 細粒褐色森林土 | 細粒褐色低地土,斑紋なし | 細粒灰色低地土 ,灰色系 | 細粒灰色台地土 | 細粒灰色低地土,灰色系 | 細粒灰色低地土 ,灰色系 | 礫質灰色低地士, 灰色系 | 礫質灰色低地土, 灰色系 | 灰色低地土,斑紋なし | 細粒強グライ土 | 細粒強グライ土 | 中粗粒強グライ土 | 細粒グライ士 | 細粒グライ土 | グライ土, 下層有機質 | 泥炭土 | 泥炭土 | |
| 726 | 300 | 78 | 26 | 34 | 33 | 33 | 165 | 35 | 78 | 34 | 34 | 73 | 19 | 28 | 28 | 233 | 591 | 286 | .: 2977 |
| p tfn | p tIfn | tplf | p tIn | p fn | tplfn | tpf | ip – | l tdfni | l tdi | d Ifi tpn | | l trn | d Ifi tpn | tp | prfn | pi rfn | lf tprn | pf trn | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ₹ | HA-1 | HA-2 | H-2 | SH | | NS | - | 0S-2 | 0S-1 | WK-2 | M-2 | M-1 | WK-1 | W | H-1 | WA | SR | 0 | |
| 地目:水田 起業社 | 発足-1 | 発足-2 | 堀株一2 | 下堀株 | ヤチナイ東 | 下ワクンベツ | 辰五郎沢 | 大沢-2 | 大沢ー1 | 南ワクンバツ-2 | 水松沢一2 | 水松沢一1 | 南りか、ツ-1 | 御手作場 | 堀株一1 | ワラビタイ | 下リヤムナイ | 大谷地 | |

| | 107 : IHH: | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------|---------------|------|-------|-------------|------|-----------------|-------|
| 地目:畑 | | | | | | | | | |
| 浜 田 田 田 | x c tpf | 116 | 砂丘未熟土 | 内灘統 | 02A01 | 砂丘未熟土 | 1211 | 普通砂丘未熟土 | 02300 |
| 浜中東 胎 | xne tpf | 29 | 砂丘未熟土 | 内灘統 | 02A01 | 砂丘未熟土 | 1211 | 普通砂丘未熟土 | 02300 |
| 幌似 HO | e tfns | 174 | 細粒褐色森林土 | 小坂統 | 06A02 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質山地黄色土 | 23621 |
| ロケンベシ w | w p te | 6 | 細粒褐色森林土 | 小坂統 | 06A02 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質普通赤色土 | 22221 |
| | tn fs | 82 | 細粒褐色森林士 | 小坂統 | 06A02 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質台地黄色土 | 23721 |
| 中/川 NA | tgfnse | 33 | 細粒褐色森林土 | 岳辺田統 | 06A10 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質ばんど質黄色土 | 23220 |
| 前田一1 MA-1 | 1 tpwfnse | 926 | 細粒褐色森林土 | 岳辺田統 | 06A10 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質ばんど質黄色土 | 23220 |
| 前田-2 MA-2 | | 136 | 細粒褐色森林士 | 岳辺田統 | 06A10 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質ばんど質黄色土 | 23220 |
| ビシャムナイ VI | tpfns | 48 | 細粒褐色森林土 | 岳辺田統 | 06A10 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| リヤムナイ東 RIE | | 145 | 中粗粒褐色森林土 | 萱場統 | 06B13 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 淡色普通非7071ン質黒ボク土 | 10330 |
| リヤムナイ西 RIW | x tfnse | 33 | 中粗粒褐色森林土 | 萱場統 | 06B13 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3222 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| ヤチナイー2 YA-2 | | 78 | 中粗粒褐色森林土 | 東谷統 | 06B14 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 淡色普通非7071ン質黒ボク土 | 10330 |
| 中ビラ NB | f tn | 78 | 中粗粒褐色森林土 | 東谷統 | 06B14 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 小 X | se tf | 26 | 礫質褐色森林土 | 豊丘統 | 06C16 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質山地褐色森林土 | 24511 |
| ヤチナイー1 YA-1 | 1 px tdgfnis | 223 | 礫質褐色森林土 | 岩屋統 | 06C21 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 淡色普通非7071ン質黒ボク土 | 10330 |
| 旧発足 KH | pse tgfn | 24 | 細粒暗赤色土 | 湯島透 | 11401 | 暗赤色土 | 6211 | 細粒質普通赤色土 | 22221 |
| シマツケナイ S | dgxi t pfn | 19 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| リヤムナイ RI | tdgp fni | 93 | 中粗粒褐色低地土,斑紋あり | 荻野統 | 12E12 | 褐色低地土 | 7113 | 礫質普通褐色低地土 | 16414 |
| | 畑計 | 畑計: 2443 | | | | | | | |

共和町 計: 5420 ha

| 土壌区名 路山 地目: 水田 M 島野 S 地目: 協助 K 古老古業 NO 領山 T | ; | (Ila) 国積 | 展析也上,埃刀賴第一人來LX引放 土壌統群名 土壌統名 | A来tx記版 土壌統名 | <u>т</u> П | 45.44.61.44.77.45.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74. | ا آ | 底杯也工装刀点光二人txin以 十類統群允 | ا آ |
|---|--|---|---|------------------|---------------|--|---------------|---|-----------------|
| | | | | | | 小ガ湖石 | | I | _ |
| | <u>.</u> | ٢ | 中間 對话 多 石 本 十一 斑 分 4 2 1 | \$7 | 0000 | 拉名 丰厨馆 各 丘 州 十 | 77.00 | 一种四种 医二种甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲 | 7070 |
| | | - 49 | 中有社物の記点上、対談なりの単質場の用土、財役をこ | A続 井尻野統 | 12E03 | 1000分割物田11275日 1880年 188 | 7111 | 计位置自由检查记记 降管部涌移在压扰十 | 16430 |
| | - D | 71 | | | i | | | | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | txfne | 13 | 中粗粒褐色森林土 | 萱場統 | 06B13 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| | tdgpi xfnase | 180 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| | t dgise xfna | 101 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 火山礫質普通非アロフェン質黒ボク土 | 10313 |
| | | 6 | 細粒灰色台地土 | 喜久田統 | 07A05 | 褐色森林土性疑似グライ土 | 4141 | 細粒質普通灰色台地土 | 18221 |
| | t dgi pwnase | 78 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 火山礫質普通非アロフェン質黒ボク土 | 10313 |
| | æ | 13 | 細粒褐色低地土,斑紋あり | 常万統 | 12D10 | 褐色低地土 | 7113 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| | 出計: | 394 | | | | | | | |
| | 岩内町 計: | 465 ha | ia | | | | | | |
| | | | | 女供 > | 时 (403) > | | | | |
| | | (ha) | 農耕地土壌分類第一 | 5多沙兰形 — | | | | 農耕地十壤分類第二次改訂版 | |
| 土壌区名 略号 | , | 面積 | 成新语士或20.6635—// 水光知 M 土壌統群名 | A 大壌統名 | <u>т</u> П | 4545年——次宋2554 小分類名 | <u>1</u> ∏ | 伝統でするとなる。一次に記述 土壌統群名 | <u>т</u> П |
| | tdn se | ======================================= | 中粗粒褐色森林十 | 曹場統 | 06B13 | 暗色表層酸性褐色森林十 | 3222 | 典型ばん十質褐色森林十 | 24230 |
| | - - | ď | 1. 数码记句 木林十 | 九六纮 | 06015 | 形件。20年本本十 | 2212 | 場的人は記名水林十 | 24640 |
| | upilise Xise duix | | 张冥 阎 D 然你一个个人一个女人的一个女人的一个女人 | T 手 下 祭 | 06015 | 数计多几条统计数计编码线数计 | 3211 | 探写古名词巴林怀古陶图二古名的大林十 | 24511 |
| | 20 - C - C - C - C - C - C - C - C - C - | 1 0 | 孫太弘门終年十分最后的本人十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | お二様 | 0.000 | 以下にはなった。一般をおけれています。 | 25.00 | 系以且为这位条件,并由是是1、十段指令长士十 | 200 |
| | _ | 0 4 | 梁 写 物 引 林 本 十 編 府 祖 女 米 井 十 | 門川税上面祭 | 61700 | 段许匈巴林个人杂集士曾十 | 3212 | まは1464年一種を引き作りませる。 かんしょ おいきゅうしょ しんきん オナイ | 24230 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ž. | 0 < | 紫冥陶巴林个山城的过去分词 | 小河路 | 12516 | 线侧不然二 蓝布 丰丽望色 併 址 十 | 71.7 | 架具山场狗巴林个山心,是每时间的一个一个 | 40212 |
| | · 十年四年 | 4 6 | - | / \ I W | 121 10 | 19日秋 1918日 | 1717 | 人山味貝目四半パルス具系がイエ | 2001 |
| | . 🛮 🖽 K | 35 | | | | | | | |
| | 泊村 計: | 32 | ha | | | | | | |
| | | | | | < 神恵内村(4 | (404) > | | | |
| 土壌区名略号 | 育略分級式 | (ha) 面積 | | 欠案改訂版 — 土壌統名 | П П | | <u>1</u> ∏ | ——— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壌統群名 | |
| 地目: 水田 | | | | | | | | | |
| 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 | dli tna | _ | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| | 水田計: | | | | | | | | |
| 池目:畑 | | | | | | | | | |
| | t p wnase | _ | 細粒褐色森林土 | 尾猿内統 | 06A06 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質台地褐色森林土 | 24620 |
| 駒吉沢 K | dni tgwfase | _ | 礫質褐色森林土 | 豊丘統 | 06C16 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 火山礫質普通非アロフェン質黒ボク土 | 10311 |
| | t dgni pwase | 7 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質台地褐色森林土 | 24610 |

| (ha) (405) > (株) (ha) 土壌統群名 土壌統者 コード 小 面積 土壌統群名 コード 小 63 中粗粒褐色低地土,斑紋なし 外城統 12007 褐色低地 53 機質褐色低地土,斑紋なし 外城統 12007 褐色低地 116 細粒褐色森林土 寺の尾統 06A09 酸性褐色 204 細粒褐色森林土 長坂統 06A09 酸性褐色 20 機質褐色低地土,斑紋なし 二条統 12006 暗色表層 20 機質褐色低地土,斑紋なし 二条統 12007 暗色表層 189 機質褐色低地土,斑紋なし 外城統 12007 暗色表層 79 機質灰色低地土,灰褐系 松本統 13F21 灰色低地 | 海湯 Y 赤石 A | | dpni tgwa t dni gase 加計: | ← ∞ ∞ | 礫質褐色低地土, 斑紋なし 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 海沢統 二条統 | 12C05 12C06 | 褐色低地土 暗色表層褐色低地土 | 7113 | 礫質普通褐色低地土 非火山礫質普通非加フェン質黒ボク土 | 16413 10320 |
|--|--------------|----|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| 略号 簡略分級式 (ha) 一種耕地土壌分類第二次案改訂版 一人 S In 63 中粗粒褐色低地土,斑紋なし が焼 12804 褐色低地 B di tln 53 礫質褐色低地土,斑紋なし 外域統 1207 褐色低地 T t pn wf 141 細粒褐色森林土 寺の尾統 06A05 酸性褐色3 F t pn wfiase 204 細粒褐色森林土 貴板統 06A05 酸性褐色3 N t dgfniase 20 礫質褐色低地土,斑紋なし 二条統 1200 暗色表層 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土,斑紋なし 1207 暗色表層 K t dni wa 79 礫質板色低地土,灰褐系 松本統 13F21 灰色低地 (6 t dni wa 79 礫質及色低地土,灰褐系 水本統 13F21 灰色低地 | | | | <u></u> თ | ha | |] [1] [405] | ٨ | | | |
| S In 63 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし 飯島統 12804 B di tln 53 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 1207 T t pnse dwia 461 細粒褐色森林土 寺の尾統 06A04 F t pn wf iase 204 細粒褐色森林土 青原統 06A05 N t pn wfiase 204 細粒褐色森林土 長坂統 06A09 N t dgfniase 20 礫質褐色低地土, 斑紋なし 二条統 12C06 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 12C07 G t dni wa 79 礫質板色低地土, 灰褐系 松本統 13F21 | | 如 | 簡略分級式 | (ha) 面積 | | 、案改訂版 —— 土壌統名 | Σ Σ Π | | 1 I | —— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壌統群名 | <u>1</u> |
| S In 63 中粗粒褐色低地土,斑紋なし 飯島統 12804 B di tIn 53 礫質褐色低地土,斑紋なし 外城統 1207 T t pnse dwia 461 細粒褐色森林土 寺の尾統 06A04 F t pn wf 141 細粒褐色森林土 吉原統 06A05 H t n dgwiase 204 細粒褐色森林土 長坂統 06A06 N t dgfniase 60 礫質褐色低地土,斑紋なし 二条統 12C06 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土,斑紋なし 外城統 12C07 G t dni wa 79 礫質灰色低地土,灰褐系 松本統 13F21 | 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| B di tIn 53 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 12007 T t pnse dwia 461 細粒褐色森林土 吉原統 06A04 F t pn wf 141 細粒褐色森林土 吉原統 06A09 H t n dgwiase 204 細粒褐色森林土 豊丘統 06A09 N t dgfniase 60 礫質褐色栎林土, 斑紋なし 二条統 12006 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 12007 G t dni wa 79 礫質灰色低地土, 灰褐系 松本統 13F21 | | ,, | 므 | 63 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 褐色低地土 | 7113 | 粗粒質普通褐色低地土 | 16442 |
| T t pnse dwia 461 細粒褐色森林土 寺の尾統 06A04 F t pn wfiase 204 細粒褐色森林土 長坂統 06A09 H t n dgwiase 20 礫質褐色森林土 豊丘統 06A09 N t dgfniase 60 礫質褐色低地土,斑紋なし 二条統 12C06 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土,斑紋なし 外城統 12C07 G t dni wa 79 礫質灰色低地土,灰褐系 松本統 13F21 | | ~- | | 53 | | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| T t pnse dwia dwia dwia dwia dwia dwia dwia dwia | | | 水田計: | 116 | | | | | | | |
| T t pnse dwia wia dwia dwia dwia dwia dwia dwia | 地目:焔 | | | | | | | | | | |
| F t pn wfiase 204 細粒褐色森林土 吉原統 06A09 H t n dgwiase 20 礫質褐色森林土 豊丘統 06C16 N t dgfniase 60 礫質褐色低地土, 斑紋なし 二条統 12C06 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 12C07 G t dni wa 79 礫質灰色低地土, 灰褐系 松本統 13F21 | 中央 | | t pnse dwia | 461 | 細粒褐色森林士 | 寺の尾統 | 06A04 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| M t pn wfiase 204 細粒褐色森林土 長板統 06A09 H t n dgwiase 20 礫質褐色森林土 豊丘統 06C16 N t dgfniase 60 礫質褐色低地土, 斑紋なし 二条統 12C07 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 13F21 G t dni wa 79 礫質灰色低地土, 灰褐系 松本統 13F21 | 婦業 | 1. | | 141 | 細粒褐色森林士 | 吉原統 | 06A05 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| Ht n dgpwiase20 礫質褐色森林土豊丘統06C16Nt dgfniase60 礫質褐色低地土,斑紋なし二条統12C06Kt dgn xfiase189 礫質褐色低地土,斑紋なし外城統12C07Gt dni wa79 礫質灰色低地土,灰褐系松本統13F21 | | _ | | 204 | 細粒褐色森林士 | 長坂統 | 06A09 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質ばんど質黄色土 | 23220 |
| N t dgfniase 60 礫質褐色低地土, 斑紋なし 二条統 12006 K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外域統 12007 G t dni wa 79 礫質灰色低地土, 灰褐系 松本統 13F21 (加計: 1154 (加計: 1154) | 浜婦美 | | | 20 | 礫質褐色森林土 | 豊丘統 | 06C16 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| K t dgn xfiase 189 礫質褐色低地土, 斑紋なし 栄質な色低地土, 灰褐系 外域統 13F21 G t dni wa 79 礫質灰色低地土, 灰褐系 43F21 畑計・1154 畑計・1154 | 野塚 | _ | t dgfniase | 09 | - | 二条統 | 12006 | 暗色表層褐色低地土 | 7121 | 腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土 | 10220 |
| G t dni wa 79 碟質灰色低地土,灰褐系 松本統 13F21 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 共和 K | | | 189 | - | 外城統 | 12007 | 暗色表層褐色低地土 | 7122 | 礫質普通黒ボク土 | 11612 |
| ・十二世 | | | | 79 | - | 松本統 | 13F21 | 灰色低地土 | 7213 | 礫質普通灰色低地土 | 14614 |
| | | | 畑計: | 1154 | | | | | | | |

積丹町 計: 1270 ha

| | | | | | ~ 12 | < 古平町 (406) > | ^ | | | |
|-------|----------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 土壌区名 | 器号 | 簡略分級式 | (ha) 面積 |) ——— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 [土壌統群名 土壌統名 | 次案改訂版 — 土壌統名 | <u>т</u> П | ———— 北海道二次案分類 — 小分類名 | 了 日 | —— 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | 版 ロ エ |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 鴨居木 | ¥ | pi dl | 33 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 胀 | တ | Ifna | 10 | 中粗粒グライ土 | 上兵庫統 | 14E22 | 暗色表層灰色低地土 | 7222 | 中粒質表層灰色グライ低地土 | 13430 |
| | | 水田計: | 43 | | | | | | | |
| 地回: 畑 | | | | | | | | | | |
| 小孙乃 | ~ | dise tgwa | 32 | 礫質褐色森林土 | 石浜統 | 06C15 | 褐色森林土 | 3111 | 礫質山地褐色森林土 | 24512 |
| 九山 | ≥ | dgpise txna | 119 | 礫質褐色森林士 | 豊丘統 | 06C16 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質台地褐色森林士 | 24610 |
| 摺鉢 | В | s tdae wni | 61 | 礫質褐色森林土 | 五社統 | 06C17 | 褐色森林土 | 3111 | 礫質山地褐色森林土 | 24512 |
| 泥ノ木 | — | dpse twnia | 92 | 礫質褐色森林土 | 大爪統 | 06C18 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 山田 | | tdgi wa | 70 | 礫質褐色低地士,斑紋なし | 二条統 | 12006 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16414 |
| | | 知計: | 324 | | | | | | | |

古平町 計: 367 ha

< 仁木町 (407) >

| | | | : | | | V (104) [H] | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|------|---------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | (ha) | ———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 欠案改訂版 —— | | ———— 北海道二次案分類 — | | ——— 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 | 土壌統群名 | 土壌統名 | エ | 小分類名 | ่ - - | 土壌統群名 | エ |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 大江北 | OEN | u d | 83 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 尾根内 | | bu f | 28 | 細粒灰色台地土 | 小向統 | 07A03 | 疑似グライ土 | 4111 | 細粒質普通灰色台地土 | 18221 |
| 長沢 | AA | pfn | 164 | 細粒褐色低地土,斑紋なし | 新戒統 | 12A02 | 褐色低地土 | 7113 | 細粒質普通褐色低地土 | 16423 |
| 馬群別 | MA | dp tIni | 18 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 礫質台地褐色森林土 | 24610 |
| 余市川 | | tdgplni | 110 | 礫質褐色低地土,斑紋あり | 井尻野統 | 12F17 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 銀山東 | B. G.IH | dbu | 106 | 礫質灰色低地土, 灰色系 | 久世田統 | 13C10 | 灰色低地土 | 7213 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| 種川 | | dp f | 28 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 久世田統 | 13C10 | 灰色低地土 | 7214 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| 大江 | 90 | dIn | 69 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 追子野木統 | 13C11 | 灰色低地土 | 7212 | 礫質普通褐色低地土 | 16415 |
| 銀山 | <u>-</u> 9 | u | 87 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 追子野木統 | 13C11 | 灰色低地土 | 7212 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |
| 大江中央 | 90 | pfn | 22 | 中粗粒強グライ土 | 芝井統 | 14B05 | グライ 伝地士 | 7313 | 細粒質還元型グライ低地土 | 13522 |
| | | 水田計: | 798 | | | | | | | |
| 地国: 畑 | | | | | | | | | | |
| 尾猿内 | _ | tdp wnise | 233 | 細粒褐色森林土 | 尾猿内統 | 06A06 | 褐色森林土 | 3112 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 漁別 | 71 | p tgwfns | 184 | 細粒褐色森林士 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林士 | 24230 |
| 古別 | KO | dp gxis | 138 | 礫質褐色森林士 | 前川統 | 06C19 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| | | : 本 | 222 | | | | | | | |
| 地目:樹園地 | | | | | | | | | | |
| 如 | | tdpne | 37 | 細粒褐色森林士 | 笠山統 | 06A08 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| Ţ | | xd | 202 | 細粒褐色低地土,斑紋なし | 櫟下統 | 12A01 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質普通褐色低地土 | 16423 |
| 七 大 団 大 田 | Z Z | a | 110 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 褐色低地土 | 7112 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 得志内 | | dpfne | 159 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 滝沢統 | 12005 | 褐色低地土 | 7113 | 礫質腐植質褐色低地土 | 16211 |
| 仁木南 | NIS | dx tgfni | 22 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 外城統 | 12007 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 黒川北 | | pw fn | 22 | 細粒強グライ士 | 田川統 | 14A02 | 暗色表層グライ低地土 | 7324 | 典型普通黒ボクグライ土 | 07330 |
| 黒川 | KU | dw pfn | 33 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| | | 樹園地計: | 657 | | | | | | | |

仁木町 計: 2010 ha

| | | | | | < 徐市町 | 书町 (408) > | ^ | | | |
|-------|----|-----------|----------|--------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | (ha) | ——— 農耕地土壤分類第二次案改訂版 | 次案改訂版 — | , | ———— 北海道二次案分類 — | | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | |
| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 | П | 土壌統名 | П П | 小分類名 | 니 I 元 | 土壌統群名 | <u>т</u> П |
| 地目:水田 | | | | | | | | | | |
| 長沢 | ΑĀ | pfn | 101 | 細粒褐色低地士,斑紋なし | 新戒統 | 12A02 | 褐色低地土 | 7113 | 細粒質普通褐色低地土 | 16423 |
| 銀山東 | В | dbu | 92 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 久世田統 | 13C10 | 灰色低地土 | 7213 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| 種川 | TA | dpf | 42 | 礫質灰色低地土,灰色系 | 久世田統 | 13C10 | 灰色低地土 | 7214 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| | | 水田島 | 水田計: 238 | | | | | | | |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| 尾猿内 | S0 | tdp wnise | 220 | 細粒褐色森林土 | 尾猿内統 | 06A06 | 褐色森林土 | 3112 | 典型ばん士質褐色森林士 | 24230 |
| | | 畑 | 畑計: 550 | | | | | | | • |

| 地目:樹園地 | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------|--------|--------------|-----|-------|------------|------|-----------------|-------|
| 美国 | W | tfe | 75 | 細粒褐色森林士 | 笠山統 | 06A08 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 淡色普通非アロフェン質黒ボク土 | 10330 |
| 智 | | tdpne | 285 | 細粒褐色森林士 | 笠山統 | 06A08 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 浜 | | ne tdgxfs | 21 | 中粗粒褐色森林土 | 裏谷統 | 06B12 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 十十 | | xd | 130 | | 櫟下統 | 12A01 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質普通褐色低地土 | 16423 |
| 量 正 | | pe tgxfns | 175 | 細粒褐色低地士,斑紋なし | 櫟下統 | 12A01 | 褐色低地土 | 7114 | 淡色普通非70712質黒ボク土 | 10330 |
| 梅川 | | tpse | 163 | | 新戒統 | 12A02 | 褐色低地土 | 7113 | 淡色普通非アロフェン質黒ボク土 | 10330 |
| 黒川東 | KUH | x tf | 113 | | 飯島統 | 12B04 | 褐色低地土 | 7112 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 得志内 | | dpfne | 201 | 礫質褐色低地士,斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 褐色低地土 | 7113 | 礫質腐植質褐色低地土 | 16211 |
| 黒川北 | | pw fn | 138 | 細粒強グライ土 | 田川統 | 14A02 | 暗色表層グライ低地土 | 7324 | 典型普通黒ボクグライ土 | 07330 |
| 黒川 | | dw pfn | 20 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| 黒川南 | | w tnf | 21 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| | | 樹園地計: 1372 | : 1372 | | | | | | | |

余市町 計: 2160 ha

| | | | (1) | | <赤 ナ | < 赤井川村(40 | (409) > | | 1 ユー・イー 4 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | V |
|----------------|------------|-------------|------------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|---|-----------------|
| 土壌区名 | 器 | 簡略分級式 | (na) 面積 |) ———————————————————————————————————— | 、米区司及 —— 土壌統名 | <u>т</u> П | | <u>т</u> П | ——— | <u>⊥</u> ∏ |
| 地国:水田 赤井川中央 | AC | <u> </u> | 35 | 中粗粒褐色低地土,斑紋なし | 茶 | 12B03 | 褐色低地土 | 7113 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 旭丘東 | АН | l tna | 36 | | 西山統 | 14A03 | グライ低地土 | 7313 | 細粒質表層灰色グライ低地土 | 13422 |
| | | 水田計 | .: 71 | | | | | | | |
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| | 豆 | tne dxs | ∞ | 細粒褐色森林土 | 寺の尾統 | 06A04 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 細粒質山地褐色森林土 | 24522 |
| 赤井川 | ΑK | n tpw | 515 | 細粒褐色森林土 | 吉原統 | 06A05 | 暗色表層酸性褐色森林土 | 3222 | 典型腐植質褐色森林土 | 24330 |
| 田田光 | 壬 | dpnie tws | 14 | 細粒褐色森林土 | 吉原統 | 06A05 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質台地褐色森林土 | 24620 |
| 旭丘西 | AN | tn dwse | 176 | 細粒褐色森林土 | 最上統 | 06A07 | 酸性褐色森林土 | 3212 | 細粒質台地黄色土 | 23721 |
| 三業 | Υ | dgpnse txfi | 13 | 礫質褐色森林土 | 岩屋統 | 06C21 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 典型ばん土質褐色森林土 | 24230 |
| 常 | 으 | td gxf pnse | 32 | 礫質褐色森林土 | 千原統 | 06C23 | 酸性褐色森林土 | 3211 | 礫質山地黄色土 | 23611 |
| 光田 | ᆂ | dgni tpxse | 117 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 淹沢統 | 12005 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質腐植質褐色低地土 | 16211 |
| 都 | I W | dxna | 135 | 礫質褐色低地土,斑紋なし | 二条統 | 12006 | 褐色低地土 | 7112 | 礫質普通褐色低地土 | 16414 |
| 田の田 | 뤂 | t pwn | 28 | 細粒褐色低地土,斑紋あり | 中島統 | 12D08 | 褐色低地土 | 7114 | 細粒質湿性褐色低地土 | 16121 |
| 落合 | 00 | tdi gna | 111 | 礫質灰色低地土,灰褐系 | 栢山統 | 13F22 | 暗色表層灰色低地土 | 7221 | 礫質普通灰色低地土 | 14612 |
| | | (相計: | 1179 | | | | | | | |

赤井川村 計: 1250 ha

後志支庁 計 40547 ha