



よく食べ良く育つ！おいしい豚の育て方

SPF三元交雑肉豚の「お父さん」が変わりました。

大ヨークシャー(W) ♀

一代雑種(WL) ♀

三元交雑肉豚(WLD)



系統豚「ハマナスW2」

デュロック(D) ♂

ランドレース(L) ♂




系統豚「ゼンノーD02」




畜産試験場が造成した「ハマナスW2」を用いた一代雑種♀と、新しいデュロック系統豚「ゼンノーD02」♂から産まれた三元交雑肉豚(WLD)の発育能力と育て方を検討しました。

食いしん坊な豚（飼料摂取量10%増）で、肥育期間が短くなります。



体重が1kg増えるのに必要な餌の量(飼料要求率) (kg)



太り過ぎないように、最適な餌の給与量を明らかにしました。

・150日齢程度で出荷すると、良好な上物率が得られます。

・A農場での事例

	体重30kg 日齢	飼料給与量 (kg/日)		出荷時 日齢	枝肉背脂 肪厚(mm)
		肥育前期	肥育後期		
去勢♂	69	2.30	3.08	150	18
	63	2.14	2.85	150	18
	57	1.98	2.62	151	18
♀	69	2.45	2.86	147	18
	63	2.19	2.63	150	18
	57	1.96	2.43	153	18

