

平成19年度 定期作況報告

(6月20日現在)

北海道立中央農業試験場

水稻の部

水田・転作科(岩見沢市)

I 気象概況

5月下旬:平均気温は平年より0.5℃低かった。降水量は平年の143%と多いが、これは主に5月26日および31日の集中雨によるもので、日照時間は平年の136%と、多照に経過した。
 6月上旬:平均気温は平年より2.8℃高く、降水量は平年の30%、日照時間は平年の150%であり、高温、少雨、多照に経過した。
 6月中旬:平均気温は平年より2.8℃高かった。降水量は平年の336%と多いが、これは6月15日の集中豪雨によるもの。日照時間は平年の148%で、高温、多雨、多照に経過した。

以上、1ヶ月を通じ気温は平年より1.6℃高く、降水量は平年の133%、日照時間は平年の144%で、高温、多照に経過した。

5月下旬～6月中旬気象表

項目	5月下旬			6月上旬			6月中旬			平均(合計)		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
最高気温(℃)	19.0	18.8	0.2	22.1	19.0	3.1	24.9	21.2	3.7	21.9	19.6	2.3
最低気温(℃)	7.8	9.0	△ 1.2	12.2	9.7	2.5	13.9	12.0	1.9	11.2	10.2	1.0
平均気温(℃)	13.4	13.9	△ 0.5	17.1	14.3	2.8	19.4	16.6	2.8	16.5	14.9	1.6
降水量(mm)	33.0	23.1	9.9	7.5	25.1	△ 17.6	39.0	11.6	27.4	79.5	59.8	19.7
日照時間(hr)	90.1	66.2	23.9	93.0	62.0	31.0	89.2	60.4	28.8	272.3	188.6	83.7

注) データは「アメダス岩見沢」を使用。平年値は平成9年～18年10ヶ年平均値を農試が算出し使用。最高、最低、平均気温は期間内の平均値、降水量、日照時間は期間内の積算値を用いた。

II 作 況

水稻 作況：良

事由：移植は平年並の5月21日に行った。苗質は平年より若干劣った。しかし移植後おおむね高温、多照に経過し活着は良好で、その後も好天が続き、順調に生育が進んだ。6月20日における草丈は、「きらら397」で平年の119%、「ほしのゆめ」で平年の115%で平年を上回った。また、茎数も「きらら397」で平年の187%、「ほしのゆめ」で平年の179%と両品種とも平年を大幅に上回った。主稈葉数も平年に比べ「きらら397」で1.5葉、「ほしのゆめ」で1.1葉上回り、1週間から10日ほど生育が進んでいる。

以上、生育は大きく進んでいることから、現在の作況は良である。

品種名	栽培方法	移 植 時 調 査											
		移植期(月.日)			草丈(cm)			茎数(本/個体)			主稈葉数(枚)		
		本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
きらら397	中苗紙筒	5.21	5.21	0	9.2	10.5	△ 1.3	1.0	1.1	△ 0.1	3.2	3.3	△ 0.1
ほしのゆめ	中苗紙筒	5.21	5.21	0	10.0	11.0	△ 1.0	1.0	1.2	△ 0.2	3.0	3.3	△ 0.3
ななつぼし	中苗紙筒	5.21	-	-	9.5	-	-	1.0	-	-	2.9	-	-

品種名	栽培方法	移植時調査			6月20日調査								
		地上部乾物重(g/100本)			草丈(cm)			茎数(本/m ²)			主稈葉数(枚)		
		本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
きらら397	中苗紙筒	2.02	2.35	△ 0.33	27.7	23.2	4.5	528	282	246	8.0	6.5	1.5
ほしのゆめ	中苗紙筒	1.93	2.39	△ 0.46	29.2	25.5	3.7	525	293	232	7.4	6.3	1.1
ななつぼし	中苗紙筒	2.00	-	-	30.3	-	-	448	-	-	7.5	-	-

注1) 平年値は前7ヶ年中、平成16年(最豊)、15年(最凶)を除く5ヶ年平均

注2) 本年より「ななつぼし」(中苗紙筒)の調査を開始した。

注3) 耕種概要

土 壤 : 細粒グライ土
 施 肥 : 高度化成472全層施肥 N-P₂O₅-K₂O=8.0-9.7-6.9 kg/10a 堆肥1.5t/10a
 播 種 量 : 中苗紙筒=180cc/箱 栽 植 密 度 : 30×13.3cm 25株/m² 4本植え
 移 植 方 法 : 手植え 反 復 : 2

訂正表

訂正

平成19年5月20日発表の定期作況報告において、季節表の耕鋤始および作況の事由に誤りがありました

たので、下記の下線のとおり訂正をお願いします。

誤

季節表	
年次	耕鋤始 (年. 月. 日)
本年	H19. <u>5.9</u>
平年	5.8
比較	1

→

正

季節表	
年次	耕鋤始 (年. 月. 日)
本年	H19. <u>5.7</u>
平年	<u>4.30</u>
比較	7

事由: 本年は根雪終日が1日早かったが、5月7日の降雨のため耕鋤始は平年より1日遅れた。

→

事由: 本年は根雪終日が1日早かったが、4月下旬および5月上旬の降雨の影響により耕鋤初日は平年より7日遅れた。

畑作の部

畑作科(長沼町)

I 気象概況

5月下旬：気温は最高および平均は平年並みで、最低はやや低かった。降水量および日照時間は平年より多かった。

6月上旬：気温は平均、最高および最低ともかなり高かった。降水量は平年より少なく、日照時間は平年並みであった。

6月中旬：気温は平均、最高および最低ともかなり高かった。降水量および日照時間は平年よりもやや多かった。

以上、1ヶ月を通じてみると、気温はかなり高く、降水量・日照時間は平年よりやや多かった。

5月下旬～6月中旬気象表

項目	5月下旬			6月上旬			6月中旬			平均(合計)		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温(℃)	12.9	13.1	△0.2	15.4	13.7	1.7	18.4	15.8	2.6	15.6	14.2	1.4
最高気温(℃)	18.1	17.9	0.2	20.1	18.3	1.8	24.3	20.4	3.9	20.8	18.9	1.9
最低気温(℃)	8.2	9.0	△0.8	12.3	9.8	2.5	13.8	12.0	1.8	11.4	10.3	1.1
降水量(mm)	38.5	23.3	15.2	7.5	25.7	△18.2	50.0	13.9	36.1	96.0	62.9	33.1
降水日数(日)	3.0	3.2	△0.2	2.0	3.9	△1.9	1.0	1.7	△0.7	6.0	8.8	△2.8
日照時間(hr)	79.8	48.4	31.4	66.6	47.9	18.7	87.9	45.8	42.1	234.3	142.1	92.2

注1) データは「アメダス長沼」を使用。平年値は平成9年～18年の確定値を10年間農試で平均

注2) 最高、最低、平均気温は期間内の平均値、降水量、降水日数、日照時間は期間内の積算

Ⅱ 作 況

平成19年6月20日作況

1. 秋まき小麦(平成18年播種)

平成18年

9月20日作況 やや不良

事由：台風13号の影響による降雨のため、播種は平年より7日遅い9月21日である。

以上により、現在の作況はやや不良である。

平成18年

10月20日作況 やや不良

事由：出芽期は8日遅れの9月28日であった。また、出芽後の気温もやや低温で湿潤傾向に経過したため生育の進展は緩慢で、草丈及び茎数は平年を下回っている。

以上により、現在の作況はやや不良である。

平成19年

5月20日作況 やや良

事由：播種期は平年より7日、出芽期は8日それぞれ遅かったものの、秋期が比較的好天に推移したため、越冬前の11月の茎数は平年以上であった。根雪終は平年より4日早く、雪腐病による冬損も平年並みで、越冬状況は良好であった。4月中旬は低温に推移し生育が停滞したが、その後の天候回復に伴い5月20日現在で草丈は平年並み～やや大きく、茎数は平年より200～300本/㎡多い。

以上により、現在の作況はやや良である。

平成19年

6月20日作況 平年並み

事由：5月下旬まで生育の進展は緩慢であったが、6月に入り高温、多照傾向となり生育は進み、平年より1～2日遅れで出穂期となった。6月20日時点で草丈はほぼ平年並みで、前月まで多目であった茎数は、出穂前後の高温により弱小分げつの無効化が進み、やや少なめとなった。

以上により、現在の作況は平年並みである。

平成19年最終作況

事由：

平成19年6月20日作況

1. 秋まき小麦(平成18年播種)

項目 \ 年次	品種名	ホクシン			ホロシリコムギ		
		本年	平年	比較	本年	平年	比較
播種期	(H18.月.日)	9.21	9.14	7	9.21	9.14	7
出芽期	(H18.月.日)	9.28	9.20	8	9.28	9.20	8
出穂期	(H19.月.日)	6.07	6.05	2	6.10	6.09	1
成熟期	(H19.月.日)		7.19			7.25	
冬損程度	(0:無~5:甚)	1.6	1.3	0.3	1.3	1.0	0.3
草丈 (cm)	H18.10.20	17.0	24.2	△ 7.2	16.8	25.2	△ 8.4
	H19.5.20	53.4	51.6	1.8	55.4	55.3	0.1
	H19.6.20	97	97	0	107	105	2
茎数 (本/m ²)	H18.10.20	473	997	△ 524	543	893	△ 350
	越冬前(11月)	1349	1336	13	1458	1266	192
	H19.5.20	1396	1188	208	1536	1188	348
	H19.6.20	699	710	△ 11	643	691	△ 48
成熟期における	稈長 (cm)		93			102	
	穂長 (cm)		8.8			8.6	
	穂数 (本/m ²)		671			603	
倒伏程度	(0:無~5:甚)		1.1			2.1	
子実重	(kg/10a)		617			567	
リットル重	(g)		805			796	
千粒重	(g)		39.4			44.2	
品質	(等級)		2等			2等	
子実重平年対比	(%)		100			100	

注1) 平年値は前7か年中、最凶(H12年)、最豊(ホクシンH15、ホロシリH16)を除く5か年平均(収穫年度)。

2) △は平年より早、短、少を表す。

3) 倒伏程度:成熟期における倒伏程度。

平成19年6月20日作況

2. 春まき小麦

5月20日作況 やや良

事由：融雪剤使用圃場の根雪終は平年より4日早い3月26日であった。播種期は平年より2日遅い4月18日であった。播種後の気温が高めに推移したため、出芽日数はやや短くなり、出芽期は平年より1日遅い5月1日であった。出芽後の5月上旬が高温に経過したため生育は進んでいる。草丈は「ハルユタカ」で平年よりやや短く、「春よ恋」で平年並である。茎数は両品種とも平年を上回っている。

以上により、現在の作況はやや良である。

6月20日作況 平年並み

事由：6月上～中旬の気温が高めに推移したため、出穂期は平年より2～3日早まった。草丈は両品種とも平年並みである。茎数は「ハルユタカ」でほぼ平年並みで、「春よ恋」は平年をやや下回っている。

以上により、現在の作況は平年並みである。

平成19年最終作況

事由：

平成19年6月20日作況

2. 春まき小麦

項目 \ 年次	品種名			ハルユタカ			春よ恋							
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較					
播種期 (月.日)	4.18	4.16	2	4.18	4.16	2	4.18	4.16	2					
出芽期 (月.日)	5.01	4.30	1	5.01	4.30	1	5.01	4.30	1					
出穂期 (月.日)	6.18	6.21	△ 3	6.18	6.20	△ 2	6.18	6.20	△ 2					
成熟期 (月.日)		8.02			8.02			8.02						
草丈 (cm)	5月20日	20.1	21.0	△ 0.9	21.0	20.7	0.3	6月20日	77	78	△ 1	80	80	0
茎数 (本/m ²)	5月20日	635	530	105	597	550	47	6月20日	698	720	△ 22	654	702	△ 48
成熟期 稈長 (cm)			89			96								
に 穂長 (cm)			8.4			8.5								
おける 穂数 (本/m ²)			474			789								
子実重 (kg/10a)			472			528								
一穂粒数 (粒)			30.9			33.4								
千粒重 (g)			39.7			41.0								
リットル重 (g)			802			816								
品質 (等級)			2中			2中								
子実重平年対比 (%)			100			100								

*) 平年値は前7カ年中、最豊(平成14年)、最凶(平成12年)を除く5カ年平均。
一穂粒数は、各反復で有効穂を50穂調査。リットル重は1リットル升による測定。

平成19年6月20日作況

3. 大豆

6月20日作況 やや良

事由：播種は平年より1日早い5月22日に行った。出芽期は平年と同じ6月2日であった。出芽後は好天に恵まれたため、主茎長および主茎節数は平年を上回った。

以上により、現在の作況はやや良である。

7月20日作況

事由：

8月20日作況

事由：

9月20日作況

事由：

平成19年最終作況

事由：

平成19年6月20日作況

3. 大豆

項目	品種名 年次	ツルムスメ			ユウヅル			トヨムスメ			スズマル(参考)		
		本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
播種期	(月.日)	5.22	5.23	△ 1	5.22	5.23	△ 1	5.22	5.23	△ 1	5.22	5.23	△ 1
出芽期	(月.日)	6.02	6.02	0	6.02	6.02	0	6.02	6.02	0	6.02	6.02	0
開花期	(月.日)		7.21			7.29			7.17			7.25	
成熟期	(月.日)		9.29			10.14			9.29			9.30	
主茎長 (cm)	6月20日	13.6	8.5	5.1	12.7	8.8	3.9	15.3	10.3	5.0	9.9	8.0	1.9
	7月20日		47.1			43.3			50.7			38.5	
	8月20日		57.4			84.1			60.1			70.6	
	9月20日		57.9			84.4			59.8			71.6	
	成熟期		57.8			84.9			59.7			68.9	
主茎節数 (節)	6月20日	3.9	3.4	0.5	3.4	3.2	0.2	3.3	3.0	0.3	4.0	3.4	0.6
	7月20日		10.9			10.7			9.8			10.3	
	8月20日		12.1			15.7			10.4			14.3	
	9月20日		12.2			15.8			10.4			14.3	
	成熟期		12.1			16.0			10.5			14.3	
分枝数 (本/株)	7月20日		6.1			4.1			6.2			7.4	
	8月20日		6.2			4.7			6.3			10.9	
	9月20日		5.7			4.3			5.8			10.4	
	成熟期		5.9			3.8			5.8			9.9	
着莢数 (莢/株)	9月20日		51.7			55.6			65.5			120.9	
	成熟期		51.7			55.0			65.2			121.2	
一莢内粒数			1.83			1.74			1.84			2.43	
子実重 (kg/10a)			337			333			392			332	
百粒重 (g)			46.2			44.0			39.2			15.2	
屑粒率 (%)			2.3			2.8			1.8			1.6	
品質 (等級)			3上			3下			3下			2中	
子実重平年対比 (%)													

注) 平年値は前7か年中、平成15年(最凶)、16年(最豊)を除く5か年平均。

ただし、スズマルは、前6か年の最凶最豊を除く4か年平均を平年とし参考値を示す。

平成19年6月20日作況

4. 小豆

6月20日作況 良

事由：播種期は平年より3日早かった。その後気温は平年並みに経過し、降雨もあったことから出芽は順調で、出芽期は平年より5日早い6月7日であった。また、主茎長は平年より1.8cm長く、主茎節数も平年より1.6節多かった。

以上により、現在の作況は良である。

7月20日作況

事由：

8月20日作況

事由：

9月20日作況

事由：

平成19年最終作況

事由：

平成19年6月20日作況

4. 小豆

品種名 項目 \ 年次		エリモシヨウズ		
		本年	平年	比較
播種期	(月.日)	5.23	5.26	△3
出芽期	(月.日)	6.07	6.12	△5
開花期	(月.日)		7.25	
成熟期	(月.日)		9.10	
主茎長 (cm)	6月20日	5.8	4.0	1.8
	7月20日		20.0	
	8月20日		57.0	
	成熟期		59.0	
主茎節数 (節)	6月20日	2.6	1.0	1.6
	7月20日		8.0	
	8月20日		13.0	
	成熟期		13.0	
分枝数 (本/株)	7月20日		3.0	
	8月20日		4.0	
	成熟期		48.0	
着莢数 (莢/株)	8月20日		55.0	
	成熟期		48.0	
一莢内粒数			6.00	
子実重	(kg/10a)		303	
百粒重	(g)		13.0	
屑粒率	(g)		7.0	
品質	(等級)		3中	—
子実重	平年対比 (%)		100	

平成19年6月20日作況

5. ばれいしょ

5月20日作況 平年並み

事由：本年は融雪期が平年より4日早く、4月中旬が低温だったものの植付期は平年より2日早まった。植付後の天候もほぼ良好であるが、5月20日現在で萌芽期に至っていない。

以上により、現在の作況は平年並である。

6月20日作況 平年並み

事由：植付期は平年より2日早かったが、5月がやや低温傾向であったため萌芽期は平年より1日遅れた。6月に入り好天に経過し、6月20日時点の茎長及び茎数は平年をやや下回ったが、今後の塊茎肥大に影響は無い程度と見られる。

以上により、現在の作況は平年並である。

7月20日作況

事由：

8月20日作況

事由：

平成19年最終作況

事由：

平成19年6月20日作況

5. ばれいしょ

項目 \ 年次	品種名	男爵薯		
		本年	平年	比較
植付期	(月.日)	5.01	5.03	△ 2
萌芽期	(月.日)	5.26	5.25	1
開花始	(月.日)		6.23	
枯凋期	(月.日)		8.20	
茎長	6月20日	30	33	3
(cm)	7月20日		42	
茎数	6月20日	3.9	5.2	1.3
(本/株)	7月20日		5.0	
8月20日における				
上いも数	(個/株)		13.5	
上いも平均一個重(g)			75	
上いも重	(kg/10a)		4439	
でん粉価	(%)		16.0	
枯凋期における				
上いも数	(個/株)		13.0	
上いも平均一個重(g)			75	
上いも重	(kg/10a)		4457	
中以上いも重(kg/10a)			3448	
でん粉価	(%)		16.0	
上いも重平年対比	(%)		100	
中以上いも重	〃 (%)		100	
でん粉価	〃 (%)		100	

注) 平年値は前7か年中、平成12年(最凶)、17年(最豊)を除く5か年平均。

「上いも」は21g以上、「中以上いも」は61g以上のいもである。

6. 中央農試作況報告について

平成13年度より、すべての作物で土壌物理性・排水性が改良された基盤整備後の圃場を使用している。当報告は、中央農業試験場のほ場において行った生育調査について、調査時点における値を中央農試験場の平年値と比較したものであり、当該管内の作況を代表するものではありません。