

# 定期作況報告

(第2号 令和3年6月20日現在)  
地方独立行政法人北海道立総合研究機構  
農業研究本部 上川農業試験場

## 1. 気象概況

令和3年5月下旬から6月中旬までの気象は次のとおりである(表1)。

5月下旬: 平年に比べて、平均気温は2.3℃低く、降水量は2.8mm多く、日照時間は59.5時間少なかった。

6月上旬: 平年に比べて、平均気温は0.5℃高く、降水量は8.4mm少なく、日照時間は23.6時間多かった。夏日(最高気温25℃以上)は2日であった。

6月中旬: 平年に比べて、平均気温は1.4℃高く、降水量は32.0mm少なく、日照時間は31.6時間多かった。夏日は5日(うち、真夏日: 最高気温30℃以上は1日)であった。

表1 気象表

調査項目	5月下旬			6月上旬			6月中旬			平均または合計		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温(℃)	12.6	14.9	-2.3	16.4	15.9	0.5	17.9	16.5	1.4	15.6	15.8	-0.2
最高気温(℃)	16.5	21.5	-5.0	22.8	22.3	0.5	24.7	21.9	2.8	21.3	21.9	-0.6
最低気温(℃)	8.5	8.7	-0.2	9.8	10.3	-0.5	12.1	12.0	0.1	10.1	10.3	-0.2
降水量(mm)	26.0	23.2	2.8	10.5	18.9	-8.4	4.5	36.5	-32.0	41.0	78.6	-37.6
降水日数(日)	6.0	3.9	2.1	3.0	3.6	-0.6	2.0	4.5	-2.5	11.0	12.0	-1.0
日照時間(hrs)	23.1	82.6	-59.5	86.9	63.3	23.6	81.8	50.2	31.6	191.8	196.1	-4.3

注) 比布アメダス観測値。平年は過去10か年の平均値。

## 2. 作 況

### 1) 水稻 平年並

5月20日現在：平年並

事由：播種は平年並の4月15日に実施した。出芽の揃いは良好であった。

移植は平年より2日遅い5月20日に実施した。移植時の葉数、茎数は平年並であったが、草丈は平年より1.8~2.0cm高く、第1葉鞘高は0.4~0.5cm高かった。苗100本当たりの地上部乾物重は平年より0.34~0.35g重かったが、苗の充実度を示す地上部乾物重/草丈は平年並であった。

これらのことから、目下の作況は「平年並」である。

6月20日現在：平年並

事由：移植後の活着は順調であったが、5月下旬の低温および日照不足により生育は停滞した。6月上旬から中旬にかけては気温が平年並から高く推移し、日照時間も長かったことから生育は回復した。6月20日時点の草丈は平年より2.8~3.5cm高く、 $m^2$ 当たりの茎数は18~29%多かったが、主稈葉数は0.2~0.3枚少なかった。

これらのことから、目下の作況は「平年並」である。

表2 6月20日の水稻の生育

品種名		ななつぼし			ゆめぴりか			
項目 / 年次		本年	平年	比較	本年	平年	比較	
生育期節	播種期 (月.日)	4.15	4.15	0	4.15	4.15	0	
	移植期 (月.日)	5.20	5.18	2	5.20	5.18	2	
	幼穂形成期 (月.日)		6.24			6.24		
	止葉期 (月.日)		7.12			7.12		
	出穂期 (月.日)		7.23			7.22		
	成熟期 (月.日)		9.13			9.12		
	穂揃日数 (日)		9			9		
	登熟日数 (日)		52			52		
	生育日数 (日)		151			150		
移植時	草丈 (cm)	15.5	13.7	1.8	15.5	13.5	2.0	
	葉数 (枚)	4.0	4.1	▲0.1	4.1	4.2	▲0.1	
	茎数 (本)	2.0	1.9	0.1	2.0	2.1	▲0.1	
	第1葉鞘高 (cm)	2.7	2.2	0.5	2.7	2.3	0.4	
	地上部乾物重 (g/100本)	4.82	4.47	0.35	4.68	4.34	0.34	
	地上部乾物重/草丈	0.31	0.33	▲0.02	0.30	0.32	▲0.02	
本田生育	葉数 (枚)	6月20日	7.9	8.1	▲0.2	8.2	8.5	▲0.3
		7月20日		10.3			10.8	
		止葉葉数		10.3			10.8	
	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	6月20日	617	478	139	669	569	100
		7月20日		722			858	
	草丈 (cm)	6月20日	41.6	38.1	3.5	39.4	36.6	2.8
7月20日			79.5			78.4		
成熟期	稈長 (cm)		69.3			65.7		
	穂長 (cm)		16.5			16.4		
	穂数 (本/m <sup>2</sup> )		680			796		
収量構成要素	一穂籾数 (粒)		54.8			46.6		
	m <sup>2</sup> 当たり籾数 (×千)		37.3			37.1		
	稈実歩合 (%)		94.7			92.2		
	m <sup>2</sup> 当たり稈実籾数 (×千)		35.3			34.2		
	同上比 (%)		100			100		
	登熟歩合 (%)		85.7			79.9		
	籾摺歩合 (%)		80.1			78.2		
	屑米歩合 (%)		3.0			3.9		
精玄米千粒重 (g)		22.1			22.5			
収量	藁重 (kg/10a)		646			615		
	精籾重 (kg/10a)		874			827		
	精玄米重 (kg/10a)		699			645		
	収量平年比 (%)		100			100		
	検査等級 (等)		1下		-	2中	-	

注1) 平年値は前7か年中、平成29年（最豊年）、令和元年（最凶年）を除く5か年の平均値。

2) ▲は平年より“減”を示す。

3) 育苗耕種概要 育苗様式：成苗ポット苗

施肥：成苗培土Hを約1.43 (kg/箱) 充填、  
成分量 N 0.5、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1.0、K<sub>2</sub>O 0.8、MgO 0.2 (g/箱)、  
置床 N 27.0、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 34.0、K<sub>2</sub>O 18.0 (g/m<sup>2</sup>)

4) 本田耕種概要 栽植密度：25.3株/m<sup>2</sup> (33.0cm×12.0cm)、3本植

施肥量：N 8.0、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 9.7、K<sub>2</sub>O 6.9 (kg/10a)、堆肥1,000 (kg/10a)

5) 精玄米千粒重および精玄米重：網目1.90mm以上、水分15%換算。

2) 秋まき小麦 (R2年播種) 平年並

9月20日現在:

事由: 播種は平年より2日遅い9月16日に行った。

10月20日現在: 平年並

事由: 播種後の気温が平年並~やや高く推移したため、出芽期は平年並、葉数は平年並、草丈はやや高く、茎数はやや少なかった。

したがって、目下の作況は「平年並」である。

5月20日現在: 平年並

事由: 根雪始は平年より10日遅く、根雪終は平年より7日早く、積雪期間は平年より17日短い127日であった。雪腐病発病度は平年並であった。草丈は平年より高いが、茎数は平年よりやや少なかった。

したがって、目下の作況は「平年並」である。

6月20日現在: 平年並

事由: 5月下旬は平年より低い気温で推移したため、出穂期は平年より1日遅い6月5日となった。5月下旬から6月中旬にかけての降水量は少なく、気温は平年よりやや高かった。草丈は平年よりやや高く、茎数は平年より多かった。

したがって、目下の作況は「平年並」である。

表3 6月20日の秋まき小麦の生育

品 種 名		きたほなみ		
項 目 / 年次		本 年	平 年	比 較
播種期 (月.日)		9.16	9.14	2
出芽期 (月.日)		9.24	9.24	0
出穂期 (月.日)		6.05	6.04	1
成熟期 (月.日)			7.18	
越冬茎歩合 (%)		119.5	111.1	8.4
雪腐病発病度		13.8	16.5	▲2.7
葉数(枚)	令 2年10月20日	4.5	4.6	▲0.1
草丈 (cm)	令 2年10月20日	20.1	17.9	2.2
	令 3年 5月20日	45.0	40.4	4.6
	令 3年 6月20日	93.0	86.0	7.0
茎数 (本/m <sup>2</sup> )	令 2年10月20日	681	781	▲100
	令 3年 5月20日	1007	1073	▲66
	令 3年 6月20日	659	572	87
成熟期	稈長 (cm)		76	
	穂長 (cm)		8.8	
	穂数(本/m <sup>2</sup> )		475	
子実重 (kg/10a)			590	
同上平年比 (%)			100	
容積重 (g/L)			840	
千粒重 (g)			43.3	
蛋白質含有率 (%)			9.4	
検査等級 (等)			1等	-

注1) 平年値は前7か年中、平成27年(最豊年)、平成30年(最凶年、収穫年度)を除く5か年の平均値。

2) ▲は平年より“減”を示す。

3) 春まき小麦 平年並

5月20日現在：やや不良

事由：播種は平年より1日早い4月16日に行った。播種後の気温が平年より低く経過したものの降雨が適度であったことから、出芽期は平年並の5月1日だった。出芽後も低温傾向が続いたことから、草丈は平年並であったものの茎数は平年を下回った。

これらのことから、目下の作況は「やや不良」である。

6月20日現在：平年並

事由：5月下旬は低温寡照であったが、6月上中旬は平年並から高温多照であった。出穂期は平年より4日遅い6月20日だった。草丈は平年よりわずかに短い、茎数は平年を上回った。

したがって、目下の作況は「平年並」である。

表4 6月20日の春まき小麦の生育

品 種 名		春よ恋		
項 目 / 年次		本 年	平 年	比 較
播種期	(月.日)	4.16	4.17	△1
出芽期	(月.日)	5.01	5.01	0
出穂期	(月.日)	6.20	6.16	4
成熟期	(月.日)		7.28	
草丈 (cm)	5月20日	24.3	23.3	1.0
	6月20日	83.0	86.1	▲3.1
茎数 (本/m <sup>2</sup> )	5月20日	447	762	▲315
	6月20日	845	738	107
成 熟 期	稈長 (cm)		93	
	穂長 (cm)		8.6	
	穂数 (本/m <sup>2</sup> )		493	
子実重	(kg/10a)		530	
同上	平年比 (%)		100	
容積重	(g/L)		829	
千粒重	(g)		41.7	
蛋白質含有率	(%)		11.6	
検査等級	(等)		2上	-

- 注1) 平年値は前7か年中、平成28年（最豊年）、平成30年（最凶年）を除く5か年の平均値。  
 2) △は平年より“早”、▲は平年より“減”を示す。

4) 大豆 平年並

5月20日現在：

事由：播種は平年より1日遅い5月20日に行った。

6月20日現在：平年並

事由：播種後の5月下旬は平年より低い気温で推移したため、出芽期は平年より4日遅い6月5日であった。出芽後の6月中旬は平年よりやや高い気温で推移した。主茎長は平年よりやや長く、主茎節数は平年並である。

したがって、目下の作況は「平年並」である。

表5 6月20日の大豆の生育

品 種 名		ユキホマレ		
項 目 / 年 次		本年	平年	比較
播種期 (月.日)		5.20	5.19	1
出芽期 (月.日)		6.05	6.01	4
開花期 (月.日)			7.14	
成熟期 (月.日)			9.20	
主茎長 (cm)	6月20日	14.4	11.9	2.5
	7月20日		52.1	
	8月20日		59.2	
	9月20日		59.5	
	成熟期		59.5	
主茎節数 (節)	6月20日	3.4	3.6	▲0.2
	7月20日		9.5	
	8月20日		10.2	
	9月20日		10.3	
	成熟期		10.3	
分枝数 (本/株)	7月20日		5.9	
	8月20日		6.8	
	9月20日		6.4	
	成熟期		6.4	
着莢数 (個/株)	8月20日		93	
	9月20日		80	
	成熟期		80	
子実重 (kg/10a)			419	
同上平年比 (%)			100	
百粒重 (g)			33.4	
屑粒率 (%)			1.0	
検査等級 (等)			2上	-

注1) 平年値は前7か年中、平成26年(最豊年)、令和2年(最凶年)を除く5か年の平均値。

2) ▲は平年より“減”を示す。

5) 小豆 平年並

6月20日現在：平年並

事由：播種は平年並の5月24日に行った。5月下旬は低温で経過したものの、6月上旬は平年並で、降雨も適度にあったことから、出芽期は平年並であった。その後の気温は高温傾向で推移したものの降水量は少なかったことから、主茎長、本葉数とも平年並である。

したがって、目下の作況は「平年並」である。

表6 6月20日の小豆の生育

品 種 名		エリモシヨウズ		
項 目 / 年 次		本年	平年	比較
播種期 (月.日)		5.24	5.24	0
出芽期 (月.日)		6.09	6.09	0
開花期 (月.日)			7.25	
成熟期 (月.日)			9.16	
主茎長 (cm)	6月20日	5.8	4.3	1.5
	7月20日		24.3	
	8月20日		66.6	
	成熟期		72	
本葉数 (枚)	6月20日	1.4	1.1	0.3
	7月20日		8.0	
	8月20日		12.1	
主茎節数 (節)	成熟期		14.1	
分枝数 (本/株)	7月20日		4.8	
	8月20日		5.5	
	成熟期		5.8	
着莢数 (個/株)	8月20日		55	
	成熟期		58	
子実重 (kg/10a)			375	
同上平年比 (%)			100	
百粒重 (g)			14.1	
屑粒率 (%)			3.1	
検査等級 (等)			2下	-

注) 平年値は前7か年中、平成29年(最豊年)、令和2年(最凶年)を除く5か年の平均値。

6) ばれいしょ やや不良

5月20日現在：

事由：植付けは平年より2日早い5月7日に行った。

6月20日現在：やや不良

事由：植付け後、気温が低めに推移したものの、萌芽期は平年より1日早かった。その後の気温は平年並から高温に推移したものの、降水量が少なく土壌が乾燥したことから、茎長は平年をやや下回っている。

したがって、目下の作況は「やや不良」である。

表7 6月20日のばれいしょの生育

品 種 名		男爵薯		
項 目 / 年次		本 年	平 年	比 較
植付期 (月.日)		5.07	5.09	△2
萌芽期 (月.日)		5.28	5.29	△1
開花始 (月.日)			6.24	
枯凋期 (月.日)			8.27	
茎長 (cm)	6月20日	29.7	35.5	▲5.8
	7月20日		51.6	
上いも数 (個/株)	7月20日		9.3	
	8月20日		10.3	
上いもの 平均重(g)	7月20日		76	
	8月20日		107	
上いも収量 (kg/10a)	7月20日		3077	
	8月20日		4827	
でん粉価 (%)	7月20日		14.9	
	8月20日		14.7	
収 穫 期	上いも数 (個/株)		10.3	
	上いもの平均重 (g)		108	
	上いも収量 (kg/10a)		4886	
	同上平年比 (%)		100	
	中以上いも収量 (kg/10a)		4348	
	同上平年比 (%)		100	
	規格内いも収量 (kg/10a)		3938	
	同上平年比 (%)		100	
でん粉価 (%)		14.2		

注1) 平年値は前7か年中、平成28年(最豊年)、平成30年(最凶年)を除く5か年の平均値。

2) △は平年より“早”、▲は平年より“減”を示す。