

定 期 作 況 報 告

令和4年6月
(6月20日現在)



北見農業試験場

1. 気象経過

5月下旬：最高気温はやや低く、最低気温はやや高く、平均気温は平年並であった。降水量は平年より多く（平年比200%）、日照時間はやや少なかった（平年比73%）。

6月上旬：最高気温、最低気温、平均気温とも平年より極めて低かった。降水量は平年より少なく（平年比25%）、日照時間は少なかった（平年比56%）。

6月中旬：最高気温、最低気温、平均気温とも平年よりやや高く、降水量、日照時間も平年並であった（降水量：平年比109%、日照時間：平年比84%）。




以上のことから、この1か月間（5月下旬～6月中旬）は、気温がやや低く、降水量は平年並で、日照時間はやや少なかった。

気象表

月 旬	平均気温(℃)			最高気温(℃)			最低気温(℃)		
	本年	10年平均	比較	本年	10年平均	比較	本年	10年平均	比較
5月 下旬	13.6	13.6	0.0	19.6	20.8	-1.2	7.9	7.0	0.9
6月 月上旬	9.4	14.6	-5.2	14.2	21.3	-7.1	5.9	8.6	-2.7
6月 月中旬	15.7	14.6	1.1	21.5	20.0	1.5	11.3	9.9	1.4

月 旬	降水量(mm)			日照時間(hr)		
	本年	10年平均	比較	本年	10年平均	比較
5月 下旬	33.0	16.5	16.5	51.7	70.8	-19.1
6月 月上旬	5.5	22.1	-16.6	35.4	63.1	-27.7
6月 月中旬	36.5	33.4	3.1	43.3	51.4	-8.1

注) 観測値は置戸町境野のアメダスによる（てん蔵の定期作況気象情報）。10年平均は前10か年の平均値である。



2. 当場の作況

注) 本作況報告は北海道立総合研究機構北見農業試験場の平年値に対する生育良否に基づいたものであり、網走管内全体を代表するものではありません。

1) 秋まき小麦（令和3年9月播種） 作況：平年並

月日	作況	事由
令和3年 11月20日	やや良	播種期は平年より7日早い9月16日であった。出芽期は平年より7日早い9月23日であった。播種が早く、出芽期以降の平均気温が平年並から高く経過したため、越冬前の草丈、茎数は平年を上回った。 以上のことから、目下の作況は「やや良」である。
令和4年 5月20日	平年並	根雪始は平年より12日遅い12月18日、根雪終は平年より1日早い4月6日で、根雪期間は平年より13日短かった。調査圃場は融雪剤を散布したため、融雪期が根雪の観測地点より10日早い3月27日で、雪腐病の発生は僅かに認められた。融雪後の平均気温は平年並から高かった。しかし、コムギ縞萎縮病が発生し、萎縮症状が認められ、草丈が平年をやや下回った。茎数は平年並であった。 以上のことから、目下の作況は「平年並」である。
6月20日	平年並	出穂期は平年より1日早い6月7日であった。草丈は平年をやや下回ったが、茎数は平年並であった。 以上のことから、目下の作況は「平年並」である。
7月20日		
8月20日		
11月20日		

生育データ

品種名		きたほなみ		
項目/年次		本年	平年	比較
播種期	(令和3年月.日)	9.16	9.23	△7
出芽期	(令和3年月.日)	9.23	9.30	△7
出穂期	(令和4年月.日)	6.07	6.08	△1
成熟期	(令和4年月.日)		7.25	
草丈 (cm)	(令和3年11月20日)	19.6	14.1	5.5
	(令和4年5月20日)	33.3	37.3	△4.0
	(令和4年6月20日)	82.5	86.9	△4.4
茎数 (本/m ²)	(令和3年11月20日)	1316	960	356
	(令和4年5月20日)	1364	1254	110
	(令和4年6月20日)	800	740	60
成熟期	稈長 (cm)		79	
	穂長 (cm)		8.3	
	穂数 (本/m ²)		688	
子実重 (kg/10a)			779	
同上平年比 (%)			100	
リットル重 (g)			801	
千粒重 (g)			40.8	
品質 (検査等級)			1	-

注) 平年値は前7か年中、27年(最豊)、令和2年(最凶)を除く5か年の平均。

2) 春まき小麦 作況：平年並

月日	作況	事由
5月20日	良	調査圃場は融雪剤散布により3月26日に融雪期となった。3月下旬から4月上旬の気温は高く、降水量は少なかったため、圃場の乾燥が進み、播種期は平年より5日早い4月11日となった。播種後の4月中下旬の気温は高く、出芽期は5日から6日早かった。出芽後の4月下旬から5月中旬の気温はやや高く、生育は進んでおり、草丈、茎数は平年を上回っている。 以上のことから、目下の作況は「良」である。
6月20日	平年並	6月上旬の平均気温が平年より極めて低かったため生育が緩慢となり、出穂期は平年より1～3日早いに留まった。草丈は平年より高いが、茎数は平年並である。 以上のことから、目下の作況は「平年並」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
11月20日		

作況データ

調査項目		春よ恋			はるきらり		
		本年	平年	比較	本年	平年	比較
播種期	(月.日)	4.11	4.16	△ 5	4.11	4.16	△ 5
出芽期	(月.日)	4.24	4.29	△ 5	4.25	5.01	△ 6
出穂期	(月.日)	6.19	6.20	△ 1	6.16	6.19	△ 3
成熟期	(月.日)		8.06			8.09	
草丈(cm)	(5月20日)	26.1	19.5	6.6	28.9	20.5	8.4
	(6月20日)	76.2	69.8	6.4	77.6	69.7	7.9
茎数(本/m ²)	(5月20日)	986	607	379	965	581	384
	(6月20日)	792	820	△ 28	754	799	△ 45
稈長(cm)	(7月20日)		95			90	
穂長(cm)	(7月20日)		8.3			7.7	
穂数(本/m ²)	(7月20日)		707			702	
子実重(kg/10a)			541			518	
同上平年比 (%)			100			100	
リットル重 (g)			791			787	
千粒重 (g)			39.1			39.9	
品質 (検査等級)			1	-		1	-

注) 平年値は前7か年中、令和3年(最豊)、平成29年(最凶)を除く5か年の平均。

3) とうもろこし (サイレージ用)

作 況：不良

月日	作況	事由
6月20日	不良	播種は平年より1日遅い5月17日に行った。播種直後は乾燥傾向であり、その後降雨があったものの、気温が極めて低かったことから出芽期は平年より14日遅い6月13日であった。6月20日現在の草丈は平年より18.5cm低く、葉数は3.3枚少ない。 以上のことから、目下の作況は「不良」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

生育データ

調査項目	KD320			
	本年	平年	比較	
播種期 (月・日)	5.17	5.16	1	
出芽期 (月・日)	6.13	5.30	14	
開花期 (月・日)		8.01		
抽糸期 (月・日)		8.01		
収穫期 (月・日)		9.26		
収穫時の熟度		黄熟初期	-	
草丈(cm)	(6月20日)	14.3	32.8	△ 18.5
	(7月20日)		169.1	
	(8月20日)		270.8	
稈長(cm) (9月20日)		244		
葉数(枚)	(6月20日)	2.4	5.7	△ 3.3
	(7月20日)		13.4	
	(8月20日)		15.4	
生総重(kg/10a)		6468		
乾物茎葉重(kg/10a)		976		
乾物雌穂重(kg/10a)		1023		
乾物総量(kg/10a)		1998		
同上平年比 (%)				
推定TDN収量(kg/10a)		1437		
同上平年比 (%)				
総体の乾物率 (%)		30.9		
乾雌穂重割合 (%)		51.1		
有効雌穂割合 (%)		100.0		

注) 今年度から調査品種を「KD320」に変更。平年値は前4か年の平均。

4) 大豆

作 況：やや不良

月日	作況	事由
6月20日	やや不良	播種は平年より1日早い5月20日に行った。播種後の著しい低温傾向により出芽期は平年より8日遅い6月11日だった。出芽後は高温傾向に転じたが、主茎長、本葉数とも平年を下回っている。 以上のことから、目下の作況は「やや不良」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

生育データ

品種名		ユキホマレ		
調査項目		本年	平年	比較
播種期	(月.日)	5.20	5.21	△ 1.0
出芽期	(月.日)	6.11	6.03	8.0
開花始	(月.日)		7.19	
成熟期	(月.日)		9.22	
主茎長 (cm)	(6月20日)	4.4	10.6	△ 6.2
	(7月20日)		48.3	
	(8月20日)		63.6	
	(9月20日)		63.8	
	(成熟期)		64.0	
本葉 数(枚)	(6月20日)	0.2	0.8	△ 0.6
	(7月20日)		7.3	
主茎節数	(8月20日)		10.6	
	(9月20日)		10.3	
	(成熟期)		10.3	
分枝数 (本/株)	(7月20日)		4.3	
	(8月20日)		5.5	
	(9月20日)		4.8	
	(成熟期)		4.9	
着莢数 (個/株)	(8月20日)		77.6	
	(9月20日)		72.0	
	(成熟期)		71.2	
一莢内粒数			1.93	
子実重(kg/10a)			329	
同上平年比 (%)				
百粒重 (g)			30.5	
屑粒率 (%)			1.5	
品質 (検査等級)			2上	

注1) 平年値は前7か年中、28年(最凶)、令和元年(最豊)を除く5か年の平均。

2) 子実重は水分15%換算。

3) 品質(検査等級)は造りによる検査である。

5) 小豆

作 況：やや不良

月日	作況	事由
6月20日	やや不良	播種は平年より1日早い5月20日に行った。播種後の著しい低温傾向により出芽期は平年より10日遅い6月17日で、主茎長、本葉数ともに平年を下回っている。以上のことから、目下の作況は「やや不良」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

生育データ

調査項目	エリモシヨウズ			きたろまん			
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	
播種期 (月.日)	5.20	5.21	△ 1	5.20	5.21	△ 1	
出芽期 (月.日)	6.17	6.07	10	6.17	6.07	10	
開花始 (月.日)		7.25			7.24		
成熟期 (月.日)		10.01			9.30		
主茎長 (cm)	(6月20日)	2.0	4.0	△ 2.0	2.4	3.8	△ 1.4
	(7月20日)		17.0			16.0	
	(8月20日)		65.6			67.3	
	(9月20日)		68.3			71.7	
	(成熟期)		69.3			70.5	
本葉数 (枚)	(6月20日)	0.1	0.4	△ 0.3	0.0	0.4	△ 0.4
	(7月20日)		6.5			6.2	
主茎節数	(8月20日)		14.3			13.5	
	(9月20日)		14.3			13.4	
	(成熟期)		14.1			13.5	
分枝数 (本/株)	(7月20日)		1.8			1.5	
	(8月20日)		4.0			3.3	
	(9月20日)		4.1			3.4	
	(成熟期)		4.2			3.4	
着莢数 (個/株)	(8月20日)		36.7			33.8	
	(9月20日)		52.3			48.8	
	(成熟期)		50.8			47.6	
一莢内粒数		6.45			6.2		
子実重(kg/10a)		370.0			353.0		
同上平年比 (%)		100.0			100.0		
百粒重 (g)		16.0			17.2		
屑粒率 (%)		8.8			5.4		
品質 (検査等級)		4上			4上		

注1) 平年値は前7か年中、平成28年(最凶)、令和元年(最豊)を除く5か年の平均。

2) 子実重は水分15%換算。

3) 品質(検査等級)は素俵による検査である。

6) 菜豆

作 況：やや不良

月日	作況	事由
6月20日	やや不良	播種は平年より1日早い5月20日に行った。播種後の低温傾向により出芽期は平年より2日遅い6月4日だった。出芽後も6月上旬は低温傾向が続き、草丈と本葉数はともに平年を下回っている。以上により、目下の作況は「やや不良」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

生育データ

調査項目	大正金時			
	本年	平年	比較	
播種期 (月・日)	5.20	5.21	△ 1	
出芽期 (月・日)	6.04	6.02	2	
開花始 (月・日)		7.10		
成熟期 (月・日)		9.03		
草丈 (cm)	(6月20日)	5.0	10.9	△ 5.9
	(7月20日)		38	
	(8月20日)		43.5	
	(成熟期)		42.8	
本葉数 (枚)	(6月20日)	0.2	0.7	△ 0.5
	(7月20日)		3.9	
主茎節数	(8月20日)		5.5	
	(成熟期)		5.5	
分枝数 (本/株)	(7月20日)		5.4	
	(8月20日)		5.0	
	(成熟期)		5.0	
着莢数 (個/株)	(8月20日)		20.6	
	(成熟期)		20.6	
一莢内粒数		2.82		
子実重(kg/10a)		296		
同上平年比 (%)		100		
百粒重 (g)		65.6		
屑粒率 (%)		25.8		
品質 (検査等級)		4上		

注1) 平年値は前7か年中、令和元年(最豊)、令和3年(最凶)を除く5か年の平均。

2) 子実重は水分15%換算。

3) 品質(検査等級)は造りによる検査である。

7) 馬鈴しょ 作 況：平年並

月日	作況	事由
6月20日	平年並	植え付けは平年並の5月11日に行った。5月中旬の気温が高かったため、萌芽期は平年より3～4日早かった。萌芽期は早かったが、6月上旬の低温により、両品種ともに茎長・茎数は平年並であった。 以上のことから、目下の作況は「平年並」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

調査項目	男爵薯			コナユタカ			
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	
植付期 (月.日)	5.11	5.11	0	5.11	5.11	0	
萌芽期 (月.日)	5.26	5.30	△ 4	5.29	6.01	△ 3	
開花始 (月.日)		6.29			7.04		
枯ちょう期 (月.日)		8.31			10.14		
茎長(cm)	(6月20日)	22.7	23.3	△ 0.6	11.6	13.4	△ 1.8
	(7月20日)		54			77	
	(8月20日)		54			97	
茎数(本/株)	(6月20日)	3.3	3.9	△ 0.6	2.0	2.7	△ 0.7
	(7月20日)		4.3			2.8	
上いも重(kg/10a)	(8月20日)		4849			3911	
	(9月20日)		4766			5613	
でん粉価(%)	(8月20日)		15.2			19.0	
	(9月20日)		15.2			21.0	
でん粉重(kg/10a)	(9月20日)		-			1117	
上いも数(個/株)			10.3			8.5	
上いも平均重(g)			106			175	
上いも重(kg/10a)			4766			6475	
同上平年比(%)			100			100	
でん粉価(%)			15.2			21.5	
でん粉重(kg/10a)			-			1328	
同上平年比(%)			-			100	

注) 平年値は前7か年中、平成30年(最凶)、令和3年(最豊)を除く5か年の平均

8) てんさい

作 況：不良

月日	作況	事由
5月20日	やや不良	<p>移植栽培の播種は、平年より1日遅い3月24日に行った。以降、4月中旬まで気温が高めに経過したため、育苗期間中の苗の生育は非常に良好であった。移植は、平年より2日早い5月2日に行った。前日まで土壌は乾燥していたが、移植直前の降雨で土壌が適湿となったため、活着は良好であった。その後は乾燥傾向が続き、5月上旬の強風も相俟って生育がやや抑制された。草丈、生葉数はほぼ平年並であったが、茎葉重は平年をやや下回っている。</p> <p>直播栽培の播種は平年より1日遅い5月7日に行った。播種時およびそれ以降に土壌が乾燥傾向であったため、出芽期は平年より1日遅い5月18日であったものの、出芽揃いが例年よりやや劣っている。</p> <p>以上のことから、目下の作況は「やや不良」である。</p>
6月20日	不良	<p>5月中の乾燥傾向は5月終わりの降雨で解消したものの、その後の低温傾向とやや少なかった日照時間のため、生育は抑制され、草丈、茎葉重、根重は大きく平年を下回っている。</p> <p>以上のことから、目下の作況は「不良」である。</p>
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

生育データ

調査項目	移植						直播			
	アンジー			アマホマレ			アンジー			
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較	
播種期 (月.日)	3.24	3.23	1	3.24	3.23	1	5.06	5.05	1	
移植期 (月.日)	5.02	5.04	△ 2	5.02	5.04	△ 2	-	-	-	
出芽期 (月.日)	-	-	-	-	-	-	5.18	5.17	1	
収穫期 (月.日)		10.19			10.19			10.20		
草丈 (cm)	(5月20日)	7.2	6.5	0.7	6.6	7.0	△ 0.4	-	-	-
	(6月20日)	15.0	24.7	△ 9.7	16.4	25.8	△ 9.4	10.6	14.0	△ 3.4
	(7月20日)		52.3			52.9			47.9	
	(8月20日)		57.8			59.0			59.5	
	(9月20日)		58.9			61.4			61.0	
生葉数 (枚)	(5月20日)	7.5	6.1	1.4	4.8	5.0	△ 0.2	-	-	-
	(6月20日)	11.9	12.4	△ 0.5	11.4	11.6	△ 0.2	7.2	8.8	△ 1.6
	(7月20日)		21.0			20.2			18.9	
	(8月20日)		27.9			25.9			26.1	
	(9月20日)		30.5			28.8			27.6	
茎葉重 (g/個体)	(5月20日)	0.9	1.2	△ 0.3	0.9	1.4	△ 0.5	-	-	
	(6月20日)	25	76	△ 51	24	81	△ 57	8	13	△ 6
	(7月20日)		497			551			337	
	(8月20日)		764			824			690	
	(9月20日)		740			840			716	
根重 (g/個体)	(6月20日)	5	16	△ 11	5	19	△ 14	0	1.0	△ 1
	(7月20日)		270			265			125	
	(8月20日)		738			735			571	
	(9月20日)		1031			1028			854	
根周 (cm)	(7月20日)		23.5			23.0			17.7	
	(8月20日)		34.0			32.7			30.4	
	(9月20日)		38.1			37.5			35.1	
根中糖分 (%)	(9月20日)		16.50			16.90			16.70	
茎葉重(kg/10a)	(収穫期)		4814			5494			4726	
根重(kg/10a)	(収穫期)		7661			6982			6478	
同上平年比 (%)			100			100			100	
根中糖分 (%)	(収穫期)		18.50			19.10			18.60	
同上平年比 (%)			100			100			100	
糖量(kg/10a)	(収穫期)		1412			1331			1209	
同上平年比 (%)			100			100			100	

注1) 平年値は前7か年中、令和3年(最豊)平成28年(最凶)を除く5か年の平均。

注2) 本年から、調査品種を「リッカ」から「アンジー」に換えて供試。

9) 牧草 (チモシー)

作 況 : 平年並

月日	作況	事由
5月20日	平年並	萌芽期は平年より2日早い4月18日で、冬損は認められなかった。萌芽後は気温が平年より高く経過したものの、降水量は5月上旬以外平年より少なかった。5月20日現在の草丈は平年より3cm低い37cmであり、被度は100%であった。 以上のことから、目下の作況は「平年並」である。
6月20日	平年並	6月上旬が平年より低温であったものの、5月下旬および6月中旬は平年並からやや高温で推移したことから、1番草の出穂始は平年より1日早い6月9日、出穂期は平年と同日の6月14日であった。刈取時の草丈および出穂程度は平年並であり、乾物収量も平年比102%と平年並であった。 以上のことから、目下の作況は「平年並」である。
7月20日		
8月20日		
9月20日		
10月20日		
11月20日		

生育データ

品種名 調査項目		なつちから		
		本年	平年	比較
萌芽期	(月. 日)	4.18	4.20	△ 2
冬損程度		1.0	1.2	△ 0.2
被度 (%)	(5月20日)	100	100	0
	2番草再生時		100	
出穂始 (月. 日)		6.09	6.10	△ 1
出穂期 (月. 日)		6.14	6.14	0
出穂程度	1番草	7.8	7.2	0.6
節間伸長程度	2番草		4.1	
収穫日	1番草	6.17	6.16	1
	2番草		8.05	
	3番草		10.02	
倒伏程度	1番草	1.0	1.0	0.0
病害罹病程度	1番草		1.0	
	2番草		2.4	
	3番草		3.1	
草丈(cm)	(5月20日)	37	40	△ 3
	(6月5日)	67	73	△ 6
	1番草		96	
	2番草再生時		39	
	2番草		66	
	3番草再生時		36	
生草収量 (kg/10a)	1番草	2,504	2,375	129
	2番草		822	
	1 + 2番草計		3,197	
	3番草		436	
	合 計		3,633	
乾物率 (%)	1番草	22.3	23.2	△ 0.9
	2番草		25.6	
	3番草		28.7	
乾物収量 (kg/10a)	1番草	557	549	8
	同上平年比 (%)	102	100	2
	2番草		208	
	同上平年比 (%)		100	
	1 + 2番草計		757	
	同上平年比 (%)		100	
	3番草		124	
	同上平年比 (%)		100	
合 計		882		
同上平年比 (%)		100		

注1) 平年値は前7か年のうち平成28年(最豊)、令和3年(最凶)を除いた前5か年の平均値。

注2) 冬損程度は1:無または微~9:甚。出穂程度および節間伸長程度は1:無~9:極多。倒伏程度および病害罹病程度は1:無または微~9:甚。病害は主に斑点病。