2015/3/30 ==========
△　　林業試験場メールマガジン
△△△　▲
△△△△▲▲▲　　『北の森の達人』
□▲▲▲▲▲
----□----■---------- Vol.42　第42号

□■□読者の皆様へ□■□

いつも林業試験場メールマガジン『北の森の達人』をお読みいただき、
ありがとうございます。

林業試験場メールマガジン『北の森の達人』は、北海道の森林・林業・身近な
みどりに関わる情報を皆様に直接お届けするメールマガジンです。

/_/_/_

造成地の不成績地などを中心に分布していることがあげられる。養蜂業のミツバチはイチゴやリンゴなどのポリネーション（花粉交配）に利用されるが，ポリネーション終了後にニセアカシアの開花期を迎えるため，疲弊したミツバチの建勢にニセアカシアが貢献する。

２　道産多年生ツル植物でグリーンカーテンを

山田健四・棚橋生子
札幌市と美唄市において，グリーンカーテンの温度抑制効果や心理的効果，グリーンカーテンの生育状況などを調査した。グリーンカーテンは壁面付近の気温を最大15℃以上低下させ，利用者アンケートからも肯定的な意見が得られた。道産多年生ツル植物は初夏の生育高を稼ぐことが可能であるが，被覆率はクズ以外の種では低い値にとどまり，効果的に被覆を得るためには一年生植物との組み合わせが望ましいことが分かった。

３　カラマツの天然更新地はどうなった？

中川昌彦
　カラマツの天然更新地がカラマツ林に成林するかどうかを探るため，過去に報告されてきた道内のカラマツ天然更新地の現況を調査した。その結果，カラマツ林が成林しているかどうかを判断するのが可能であった12箇所のうち，広葉樹林化が1箇所，混交林化（広葉樹＋カラマツ）が5箇所，成林が6箇所であった。また成林していた6箇所のうち4箇所は耕作放棄地または農地法面であり，林地においてカラマツ林が成林していたのは，8箇所中わずか2箇所であった。カラマツが天然更新してもその後広葉樹林化あるいは広葉樹との混交林化する可能性が高いと考えられた。

/_/_/_