

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK26)

(函館水試担当地区)

2013年1月7日

函館水産試験場調査研究部

-: 欠測

地点 海域 透明度(m)	月日	深度 (m)	水温 (°C)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種*			備考
					At 細胞/L	A.o. 細胞/L	D.fortii 細胞/L	D.acum. 細胞/L	属の他種 細胞/L	
八雲	12/21	0	7.5	33.94	0	0	0	0	0	
噴火湾西部		5	7.5	33.95	0	0	0	0	0	
19.0		10	7.5	33.95	0	0	0	0	0	
		15	7.5	33.95	0	0	0	0	0	
		20	7.5	33.95	0	0	0	0	0	
		25	7.5	33.95	0	0	0	0	0	
		30	7.5	33.95	0	0	0	0	0	

**D.fortii*=*Dinophysis fortii* ティノフィス フォルティ; *D.acum.*=*Dinophysis acuminata* ティノフィス・アキュミナータ

Alexandrium アレキサンドリウム =旧名 プロトニコラックス, At=Alexandrium tamarense, Ao=Alexandrium ostenfeldii

Dn=*Dinophysis norvegica* ティノフィス ノルヴェジカ, Dt= *Dinophysis tripos* ティノフィス トリポス

Dm=*Dinophysis mitra* ティノフィス ミトラ, Dc=*Dinophysis caudata* ティノフィス コウダータ

Di=*Dinophysis infundibula* ティノフィス インファンデブラ, Dru=*Dinophysis rudgei* ティノフィス ルジエイ

Dro=*Dinophysis rotundata* ティノフィス ロテュンダタ

コメント

麻痺性貝毒プランクトンは噴火湾西部には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは噴火湾西部には出現していません。

水温は12月中旬は、噴火湾西部では7.5°Cです。