トドマツ人工林の林分閉鎖と
密度管理に関する研究

増田 憲二郎*

The study of the stand closure and the stand density
control of planted forests of *Abies sachalinensis* MAST.

Kenjirō MASUDA*

目 次

はじめに	31
材料と方法	31
定 義	33
適用と結果	35
1. クローネ曲線式の適用	35
2. 枝張り生長曲線式の適用	36
3. 未閉鎖林分における交点枝張り	36
交点枝張り図	37
1. 樹高と交点枝張り	37
2. 本数密度別の交点枝張り	37
3. 林分閉鎖比	38
4. 枯れ上り枝張りの林分閉鎖比	38
5. 基準林分の交点枝張り	38
6. 林齢線と直径線	39
7. 交点枝張り図の構成	40
交点枝張り図の利用	40
1. 林分の閉鎖区分	40
2. 年輪密度管理図	41
3. 交点の高さの読み取り	42
4. 交点枝張りとは枝打ちの許容高	43
5. 林分閉鎖の診断と予測	44

* 北海道立林業試験場 Hokkaido Forest Experiment Station, Bibai, Hokkaido 079-01

[北海道林業試験場報告 第21号 昭和58年12月 Bulletin of the Hokkaido Forest Experiment Station, No. 21 December, 1983]

考 察	47
摘 要	48
文 献	49
Summary	49
付 録 1. クローネ曲線の求め方	51
" 2. 林分の閉鎖と生長の解析	53
" 3. トドマツ年輪密度管理図	54
" 4. 林分閉鎖早見図のつくり方	58

図 表 目 次

図- 1 クローネの閉鎖模式図	34
" - 2 樹高に対するクローネ曲線	35
" - 3 樹高に対する係数Cの分布	35
" - 4 立木本数密度差と係数Cの变量との相関	35
" - 5 枝張り生長曲線	36
" - 6 幼樹の樹高と枝張りとの相関	36
" - 7 樹高と係数Cおよび交点枝張りとの関係	37
" - 8 基準林分の交点枝張り線	39
" - 9 基準林分の林齢線と直径線	39
" - 10 交点枝張り模式図	41
" - 11 基準林分の過閉鎖度	41
" - 12 年輪密度管理模式図 (等年輪幅線を基準にした本数管理例)	42
" - 13 交点の高さとクローネの枯れ上り高	43
図版 I トドマツ交点枝張り図	45
図版 II 林分閉鎖早見図	46
" III 年輪密度管理図 (トドマツ I 等地)	55
" IV " (" II ")	56
" V " (" III ")	57
表- 1 供試木一覧表	32
" - 2 枝枯れまでの所要時間	43
付図- 1 遡り年のクローネ曲線の描き方	51
" - 2 樹幹・年枝生長の半縦断面図	51
" - 3 クローネ曲線の係数および定数の読み取り方	52
" - 4 年輪幅直径生長	53
" - 5 林分閉鎖早見図のつくり方	58
付表- 1 枝傾斜角交会点の座標値	51

はじめに

クローネの形と大きさは、林木の生長を判断する最良の指標と考えられている。しかしながら、クローネの形状に基づいて林分管理を行なうという手法は、現在までのところ開発されていない。

この研究は、トドマツ人工林の樹高生長を基準において、クローネの形状と林分閉鎖との関係を明らかにし、これをもとに、立木本数密度、林齢、年輪幅の相互関係にまで考察を及ぼし、年輪幅に目標を置いた林分管理の指針を得ようとしたものである。

この研究においてわたくしは、枝張りの競合に基づくクローネ形状の変化に着目した。そこで本来のクローネ形状を、梢頭部から下方に向うクローネ半径の外縁を表わす放物線状の曲線（クローネ曲線）と、林齢の経過によって上昇拡大する最大枝張りの生長経過を表わす曲線（枝張り生長曲線）との合成によるものとして理解した。これを表わす方法として、それぞれの曲線に適合する曲線式を導いて、両式で描かれる曲線の交点を幹軸からの距離で表わし、これを交点枝張りとして用いた。

この過程においてわたくしは、クローネ曲線が、林分生長に伴って生長することを、また同一樹高ならば、立木本数密度の影響をうけて変化することを見いだした。したがって、交点枝張りもまた樹高生長とともに生長し、立木本数密度の影響をうけて変化する。言い換えれば、交点枝張りを仲立ちとすることによって、樹高と本数密度との間にある諸関係を知ることができるし、これをもとに、林分の混み合い方についての情報をも得ることができるわけである。この関係を、樹高と交点枝張りとの関係で表わす交点枝張り図として図示した。

また、基準となるような林分の交点枝張りを仲立ちとして、同図に直径および林齢を導入し、これら相互の関係を把握することを試みた。

また、これらの試みによって得られた成果に基づいて年輪密度管理図を作成することにより、任意の年輪幅に目標を置いた最適植栽密度の選定にはじまる密度管理の指針を見いだした。

さらにまた、密度管理に伴って現われる枝打ち許容高の求め方のほか、林分閉鎖に関して、閉鎖現況の診断や、閉鎖の推移を予測する方法を見いだした。

本研究に用いた資料を得るための調査に際し、多大の協力を賜った鈴木 巖氏、ならびに本稿の編集にあたり、とくに貴重な助言を賜った道立林業試験場の菊沢喜八郎博士、東浦康友氏、ならびに、英文の校閲に協力を賜った Mr. + Mrs. — Saul & Mary Kay Stensvaag 両氏の各位に対し、心より謝意を表す。

材料と方法

本研究は、主として昭和 35 年から同 36 年に、道有林池田経営区川上・久保の両地域において、表 1 に掲げた林分を対象に実施したものである。

調査の方法は、それぞれの林分ごとに設けた標準地内の胸高直径 6 cm 上の立木を対象にして、胸高直径の頻度分布のモードの中から枝張りの整った木を選んで供試木とし、これにそれぞれの地域名と標準地番号を付して表わし、つぎの調査を行った。

年枝の生長調査：川上地域の 4 本の供試木に対して、樹高および枝階ごとの節間長を測定した。さらに枝階ごとに、着生しているすべての枝について枝の年伸長量を 5mm 括約で計測し、これを枝階ごとの

平均年枝長で表わした。これをもとに、付録1の方法により、5年づつ遡った年次ごとの枝長を連らねて、年枝生長の半縦断面図（付図-2参照）として表わした。また年枝数の減少経過をみるため、枝階ごとの年枝数を生・枯別に区分して扱い、また着生枝の1/2枝数未満となる年枝端をマークして、これを枝張り生長の限界として扱った。

枝長調査：久保地域（2-52林小班）の供試木5本に対しては、樹高と枝階ごとの節間長とを測定し、さらに枝階ごとに、着生しているすべての枝について枝長を樹上で測定し、これを枝階ごとの平均枝長で表わした。これをもとに、上と同様の方法により、現在における枝長生長の半縦断面図に表わした。

閉鎖前の年枝長調査：上と同様の方法により、両地域の供試木各4本（久保地域は枯れ枝が残っている2-56林小班）の残存枯れ枝を対象に、閉鎖前における年枝長を測定し、これを年枝生長の半縦断面図に表わした。

樹幹解析調査：川上地域の供試木（胸高直径の頻度分布のモード）4本を樹幹解析し、クローネ生長との関連性を見やすくするため、樹幹生長の半縦断面図（付図-2参照）を前図に並べて表わした。

年輪幅生長の調査：過閉鎖の影響で単木の生長が衰えはじめた時期を知るため、両地域のモードとその周囲木を含めて、尾根方向（久保地域については直行する4方向）の高さ1.3mにおける生長錐片を採取し、樹心に近い部分を除外して年輪幅を測定した。

枝張り生長の調査：函館市桔梗町道立林業試験場道南支場構内に一列植栽された12年生トドマツ108本を対象に、周囲からの枝圧をうけない幼樹の樹高と枝張りとを測定した（昭和56年9月）。

表-1 供試木一覧表
Table 1. Sample trees table

林小班 Division (Location)	樹齡 Tree age (year)	標準地面積 Area of Sample plot (m ²)	植栽本数 Planting density (No./ha)	現存本数 Number of trees per hectare (No./ha)	供試木の表示 Mark of sample tree 地域名 Location (No.)		胸高直径 Diameter at breast height (cm)	樹高 Tree height (m)	
(Ikeda) 114-52	34	504	3, 809	2, 718	Kawakami	12	16.38	14.94	
	"	960	2, 875	2, 375	"	1	13.35	13.01	
	"	1, 000	1, 840	1, 650	"	3	16.31	13.57	
	"	1, 000	1, 460	1, 310	"	11	18.96	14.15	
平均 Average			2, 496	2, 013			16.25	13.92	
(Ikeda) 2-52	36	400	4, 449	2, 544	Kubo	1	14.40	12.80	
	"	400	"	3, 380	"	2	14.40	13.20	
	"	400	"	2, 988	"	3	14.40	12.59	
	"	400	"	3, 305	"	4	11.00	11.77	
	"	2, 000	"	3, 802	"	523	14.60	15.05	
平均 Average			4, 449	3, 204			13.76	13.08	
(Ikeda) 2-52	36	————	4, 449	3, 802	{	Kubo	92	26.00	16.66
						"	709	22.00	15.63
						"	283	18.00	16.23
						"	367	14.00	15.50
(Ikeda)2-56	26	————	————	3, 134	{	Kubo	5	14.00	—
						"	6	13.00	—
						"	7	14.00	—
						"	8	12.50	—
(Kikyō) 道南支場構内	12	————	(1列植栽)	————	————	————	————	2.36	

定 義

この論文で使用する概念をつぎのように定義する。

クローネ曲線：クローネの半縦断面図のうち、被圧をうけないクローネ部分について、梢頭より下方へ枝の先端を連らねた放物線状の曲線を“クローネ曲線”と定義する（図-1 参照）。

クローネ曲線は、疎開木、林内木を問わず、付録1で誘導した次の2次曲線で近似できる。すなわち、座標原点から下向きに表わした縦軸に v 、横軸に y_0 をとり、 $y_0 = a$ 、 $v = b$ をそれぞれ梢頭の座標値とし、梢頭からの幹軸の長さを x 、幹軸からのへだたりを y とすると、

$$y = C \left(\sqrt{v - \frac{v}{k}} \right) - a \left\{ \dots \dots \dots (1) \text{ 式}^* \right.$$

$$v = b + x$$

ただし、 a 、 k はともに定数、 C は媒介変数（以下これを係数 C とする）である。

枝張り生長曲線：最長の枝長が所在する枝階は、樹齢が増すにつれて上位枝階に移っていく。林齢の経過とともに上昇していく最長枝階の枝長端を根元樹心部から上方に連らねて得られる経路は、林分の閉鎖以前における最大枝張りの生長経過を表わしている。この経路をしめす放物線状の曲線を“枝張り生長曲線”と定義する（図-1 参照）。

枝張り生長曲線は、クローネ曲線と同様な次の2次曲線によって近似できる。すなわち、座標原点から上向きにとった縦軸に v' 、横軸に y_0 をとり、 $y_0 = a'$ 、 $v' = b'$ をそれぞれ樹幹根元の座標値とし、根元からの幹軸上の長さを h 、幹軸からのへだたりを y とすると、

$$y = C' \left(\sqrt{v' - \frac{v'}{k'}} \right) - a' \left\{ \dots \dots \dots (2) \text{ 式} \right.$$

$$v' = b' + h$$

ただし、 a' 、 k' はともに定数、 C' は媒介変数である。

交点枝張り：クローネ曲線と枝張り生長曲線との交点によって、幹軸からの距離で表わされる枝張り半径（図-1 参照）を“交点枝張り”と定義する。

交点枝張りは、林分の閉鎖前は、クローネの半径に一致する。また交点枝張りにおいては、樹高を H とすると $H = h + x$ となる。

閉鎖枝張り：林分内における単木の平均占有面積を S とする。今、面積 S に等しい円の半径を r とすると、 $r = \pi^{-\frac{1}{2}} S^{\frac{1}{2}}$ で表わされる。交点枝張り y が、ちょうどこの円の半径に等しくなったとき、この交点枝張り（図-1 参照）を“閉鎖枝張り”と定義する。閉鎖枝張りを y_r で表わすと $y_r = \pi^{-\frac{1}{2}} S^{\frac{1}{2}}$ である。

樹間距離枝張り：交点枝張り y が、ちょうど平均樹間距離に等しくなったとき、この交点枝張り（図-1 参照）を“樹間距離枝張り”と定義する。今、平均樹間距離を I で表わすと、 $I = S^{\frac{1}{2}}$ であるから、樹間距離枝張り y_1 は、

$$y_1 = S^{\frac{1}{2}} \dots \dots \dots (3) \text{ 式}$$

である。したがって、 y_r と y_1 との間には、次の関係が成り立つ。

$$y_r = \pi^{-\frac{1}{2}} y_1 = 0.564 y_1 \dots \dots \dots (4) \text{ 式}$$

* 曲線式の誘導は付録1を参照

枯れ上り枝張り：クローネ曲線と枝張り生長曲線との交点できまる交点枝張りは、林齢の増加に伴って、隣接木との競合に関係なく、しだいに上方へ移動拡大していく。これに対して、実際の枝張りは、隣接木との競合による制限を受け、枝長生長は、ある限界に達する。交点枝張りが、このような枝長生長の限界に到達した場合に、この交点枝張り（図-1 参照）を“枯れ上り枝張り”と定義する。枯れ上り枝張りは、 y_L で表わし、そのときの過閉鎖度は f_L で表わすことにする。

過閉鎖度：林分の交点枝張りが、ちょうど閉鎖枝張り y_F に達したとき、この林分は閉鎖したと定義する。閉鎖したのち、さらにクローネが伸長、拡大した林分を“過閉鎖林分”と呼ぶ。これに対し、閉鎖以前の林分を“未閉鎖林分”と呼ぶ。

過閉鎖林分の交点枝張りは、 $y_1 - y_F$ （図-1 の δ ）を基準において、

$$y = f(y_1 - y_F) + y_F \dots \dots \dots (5) \text{ 式}$$

で表わすことができる。このときの係数 f を“過閉鎖度”と定義する。

過閉鎖度 f は、交点枝張り y が、閉鎖枝張り y_F に達したときを 0、樹間距離枝張り y_1 に達したときを 1 とし、0 以下または 1 以上になることもあり得るとする。 f が負の場合は、未閉鎖林分を表わしている。

4 式の定数を用いると、5 式は次のように書き替えることができる。

$$y = (0.436f + 0.564) y_1 \dots \dots \dots (6) \text{ 式}$$

6 式より過閉鎖度 f は、

$$f = 2.2936 \left(\frac{y}{y_1} - 0.564 \right) \dots \dots \dots (7) \text{ 式}$$

として求められる。

林分閉鎖比：樹間距離枝張り y_1 に対する交点枝張り y の比は、林分の閉鎖度合いの指標となるので、 y/y_1 を“林分閉鎖比”と定義する。林分閉鎖比は、6 式を書き替えることにより、次のように与えられる。

$$\frac{y}{y_1} = 0.436f + 0.564 \dots \dots \dots (8) \text{ 式}$$

立木本数密度がわかれば、林分閉鎖比に樹間距離枝張り y_1 を乗じて交点枝張り y が得られる。

林分疎開比：林分閉鎖比の逆比 y_1/y を“林分疎開比”と定義する。樹高がわかれば、林分疎開比に交点枝張り y を乗ずることによって該当する立木本数密度が得られる。

図-1 クローネの閉鎖模式図
 Fig. 1. A model picture of crown closure
 S : 1 本当りの占有面積, r : S の半径
 l : 平均樹間距離, L : 枝長生長の限界線までの枝張り半径
 δ : $l - r$
 S : The area per tree (i.e. $\frac{\text{total area}}{\text{no. of trees}}$) in a stand
 r : The radius of a circle S
 l : The average distance between trees
 L : The distance from the center of the trunk to the terminal line of (horizontal) branch growth
 δ : $l - r$
 y : Branch expansion radius intersection (i.e. a theoretical crown radius derived from the intersection of a crown radius curve and an extrapolated branch development curve).
 y_F = the value of y where $y = r$
 y_1 = the value of y where $y = L$
 y_0 = the value of y where $y = l$

適用と結果

1. クローネ曲線式の適用

クローネの半縦断面図の形状は、梢頭から下方に向う放物線状のクローネ曲線と、幹軸根元から上方に向う放物線状の枝張り生長曲線との合成によって規定できるが、隣接木との競合がはじまるあたりからこの形がくずれ、やがては枝枯れを起こしてクローネの一部が消失しはじめる。

年枝長の測定結果に基づいて描いた、供試木のクローネを表わした付図-2の年枝生長の半縦断面図に対し、付録1の方法により、被圧をうけないクローネ部分がちょうど一致する放物線状の曲線(図-2)を描き、この曲線について1式を適用することとし、図-2の曲線ごとに、1式の定数 a 、 k および C を求めた。定数 a は $\frac{\text{平均}1.013\text{m}}{0.974\sim 1.08\text{m}}$ で、樹高に
関係なくほぼ一定の値となり、近似的に、定数 $a=$
1 mの適合を認めた。また定数 k は $\frac{\text{平均}20.046}{19.539\sim 20.638}$
で、ほぼ一定の値をとるのでそれらの平均値により、
近似的に $k=20$ の適合を認めた。

以上の実験結果に基づく定数 a および定数 k を用いると、隣接木の被圧をうけないトマツ人工林の林内木のクローネに対しては、どの例においても比較的良好な適合が得られ、クローネ曲線としての1式は、十分に良い近似を与えるものと考えられた。

とくに、クローネの拡張度合いに関係をもつ1式の係数 C の値は、林分間において若干の違いが認められた。この違いは、林分の平均樹高の違い(図-3参照)に依存しているほか、林分の本数密度の違い(図-4参照)にも依存していることがわかる。

すなわち図-4には、樹高 13.5mにおける平均値に対する各林分ごとの係数 C の差を縦軸にとり、立木本数密度を横軸にとって両者の関係を表したが、両

図-2 樹高に対するクローネ曲線
Fig. 2. Crown radius curves at various heights

図-3 樹高に対する係数 C の分布
Fig. 3. Distribution of C for various heights

図-4 立木本数密度差と C の変量との相関
Fig. 4. Correlation of change in value of C to stand density difference

者の間には、 $r = 0.9984$ の高い相関がみられた。

以上のことから、クローネ曲線式の係数 C は、樹高生長と立木本数密度とによって変化するパラメーターであることが結論される。

2. 枝張り生長曲線式の適用

図-5は、2式による枝張り生長曲線式の適用例である。すなわち、両地域における供試木各4本の資料から、それぞれの年枝長を表わした枝張りの半縦断面図を描き、これを用いて、林分閉鎖に至るまでの最長枝階の枝長端（年枝長は、当該年ごとの残存年枝の平均で表わし、残存年枝数が枝数の $1/2$ に満たないものおよび枝張り 1.5m 以上は除く）の通過経路を打点したものである。

最長枝階の枝長端の通過経路は、周囲からの被圧の影響を大きくうけるが、林分単位で見れば、保育の程度が同じであれば平均的にはほぼ同一の経過をたどることが予想されるので、同図の打点のばらつきに対する平均分布線に対し、次のようにさきの2式を適用した結果、定数 $a' = 1\text{ m}$ 、定数 $k' = 20$ 、係数 $C' = 1.5$ によって十分適合できることを認めた。

$$y = 1.5 \left(\sqrt{v'} - \frac{v'}{20} \right) - 1 \quad \left. \vphantom{y} \right\} \\ v' = b' + h$$

枝張り生長曲線の係数 C' は、 $1.2 \sim 1.8$ の間に分布したが、樹高、本数密度のちがいに基づく林分間の差は認められず、これらの分布は、平均的にただ一つの曲線で近似できるようである。

3. 未閉鎖林分における交点枝張り

上で述べたように、枝張り生長曲線は、樹高、本数密度に関係なく、唯一の生長曲線の適用が可能である。これに対しクローネ曲線は、樹高および本数密度の影響をうけることが確認できた。ただし未閉鎖林分においては、本数密度の影響は無視されるので、クローネ曲線は樹高のみによって決定されることになる。したがって両曲線の交点も、樹高のみの関数として表わすことが可能と考えられる。

図-6には、函館市桔梗町道立林業試験場道南支場構内に1列植栽された周囲からの被圧をうけない108本の12年生トドマツを対象として、樹高と交点枝張り半径とをしめしたが、これによると両者の関係は、次の式で表わす直線で近似することができた。

$$\left. \begin{aligned} H &= 5.73y - 1.07 \\ (r &= 0.7006) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (9) \text{ 式}$$

ただし、 H は樹高、 y は交点枝張り半径である。

図-5 枝張り生長曲線
Fig. 5. An "extrapolated branch development curve"

図-6 幼樹の樹高と枝張りとの相関
Fig. 6. Correlation map between height and longest radius of crown branches of young trees

交点枝張り図

1. 樹高と交点枝張り

クローネ曲線と枝張り生長曲線とが決定されれば、この両者の交点は容易に求めることができる。この場合、枝張り生長曲線は、林齢、本数密度にかゝりなく一つの曲線で近似できた。一方クローネ曲線は、樹高と係数Cの値とによって、位置および形状を変化させた。したがって、樹高と係数Cの値とを与えれば交点枝張りが求められる。

図-7は、縦軸に樹高を、横軸に交点枝張りをとり、クローネ曲線の係数Cの値に応じて、樹高ごとに両曲線を突き合わせて、両者の関係をしめたものである。係数Cの値が一定のまま推移する場合には、交点枝張りは樹高の伸長とともに曲線状に単調増加する。

2. 本数密度別の交点枝張り

クローネ曲線の係数Cの値は、樹高が一定であれば、本数密度にのみ依存して変化する(図-4参照)。そこで、図-4の相関結果に基づいて、樹高13.5mでの本数密度に対する係数Cの値を計算し、これを同樹高に対応する本数密度区分点として図-7にしめた。

一方、未閉鎖林分における交点枝張りは、それぞれの樹高階における交点枝張りの上限値をしめすものである。この上限値として、表-1に掲げた12年生の被圧をうけない植栽木で求めた9式の値を用いて、図-7に直線を描いた。

この線を外挿すると、係数Cによって本数密度を区分した樹高13.5mは、493本の閉鎖枝張り2.54と交わり本数密度区分点と良好に一致するので、この線の妥当性が裏付けられたものとする。この線を“疎開木の交点枝張り線”と呼ぶ。

図-7 樹高と係数Cおよび交点枝張りとの関係
Fig. 7. The relationship between Height, coefficient C and y

現実林分においては、それぞれの本数密度に応じて、ある段階において林分は閉鎖する。これは交点枝張り y_r と、それぞれの本数密度とによって一意的に定まる4式の閉鎖枝張り y_r とが一致する点である。したがって、疎開木の交点枝張り線上に、それぞれの本数密度で定まる y_r を押えることができるから、これがすなわち本数密度別の閉鎖枝張りとなる。

閉鎖開始時点における本数密度別の区分点をしめすこれらの点と、さきに述べた樹高13.5mにおける本数密度区分点のそれぞれ同じ密度の点とを直線で結び、これを「本数密度別の交点枝張り線」と呼ぶことにする。

本数密度別交点枝張り線は、それぞれの本数密度で林分が生長していく場合の樹高に対応した交点枝張りの生長経路を表わしている。したがってこれは、樹高生長に伴うクローネ曲線の係数Cの変化過程をしめしているものと理解されよう。

以上のことから、それぞれの本数密度を有する林分における樹高に対する交点枝張りの経路を、次のようにまとめることができる。すなわち、未閉鎖段階においては、疎開木の交点枝張り線上を左下から右上方向へ直線的に推移する。そして、それぞれの本数密度別の閉鎖枝張りに到達した後は、この点を境に折れ曲がり、本数密度別交点枝張り線上を右上方向に推移する。この図を用いると、任意の樹高と本数密度とに対応する交点枝張りを知ることができる。

3. 林分閉鎖比

本数密度で一意的に定まる樹間距離枝張り y_r と、交点枝張り y との比が林分閉鎖比であった(8式)。したがって、本数密度が一定のまま、樹高の増大に伴って交点枝張りが増大していく場合、林分閉鎖比は単調に増加する。

本数密度が一定であれば、8式より、林分閉鎖比は交点枝張りのみによって容易に計算できる。この計算結果を図-7の本数密度別の交点枝張り線上に打点して表わした。同図にしめたように、本数密度別の交点枝張り線上のそれぞれ等しい林分閉鎖比をしめす点を結んだものが「等林分閉鎖比線」である。

林分閉鎖比を用いると、林分の相対的な閉鎖度合いの判断が可能となる。またこれを7式に適用すれば、林分閉鎖比から過閉鎖度 f が容易に求められる。

4. 枯れ上り枝張りの林分閉鎖比

年枝生長の半縦断面図から、供試木ごとの枯れ上り枝張り y_L を読み取って、8式を適用して求めた結果によると、枯れ上り枝張りの林分閉鎖比は $\frac{\text{平均}0.797}{0.610 \sim 0.933}$ となった。各供試木ごとの y_L は、周囲木との関係位置による影響の現われと言えるので、林分の平均樹間距離に対するものとは、多少異なる値で現われている。したがって、これらの平均値を用いることとし、枯れ上り枝張りの林分閉鎖比を0.8と決定した。

(図-7の等林分閉鎖比0.8の線は、枯れ上り枝張りに達する樹高を本数密度別にしめしていることとなる。)これを7式に適用すると、枯れ上り枝張りの過閉鎖度は0.54となる。

5. 基準林分の交点枝張り

交点枝張り y と樹高との関係を表わす図上に、全道トドマツ人工林収獲予想表の主林木によって、地位別にそれぞれの本数に対応する樹高を打点して各点を結んで図-8にしめた。これを「基準林分の交点枝張り線」と呼ぶ。

図-8によると、各地位ともほぼ1本の直線上に配列し、地位による差は、同図上では区別できない

ことが確められた。収穫予想表による地位の差は、すべて樹高に還元されることから考えて、これは当然の結果ともいえるが、地位に関係なく交点枝張りが求められることは、実用上は好都合なことといえる。基準林分の交点枝張り線を使用すれば、樹高に対応する交点枝張りを、または交点枝張りから一般的な樹高を求めることができる。

6. 林齢線と直径線

さきに用いた収穫予想表により、地位別に、林齢と樹高および樹高と直径の関係曲線を得た。この曲線を組み込むために、林齢および直径を同一目盛で横軸にとり、縦軸に樹高をとって、それぞれの関係曲線を描いた（図-9）。

図-8 基準林分の交点枝張り線
Fig. 8. Branch expansion radius intersection line from Yield Table stand

図-9 基準林分の林齢線と直径線
Fig. 9. Stand age line and trunk diameter growth curve from Yield Table stand

7. 交点枝張り図の構成

以上の諸関係曲線を組み合わせることにより、交点枝張り図（図版 I 参照）を構成した。交点枝張り図は、横軸に交点枝張りを、縦軸に樹高をとって、樹高生長に伴う交点枝張りの生長経過を本数密度別にしめす図であり、さらにこの図の樹高 26m の横軸に直径および林齢をとって、樹高と、直径または林齢との関係をしめす曲線を組み合わせたものである。これにより、樹高を媒介にして、3者間の相互関係をしめすとともに、交点枝張りを媒介にして本数密度との関係をもしめしている。本数密度が一定の林分においては、交点枝張りとの関係をしめす線は、はじめは疎開木の交点枝張り線上を推移し、本数密度により決まるそれぞれの閉鎖開始点を境にして折れ曲がり、その後は本数密度別交点枝張り線上を推移する。本数密度が一定のもとでは、樹高および交点枝張りの増加に伴い林分閉鎖比は増大し、過閉鎖度も増してゆく。一般の林分においては、本数が一定のままで保たれることはないので、上でのべたように推移することはない。たとえば、収穫予想表のように、樹高生長に伴い本数が変化していく場合には、基準林分の交点枝張り線でしめしたように推移する。この場合は、交点枝張りは樹高生長に伴って本数密度別交点枝張り線よりもさらに右傾してあらわれ、ほぼ直線的に増大していく。

またこれと同様の推移により、任意林分の樹高を同図の本数密度別交点枝張り線上に表わすことにより、任意の林分または地域の生長特性に応じた交点枝張り線を容易に描くこともできる。

交点枝張り図の利用

1. 林分の閉鎖区分

林分の上層木（主林木）平均樹高と立木本数密度とがわかれば、8式の林分閉鎖比を求めることにより、その林分の本数密度に対する相対的な閉鎖度合いがわかるので、林齢差や地位差に関係なく、林分の閉鎖度合いの比較判断が可能となる。

また、樹高と本数とが与えられれば、交点枝張り図上に一点が定まるので、等林分閉鎖比線を用いて、当該林分の閉鎖の程度を知ることできる。

付録 2 によれば、林分の過閉鎖が始まると年輪幅生長に停滞が現われ始めるが、その影響が顕著に現われるのは枯れ上り枝張りに達した後であると言える。さらに樹間距離枝張り y_1 以降となると、その影響は一層促進され、単木の生長に著しい抑制が現われるようになる。これらのことから、年輪幅のコントロールに重きを置く場合の密度管理においては、交点枝張りが y_L から y_1 までを立木本数密度の中と密の閉鎖区分の一般的な範囲として扱うのが妥当であると判断できる。そこで 8 式の林分閉鎖比を小数点 2 位以下を切り捨てて表わし、これを上の判断に従って次のように使用することによって、林分の混み合い度を相対的な閉鎖度合いに準拠して表わす好適な仕立て区分の目安が得られる。

林分閉鎖比 1.0 以上		過密
〃	0.9~1.0	密
〃	0.8~0.9	中
〃	0.7~0.8	疎
〃	0.7 未満	過疎

2. 年輪密度管理図

交点枝張り図を用いると、直径および林齢に対応したそれぞれの交点枝張りが求められるので、これにより所定の年輪幅を保つための本数管理の指針が得られる。この過程を図-10 の模式図で説明しよう。

図-10において林齢Aの林分が終始同じ年輪幅 d で生長したものと仮定し、この林分の平均直径を D とすると、この想定林分の直径 D は次の式でしめされる。

$$2 d A = D \dots\dots\dots (10) \text{ 式}$$

まず、上方の横軸に林齢 A をとり、これより垂線をおろして林齢線との交点 a に達する。 a は、林齢 A に対応する基準林分の樹高（地位別）をしめしている。これを横にたどれば、基準林分の交点枝張り線 b に達する。これを下にたどれば、基準林分の交点枝張り y が得られる。 y は、基準林分が林齢 A で到達する交点枝張りをしめしている。

次に、任意の年輪幅 d を想定して、これに対応する 10 式の直径 D を求める。さらに直径 D と直径線との交点でしめす樹高（地位別）により、上と同様の順序に従って、基準林分の交点枝張り線によって y' を求める。 y' は、基準林分が直径 D に達するときの交点枝張りをしめしている。

基準林分にあつては、林齢に対応する交点枝張り y と、直径に対応する交点枝張りとは常に一致するが、10 式で想定した直径 D なる林分の交点枝張り y' は、林齢 A で到達する基準林分の交点枝張り y に必ずしも一致しない。これは、直径 D なる想定林分の本数密度が基準林分のそれと異なることに原因がある。したがって、基準林分と異なる想定林分の本数密度を求めることができるならば、この想定林分の本数密度を表わす y_1 と、林齢 A で到達する基準林分の交点枝張り y との関係によって、10 式の想定林分の過閉鎖度 f を、7 式を適用することによって求めることができる。

すなわち、直径 D なる想定林分の本数密度は、基準林分の林齢 A における過閉鎖度 f' (f' は、図-10の a におけるものであり、図-11から読み取る。) を用いて、直径 D で到達する交点枝張り y' に対して 6 式で得られる y_1 によって求められる。

また、直径 D なる想定林分の過閉鎖度 f は、上で求めた y_1 と、林齢 A で到達する基準林分の交点枝張り y とによる林分閉鎖比を 7 式に適用することによって求めることができる。

すなわち上では、基準林分において、直径 D に対応して得られる樹間距離枝張り y_1 と林齢 A に対応して得られる交点枝張り y とから、10 式の想定林分における過閉鎖度 f が得られたわけである(図版Ⅱ参照)。樹間距離枝張り y_1 は、容易に本数密度に換えられる(3式)から、本数密度と過閉鎖度との関係を、年輪幅 d と林齢 A とのさまざまな組み合わせによる直径 D ごとに表わすことが可能となる。

図-10 交点枝張り模式図
Fig. 10. A model picture of branch expansion radius intersection

図-11 基準林分の過閉鎖度
Fig. 11. Percent of overlap for Yield Table stand

この方法によれば、交点枝張り図を用いることによって、本数密度と過閉鎖度との関係が地位別に求められるので、これを年輪幅 d と林齢 A とのさまざまな組み合わせごとに表わすことができる。

また、過閉鎖度は、本数密度と樹高との関係で決まるから、過閉鎖度がわかれば、年輪幅を本数密度と樹高との関係においてとらえることができる。図版Ⅲ～Ⅴ（付録3参照）は、それらの結果を用いて、地位別に2年輪幅線で表わした年輪密度管理図である。図-12は、その模式図をしめしている。

年輪密度管理図を用いると、立木本数密度と過閉鎖度とに対応した経過林齢と、経過林齢時ごとの2年輪幅とを知ることができる。また、この図版に表わされた林齢によって、過閉鎖度を指針として、目標とする年輪幅に導くための林分密度の設計管理が可能となる。その1例を図-12にしめた。さらに、年輪密度管理図を使用すれば、目標とする年輪幅の林分に導くための最適の植栽密度を立木本数密度で読みとることができる。したがってこの方法により、植栽密度の選択に始まる林分の一貫した密度管理の設計が可能となる。

3. 交点の高さの読み取り

交点枝張り図の $y/2$ に対応する樹高によって、交点の高さが読み取れる係数 C の経路を表わす曲線を“枝下 C 線”と呼ぶ。

図-7によると、係数 C がきまることによって、交点枝張り図と樹高との関係がわかるので、この関係を利用すれば、同図から交点枝張りの高さを次のようにして読みとることができる。図-5の枝張り生長曲線の地上高 h を交点枝張り図の樹高にとり、これと $y/2$ とによる交点がしめす係数 C の経路（図版 I 参照）をあらかじめ描いておけば、この曲線で読み取る樹高は、交点枝張り y の高さを表わしている。

交点枝張りが枯れ上り枝張りを超えると、クローネの枯れ上りが始まるが、枝下 C 線を使用すればクローネの枯れ上りの高さ（図-13の点 P の高さ）を、次のようにして近似的に求めることができる。すなわち、枝の枯れ上りが現われるのは、 $y \geq y_L$ が条件となるので、この条件のもとで、交点枝張り図（図版 I）に $y_L/2$ をとり、これを真上に延長して、林齢または直径の目盛線上に押さえる。次に、1目盛をそれぞれ $0.1m$ 、 $0.2m$ として、 $y - y_L$ を両点より右方へそれぞれ加えた位置に移動し、上下移動点を直

図-12 年輪密度管理模式図（等年輪幅線を基準にした本数管理例）
 Fig. 12. A model picture of the annual ring density control diagram
 (Used example of curve of fixed annual ring width)

線で結び、この直線で切られる枝下C線の樹高を読み取ると、これがクローネの枯れ上り点Pのおおよその地上高となる。ただし、 y_L が1.5m未満に対しては、さらに $y - y_L$ を加えた樹高とする。この方法による読み取り誤差は、5%以下のものが大部分（全体の85%）で、最大でも12.8%の誤差しかなく、実用上十分な精度である。

枝下C線で読み取る交点の高さとクローネの枯れ上り高とは、何れもつぎに述べるように、枝打ちの許容高としての意味をもっている。交点枝張り図上で枝打ちの許容高がわかるということは、本研究の目的である良質材の生産をねらいとした密度管理手段としての交点枝張り図の合目的な存在価値を一層高める意味あいをもつものと言える。

4. 交点枝張り図と枝打ちの許容高

クローネの枯れ上り以前においては、力枝以下の枝打ちが一般的であるので、これを行うためには、交点枝張り以下の枝を打つことを原則と考えればよい。この場合の高さは、 $y/2$ に対応する枝下C線の樹高で読みとれる。

しかし、図-13でしめすように交点枝張りが枯れ上り枝張りを越えた林分では、クローネの枯れ上りが始まることにより、交点枝張りの高さ以上に枝が枯れ上り、そのため枝打ちの許容高も高くなってゆく。クローネの枯れ上り点Pは、クローネ曲線と枯れ上り枝張りとは交わる点である。したがって、一定の本数密度のもとでも、樹高の伸びに伴って生長拡大するクローネ曲線との関係で、その高さが上昇する。また、除間伐が行われるたびに、立木本数密度が低下して y_L が大きくなり、それに伴って y_L も増大するので、その影響をうけてP点は低くなる。また間伐後のP点以下に残る枝は、隣接木との競合によってやがて生長を停止し枯れ枝化してゆくので、もはや保残の必要性がなくなる。

図-13 高点の高さとクローネの枯れ上り高
(θ : 枝の傾斜角)
Fig. 13. Height of intersection and height at which growth begin to die off
(θ : Inclination angle of branches)

スギにおいては、枝の生長停止から枯死までの期間の枝は、幹の生長に対する貢献度がゼロであることが藤森（1975）によって報告されている。このことは、トドマツにおいては未だ試験例を見ないが、表-2によると、枝階の一部の枝に年枝の生長停止が現われてのち、枝階の全枝が枯死するまでの所要期間は $\frac{\text{平均6.8年}}{5 \sim 12 \text{年}}$ となっている。こ

れを 1/2 以上の枝数に年枝の生長停止が現われてからのちでみれば、その所要期間は $\frac{\text{平均4年}}{2 \sim 7 \text{年}}$ となってい

表-2 枝枯れまでの所要期間
Table 2. Years needed until dieback occurs branch stage

供試木 Sample tree	(No.)	年枝に生長停止が 現われてから枝階 の全枝枯れまで Time from first halt in annual shoot growth until all branches at that stage die	$\frac{1}{2}$ 以上の枝数に年枝の 生長停止が現われてか ら枝階の全枝枯れまで Time from first halt in annual shoot growth on over $\frac{1}{2}$ of branches until all branches at that stage die	年枝に生長停止が現 われてから枝枯れが 現われはじめるまで Time from appearance of halt in annual shoot growth until branch death occurs
		(years)	(years)	(years)
Kawakami	12	5	2	2
"	1	5	2	0
"	3	12	7	5
"	11	5	5	0
合計 Total		27	16	7
平均 Average		6.8	4	1.8

る。また、年枝の生長停止の現われ始めから、枝枯れが現われるまでの所要期間は $\frac{\text{平均1.8年}}{0\sim5\text{年}}$ となっている。

以上の枝枯れ傾向より推察すれば、スギにおけるさきの報告は、トドマツに対してもほぼあてはまると考えてよいと思われる。また、枝打ちによる傷口をできるだけ早く巻き込ませることや、作業能率を向上することなどを考慮するならば、年枝に生長停止が現われた枝は、できるだけ早期に枝打ちするのが理想的であると言えよう。したがってこれらの諸条件を考慮すれば、目標過閉鎖度で管理された場合の間伐後のP点の高さは、枝打ち許容高の基準としての好適な条件を備えていると推察できる。

図-13にしめすとおり、P点が所在する枝の着生部位は、枝の傾斜角の影響分だけ、さらに低い位置にある。すなわち図-13において、水平面となす枝の傾斜角を θ 、枝の着生点Oと枝の枯れ上り点Pとの高低差を h とすれば、 $h = \tan \theta \cdot y_L$ となり、P点が所在する枝の着生点Oは、P点よりも $\tan \theta \cdot y_L$ だけ低い。このことは、P点の現われる以前の交点枝張りにおいてもあてはまる。

5. 林分閉鎖の診断と予測

図版IIは、過閉鎖度を仲立ちとして、 y と y_L との相互関係を付録4の方法で図化し、これに本数密度との関係を組み入れた林分閉鎖早見図である。同図版は、任意の過閉鎖度に対して、 y から y_L を、 y_L から y を、また y と y_L とから過閉鎖度を、それぞれ計算によることなしに図上において、直線定規を用いて読みとることを可能にしたものである。

図版Iが樹高と交点枝張りとの間における諸関係を表わしたものであるのに対し、図版IIは、交点枝張りとは本数密度との関係を表わしたものである。従って両図を併用することにより、樹高と立木本数密度との間にある林分閉鎖の諸関係が、簡単な操作で読み取れるので、林分密度の設計管理上はなほだ便利であるばかりでなく、林分の閉鎖現況の診断や閉鎖推移の予測が極めて容易となる。

これまでに述べてきた閉鎖関係について、両図を使用して行える主なる閉鎖診断の項目を整理するとつぎのようになる。

交点枝張り：樹高をもとに、交点枝張り図から、または本数密度と過閉鎖度とをもとに6式または林分閉鎖早見図から求める。

樹間距離枝張り：本数密度をもとに3式、閉鎖枝張りをもとに4式から、または交点枝張りとは過閉鎖度とをもとに6式によりまたは林分閉鎖早見図により求める。

閉鎖枝張り：本数密度をもとに4式からまたは林分閉鎖早見図から求める。

枯れ上り枝張り：本数密度をもとに、枯れ上り枝張りの過閉鎖度0.54により8式からまたは林分閉鎖早見図から求める。

過閉鎖度：交点枝張りとは本数密度とをもとに7式からまたは林分閉鎖早見図から求める。

林分閉鎖比：本数密度と樹高とをもとに8式からまたは交点枝張り図から求める。

目標過閉鎖度到達林齢（または直径）：交点枝張りをもとに、交点枝張り線の樹高により林齢線（または直径線）を読み取る。

Crown radius when trunk interval is the same
樹間距離枝張り r

圖版II 林分閉鎖早見図

Plate II. Stand overlap ratio chart

考 察

林木の生長をつかさどるのは、光合成を行う器官すなわち葉である。枝は葉を直接的に支える器官である。したがって、葉と枝の配列をしめすクローネの形状こそは、林木の生長を判定する最も重要な指標であると考えられる。

ところが、従来の林学においては、林木を表示する指標として、専ら胸高直径が用いられてきた。このことは、胸高直径が最も測定し易い部位であるとともに、林木の直接の対象である樹幹部の大きさをしめす直接の指標であるという、これまた当然の理由に基づいている。だが、胸高直径は、クローネにおいて有機物が合成され、それが蓄積された`結果`にすぎないことを認識する必要があるだろう。その`結果`の由って来たる因を求めようとするならば、生産の場たるクローネに着目せざるを得ないのである。しかしながら、クローネの形状を胸高直径と同様に手軽に、毎木的に調査することは、極めて困難である。またわれわれは、クローネの形状以外にも、生産の直接の対象物である幹の形状についても知る必要があり、出来得るならば、クローネを調節することを通じて、幹の形状のコントロールにまで結び付けたいのである。その意味で、われわれが今求められているのは、ただ単にクローネの形状を知るだけではなく、それを仲立ちとして、最終的には、幹の形状にまで結び付ける筋道に関する知識なのである。

本研究においては、まずクローネの形状を決定した。次いでこれを基にして交点枝張りを求めた。さらに交点枝張り と 樹高 と の 関 係 を 本 数 密 度 を 媒 介 変 数 と して 求 め た。また、本数密度と交点枝張り と から、林分閉鎖比を得た。また、交点の高さが読み取れる係数Cの経路を用いて、密度管理に付随して起こるクローネの枯れ上り高の読み取りを可能にした。さらに、基準林分の交点枝張り線を導入することにより、それを仲立ちにして、胸高直径ならびに林齢との関係を明らかにし得た。すなわち本研究は、クローネの形状さらには交点枝張りを仲立ちにして、本数密度、樹高、直径、林齢、交点の高さ、クローネの枯れ上りの高さなどの相互関係を明らかにし得たものであると言える。

林分の相互関係をしめした既存の研究には、安藤（1968）による「林分密度管理図」がある。本研究で導入した林分閉鎖比は、「林分密度管理図」における収量比数 R_y と ほぼ 同 じ 性 格 の も の で あ り、これをトドマツに適用した例（真辺 昭，1974）に対比してみると、林分閉鎖比 2.0 は 最 多 密 度 曲 線 に、林分閉鎖比 1.5 は $R_y 0.9$ に、林分閉鎖比 0.9 は $R_y 0.7$ に、林分閉鎖比 0.6 は $R_y 0.5$ に、それぞれほぼ相当している。このような意味において本研究は、立木本数、樹高、直径などの関係に対して、クローネの形状にまで及ぶ実体的意義を与えたものであると言える。

本研究ではさらに、交点枝張り図を基にして年輪密度管理図を導びくことに成功した。これによって、従来はあまり手つかずであった年輪幅を調節するための指針を与えることができたほか、密度管理に付随する最適植栽密度の基準をも与えることができた。

また、交点枝張り図に枝下C線を組み入れて、交点の高さや、枝打ち許容高の目安となるクローネの枯れ上り高を求めることを可能にしたことにより、枝打ち度合いの目標をも明らかにすることができた。すなわち、林分の密度管理に不離一体の関係にある最適植栽密度および枝打ち許容高の在り方をも明らかに成し得たものであると言える。

本研究はあくまでも、林分の平均値レベルでの法則性を引き出すことにとどまっている点においては、既存の「林分密度管理図」と同じレベルのものと言ってよい。しかしながら林分内には、大小さまざまな

個体が存在し、それらによってクローネの形状も個々に異なり、庇蔭の程度にも差異があるので、今後は個体の分布関数と結びつくことによって、これらの点の分析を行う必要がある。また、クローネを形態的な把握から、さらに光合成に関与する量的な把握にまで進める必要がある。その際にも、ここでしめたクローネの形状を基とする方法は、極めて有効な分析の手だてとなるものと確信する。

摘 要

1. トドマツ人工林のクローネ曲線と枝張り生長曲線とを、ともに $C\sqrt{v}$ (v は原点からのX軸の距離。係数 C は曲線の拡張度合いを表わす媒介変数。)の放物線の座標軸を傾けて得られる曲線の一部によって表わした。また、両曲線の合成で得られる交点枝張りをを用いて、無被圧状態(疎開木)におけるクローネ半径を表わすことができた。
2. 交点枝張りをを用いることにより、クローネの生長と立木本数密度との関係を明らかにし、経年的な経過による林分の閉鎖を理論的に解明した。
3. クローネ曲線に伴う係数 C は、樹高と立木本数密度との影響をうけて変化する。
4. 樹高、係数 C 、交点枝張り相互の関係は、交点枝張り図上の樹高に対応する係数 C の経路によってしめされる。
5. クローネ曲線の係数 C の交点枝張り図上における経路は、疎開木の交点枝張り線上を推移し、閉鎖枝張り点で折れ曲がり、その後は本数密度別交点枝張り線上を推移する。
6. 立木本数密度と交点枝張りとから求められる林分閉鎖比は、同一本数の下では、樹高生長のみによって増大する。
7. 林分閉鎖比を用いれば、林齢や地位に関係なく、林分の相対的な閉鎖度合いを立木本数密度と樹高とを基にして表わすことができる。また、小数点2位以下を切り捨てて表わした林分閉鎖比の数値で、林分の閉鎖度合いに準拠した仕立て区分の有効な基準が得られる。
8. トドマツ人工林における枯れ上り枝張りの林分閉鎖比の実験値は0.8であった。
9. 交点枝張り図に、交点枝張りの1/2を用いて、枝張り生長曲線の高さに一致する係数 C の経路を描くと、この曲線によって、交点枝張りの高さおよびクローネの枯れ上りの高さを、交点枝張り図上で求めることができる。また、枯れ上り以前の交点枝張りおよび間伐後のクローネの枯れ上りのそれぞれの高さは、ともに枝打ち許容高の基準として使用できる。
10. 立木本数密度と過閉鎖度と交点枝張りとの関係を早見図に表わすことにより、林分閉鎖の現況や推移を図上で容易に知ることができる。
11. 基準となる林分の林齢線と直径線とを組み入れた交点枝張り図を使用することにより、任意の2年輪幅と林齢とを基にして、立木本数密度と林齢と過閉鎖度と年輪幅との相互関係を表わす地位別の年輪密度管理図が描ける。
12. 年輪密度管理図を使用すれば、植栽密度の選択をはじめ、年輪幅を任意に選択または調節して行う林分の密度管理が容易である。
13. 閉鎖枝張り、枯れ上り枝張り、樹間距離枝張りは、それぞれ施業上の目安として効果的である。

文 献

- 安藤 貴 1968 同齡単純林の密度管理に関する生態学的研究. 林試研報 210 : 153P
藤森隆郎 1975 枝打ちの技術体形に関する研究. 林試研報 273 : 74P
小林正吾 1978 カラマツ人工林の林分生長モデルに関する研究. 北林試報 15号別刊 : 164P
眞辺 昭 1974 トドマツ密度管理図. 北方林業叢書 53 : 69P
増田憲二郎 1980 トドマツ人工林における林分の閉鎖と年輪密度の管理について. 日林北支講.29.3P
大野喜久夫 1960 北海道の主要樹種林分収穫表. 森林計画研究会北海道林務部支部. 80P
坂口勝美 1961 間伐の本質に関する研究. 林試報 131 : 95P
千広俊幸 1961 樹冠伸長量を基礎とするトドマツ・カラマツの植栽本数. 林 (北海道林務部編) 5月号 : 12P

Summary

1. The crown curve and the branch growth development curve of planted forests of *Abies sachalinensis* MAST. can both be shown by using a section of the curve formed by tilting the axis of coordinates of the parabola of $C\sqrt{v}$ (v =the distance from the origin to the X axis.

Coefficient C=the variable which shows the degree of sharpness of the crown.)

And by using the branch expansion radius intersection which results from the combination of these 2 curves, the crown radius with which there will be no hindrance to growth can be shown.

2. By using the branch expansion radius intersection, the relationship between crown development and stand density can be clearly shown, and the stand closure which develops with the passage of year can be logically illustrated.

3. Coefficient C which goes with the crown curve is influenced and changed by tree height and stand density.

4. The interrelationship of tree height, coefficient C, and the branch expansion radius intersection can be shown by the course of coefficient C, which corresponds to tree height on the branch expansion radius intersection table.

5. On the branch expansion radius intersection table, the course of coefficient C of the crown curve runs along the branch expansion curve for a condition of open-grown tree (i. e. no other trees) and turns at the point where branch overlap begins, and then runs along the branch expansion radius intersection line for its corresponding density class.

6. The overlap ratio, derived from stand density and branch expansion radius intersection increases only in relation to vertical growth, if the number of trees remains constant.

7. By using the stand overlap ratio, without relation to tree age or site class, the relative degree of closure of a stand can be shown in terms of stand density and tree height.

By

ignoring all numbers to the right of the first decimal place in stand overlap ratio values, an effective standard for dividing the degrees of stand closure is obtained.

8. The empirical value for the overlap ratio of crown radius when it equals the growth limit crown radius in a Todo fir artificial forest is 0.8.

9. By taking the coefficient C which equals the height of the branch growth curve using 1/2 the value of branch expansion radius intersection on the branch expansion radius intersection table, and by plotting the course of C, from the resulting curve, the height of branch expansion radius intersection and the heights where crown growth die-off begins can be shown on the branch expansion radius intersection curve.

And, the height of branch expansion radius intersection before reaching the growth die-off limit, and the crown die-off height after thinning can both be used as standards for deciding allowable pruning height.

10. By showing the relationship between stand density, percent of overlap, and branch expansion radius intersection on a graph, the present condition of and the change in stand closure can easily be known.

11. By using the branch expansion radius intersection table which incorporates the stand age curve and trunk diameter growth curve from a standard stand, using any annual ring width (Both sides) and stand age as a base, an annual ring density control table by site class can be drawn which shows the relationship between stand density, stand age, percent of overlap, and annual ring width.

12. By using the annual ring density control table, stand density control through selection of planting density and free selection or adjustment of annual ring width becomes easy.

13. Branch expansion radius at point where closure begins, branch expansion radius at point of limit of growth, and branch expansion radius where crown radius equals average distance between trees, are all effective as standards for management.

付録 1. クローネ曲線の求め方

トドマツのクローネ外縁の形成点を枝階ごとに見ると、各枝階の枝傾斜角（枝の先端部と枝の幹への付着部とを結ぶ線が水平面となす角）を下方へ延長した樹幹の外周に、枝傾斜角のおおよその交会点が一般に存在することが観察できた。供試木川上 No. 12 に対して実測した結果では、付表-1 のとおりで、樹高 h に対し横座標 $0.75h$ 、縦座標 $0.125h$ が得られたので、できるだけ正確なクローネ曲線を得るため、これを閉鎖後の林分における枝傾斜角の交会点の座標値として使用し、これを用いて表-1 の供試木について、各枝階の枝長を幹軸に対して傾斜を与えて表わし、付図-1 の模式図のようにして、クローネ曲線を現在および5年ごと遡って描き、年枝生長の半縦断面図に表わした。付図-2 はその1例である。

付図-2 によると、クローネの外縁線は必ずしも整一でないで、同図の被圧をうけない部分のクローネ半径の外縁部に対し、付1式による曲線の座標軸を傾けて、ちょうど一致する放物線状の曲線を描き、これをクローネ曲線とした。

次に、座標原点から垂直方向に v (クローネと関連づけるため便宜上 (-) 方向にとるが、正数で扱う。)、水平方向に y_0 をとり、媒介変数を C として付1式の放物線を描き、この放物線を基本にして、クローネ曲線を代表できる曲線式を次のように誘導した。

$$y_0 = \pm C\sqrt{v} \dots \dots \dots \text{(付1) 式}$$

付1式が表わす曲線は、クローネ曲線の基本となるので、まずその性質を明確にしておく。付1式の曲線は、符号を (+) にとればX軸の右側に、(-) にとれば左側にそれぞれ現われ、クローネ様の形が描かれるが、説明の複雑化を避けるため、以下はX軸の右側に描くクローネの半

付図-1 遡り年のクローネ曲線の描き方
h : 遡った時点での樹高
Sub-fig. 1. Way of drawing crown radius curve for past years
h : Tree height of past years

付図-2 樹幹・年枝生長の半縦断面図 (川上 No. 1)
Sub-fig. 2. Radial longitudinal section of trunk and annual shoots (kawakami No. 1)
⊖ : 年枝数の減少 Stage where some branches fail to produce annual shoots
⊕ : 半枝数以下になる年枝端 Stage where more than 1/2 of branches fail to produce annual shoots
† : 全枝が枯死した枝階 Stage where no new shoots appear (all branches die)
* : 着生枝数 No. of branches
⊛ : 枯枝数 No. of dead branches

付表-1 枝傾斜角交会点の座標値
Sub-table 1. Co-ordinate value of intersect point of branch inclination angle

供試木 Sample tree	樹高 Tree height	枝階の高さ Height of branch stage	枝の傾斜角 Inclination angle of branches (Branch number)							枝傾斜角交会点の座標値 Co-ordinate value of the point F	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	計 Total	平均 Average	X	Y
Kawakami 12	14.94	12.5	42°	46°C	42°	46°	42°	218	43.6°	} 0.125 _h *	0.75 _h *
		9.2	30°	35°C	34°	33°	—	132	33.0°		
		5.8	15°	20°C	20°	20°	95	19.0°			

* h : 枝階の高さ Height of the branch stage

縦断面図を表わす曲線について論及する。

付1式の曲線を $y_0 = a$ で切り捨てることとし、 a で切られた点の v を b で表わし、 $x = v - b$ とし、 $x = 0$ の点を梢頭、 x を梢頭からの幹軸上のへだたりとすれば、残った曲線 y_1 は次の形になる。

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= C\sqrt{b+x} - a \\ x &= v - b \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots(付2) 式$$

また梢頭では、 $x=0$, $y_1=0$ であるから、付2式は

$$\begin{aligned} C\sqrt{b} - a &= 0 \\ a &= C\sqrt{b} \dots\dots\dots(付3) 式 \end{aligned}$$

となる。付2式の y_1 は、付1式の曲線のうちの使用可能範囲であり、付3式の a は使用できない範囲を表わす定数である。また C は、付1式で表わされる曲線の拡張度合いに関係する媒介変数で、以下これを係数 C とする。

付図-3にしめすように、任意のクローネ曲線に対して、付1式の y_0 曲線を傾けて重ね合わせ完全に一致したとき、傾ける前の y_0 曲線の座標でこの曲線を捕えて y_2 曲線とする。 y_2 曲線は、 y_0 曲線を傾けた分だけ y_0 曲線よりも内側にせばめられている。今、 y_0 曲線よりも内側にせばめられた度合いを e で表わすと、 e は両曲線の開差（それぞれ原点から同一へだたりにおける）となり、 $y_2 = y_0 - e$ となる。 y_0 と y_2 との開差 e は、座標軸を傾けて生じた曲線の移動量であるから、 y_0 曲線の原点からの距離 v に正比例する。

今、 v に対する比例定数を C/k で与えると、任意の v における両曲線の開差 e は、

$$e = C v / k \dots\dots\dots(付4) 式$$

であるので、 y_2 は次の形に書き替えられる。

$$\begin{aligned} y_2 &= y_0 - C v / k \\ &= C (\sqrt{v} - v / k) \dots\dots\dots(付5) 式 \end{aligned}$$

付5式の y_2 には、使用できない曲線範囲 a が含まれているので、付3式の a をこれより除外することにより、クローネ曲線の y を求める次の式が導びかれる。

$$\left. \begin{aligned} y &= C(\sqrt{v} - v/k) - a \\ v &= b + x \end{aligned} \right\} \dots\dots(付6) 式$$

次に、付6式の係数および定数の求め方について考える。今、付図-3において、両曲線の係数 C が同じ値の場合には、付4式にしめしたとおり e は v に対して正比例し、 y_0 曲線を傾けることによって、クローネ曲線はすべての部分で完全に y_0 曲線に一致できる。

これに対し、両曲線の係数 C が異なり、 $C \neq C'$ である場合は、 $e = C\sqrt{v} - C'\sqrt{v} + C'v/k$ となり、 e は v に対して比例定数が得られないので、両曲線はすべての部分で完全に一致する

付図-3 クローネ曲線の係数および定数のよみとり方
Sub-fig. 3. Way of selecting the values of C , a , k of crown radius curve

ことができない。したがって両曲線の完全一致を条件とすることによって、座標原点の不明なクローネ曲線の係数 C を、 y_0 曲線を用いて付 1 式により求めることができる。

また同図において、 y_0 曲線を傾けたときの座標軸の移動量を n で表わすと、両曲線の開差 e との間に次の関係が成り立つ。(e, n, ε の符号は x 軸の傾きが右にふれる時-とする。)

$$e = C \cdot n \dots\dots\dots (付 7) 式$$

付 7 式と付 4 式とから

$$C \cdot n = Cv/k$$

$$n = v/k \dots\dots\dots (付 8) 式$$

となる。n を読みとれば、付 8 式から定数 k が求められる。

さらに付 8 式を付 6 式に入れると、係数 C を求める次の付 9 式が得られる。

$$y = C(\sqrt{v} - n) - a$$

$$C(\sqrt{v} - n) = y + a$$

$$C = \frac{y + a}{\sqrt{v} - n} \dots\dots\dots (付 9) 式$$

付図-3 では、クローネ曲線を y_0 曲線の座標軸を傾けて捕えたことにより、梢頭がしめす a' 、 b' はそれぞれ見かけの座標値となっている。クローネ曲線の梢頭の見かけの座標値 a' 、 b' に対する真の座標値をそれぞれ a 、 b とすると、 y_0 曲線の傾きをいったん元へ戻したときに現われる ε を読み取れば、 $b = b' + \varepsilon$ により真の座標値 b が得られ、次いで、 b を用いて付 3 式を適用すると真の座標値 a が求められる。決定した a を (付 9) 式に入れると正しい C が求められる。

付録 2. 林分の閉鎖と生長の解析

供試木の年枝長 (付図-2) および年輪幅直径生長 (付図-4) の解析結果について、とくに林分閉鎖と生長との関係を考察した。その結果、両者の間におおよそ次のような傾向が認められた。

年輪幅直径生長：付図-4 によると年輪幅直径生長は、交点枝張りが y_r に達すると緩慢となりはじめ、 y_r を超えると一部に低下するものが見られるようになり、 y_L に達すると一様に下降が始まる。さらに y_L を超えると下降が顕著となり、 y_1 以降になると下降は一層促進されていく。

材積生長：材積生長率は樹齢の増加につれて低下するが、低下の度合いは、本数密度の高い林分ほど大である。これは、閉鎖が進むほど材積生長率の低下度合いが大きいことをしめすものである。これに対して林分材積生長量は、単木の材積生長率の低下を本数密度によって補う関係で、本数密度の高い林分ほど高く現われている。

付図-4 年輪幅直径生長
Sub-fig. 4. Diameter growth of annual ring width

付録3. トドマツ年輪密度管理図

図版Ⅲ～Ⅴは、交点枝張り図（図版Ⅰ）を使用し、交点枝張りを仲立ちに、2×年輪幅と林齢とを基にして、樹高と本数密度との間にある関係を2×年輪幅と林齢ごとに表わし、地位別に作制した年輪密度管理図である。

この図によって、樹高と本数密度との間にある過閉鎖度を仲立ちにして、本数密度と経過林齢と経過林齢時における年輪幅との関係がそれぞれしめされているので、この図を交点枝張り図および林分閉鎖早見図（図版Ⅱ）とともに使用することにより、過閉鎖度を指針として所定の年輪幅の林分に導びくための最適の植栽密度の読み取りをはじめ、年輪幅に合わせた林分密度管理の設計ができる。すなわち、

1. 目標の等年輪幅線をきめる。

2. 等年輪幅線の最右端（曲線の折り返えし点）において立木本数密度を読み取ると、所定の年輪幅に導びくための最適の植栽密度が読みとれる。

3. 等年輪幅線の各点は、立木本数密度と経過林齢と過閉鎖度とをそれぞれしめしているので、この曲線に沿って除伐および間伐を繰り返えし設計し（主として同図にしめす $y_r \sim y_1$ 線の範囲内で行うのが一般的である。）これに応じてそれぞれの時点における立木本数密度と経過林齢と過閉鎖度とを読み取ることができる。

4. 立木本数密度と過閉鎖度とが読み取れたならば、林分閉鎖早見図を用いて（または関係式により）交点枝張りが求められるので、これを仲立ちにして、交点枝張り図により樹高、林齢、直径などとの関係が読み取れる。また、これらの順序を逆にたどれば、交点枝張り、次いで過閉鎖度を仲立ちに、任意の到達樹高時における立木本数密度、林齢、年輪幅などの関係が年輪密度管理図上で読み取れる。

図版Ⅲ 年輪密度管理図 (トドマツI等地)
Plate III. Annual ring density control diagram
(1st. class site of *Abies sachalinensis* forests)

立木本数密度 /ha
Stand density (Number of trees per hectare)
図版V 年輪密度管理図 (トドマツⅢ等地)
Plate V. Annual ring density control diagram
(3 rb. class site of *Abies sachalinensis* forests)

付録4. 林分閉鎖早見図のつくり方

1. HEMMI 計算尺のC尺目盛によって、付図-5中央の林分疎開比を目盛りする。
2. 同目盛の1 mを基準に、左右にそれぞれ10 cm 離して、左に y 目盛の2 m、右に y_1 目盛の2 mを設定する。
3. 林分疎開比の目盛を基準にして、それぞれ左右に次の目盛を設定する。

y 目盛	y_1/y 目盛	y_1 目盛
1	4	4
4	0.25	1

4. y 目盛の1 mを基準にして、 y_1/y 目盛を見通して、次の計算によって y_1 目盛を補完する。
 $y \times y_1/y = y_1$

5. y_1 目盛を y に移して、 y 目盛を補完する。
6. y_1/y 目盛を、8式に従って過閉鎖度 f の目盛に取り替える (図版II参照)。
7. 図版IIにしめたように、 y_1 目盛を直接本数に読み替えるために、同図の下方横軸に本数を取り、4式によって y_1 : 本数曲線を組み入れる。

付図-5 林分閉鎖早見図のつくり方
 Sub-fig. 5. How to make an overlap ratio chart