

魚種（海域）：ヒラメ（日本海～津軽海峡海域）

担当水試：中央水産試験場

要約表

評価年の基準 (2012年度)	資源評価方法	2012年度の 資源状態	2012～2013年度 の資源動向
2012年8月1日 ～2013年7月31日	資源重量	中水準	横ばい

*生態については、別紙資料「生態表」を参照のこと。

1. 漁業

(1) 漁業の概要

北海道においてヒラメ漁業は主に日本海から津軽海峡にかけて行われている。刺し網と底建・定置網類での漁獲が多く、その他に沖合底びき網漁業や釣りなどで漁獲されている。積丹半島を挟んで南北で主要な漁法が異なっており、北側の海域では刺し網類、南側では底建網類による漁獲が多い（図1）。周年漁獲対象となるが、特に産卵期の5～7月、索餌期の10～12月に漁獲量が多くなる（図1）。

(2) 現在取り組まれている資源管理方策

1995年以降、未成魚保護のための資源管理協定に基づき、全長35cm未満の水揚げが制限されており、漁獲があった場合は海中還元等の措置を講ずることとなっている。

栽培漁業対象魚種として1996年より種苗放流が行われている。公益社団法人北海道栽培漁業振興公社（以下、栽培公社）羽幌事業所および瀬棚事業所で生産された約8cmの種苗が、宗谷管内から渡島管内にかけて延べ220万尾放流されている¹⁾。1996～2011年（1～12月）における放流魚の漁獲物への混入率は北部海域で1.3～14.0%、南部海域で4.5～12.1%と推定されている²⁾。

2. 評価方法とデータ

・漁獲統計の集計

産卵盛期が6～7月頃であり、未成魚（1歳魚）が秋季に新規加入することから、8月1日を基準日（年齢起算日）として、8月1日～翌年7月31日を単年度の集計期間とした。漁獲量は1985年8月～2012年12月については漁業生産高報告、2013年1～7月については水試集計速報値から集計した。漁獲量の集計範囲は、稚内地区以西の宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、檜山振興局管内、渡島総合振興局管内の函館市榎法華地区以西および八雲町熊石地区とした。

・漁獲物の全長組成

評価範囲を地区間の漁獲動向の相似性に基づき次の6海域に区分し、海域ごとに漁獲物

の全長組成を推定した。その方法は、主要産地で定期的に行われている種苗放流魚の確認調査における漁獲物全長測定結果（栽培公社とりまとめ）を、調査実施月・地区の漁獲量で引きのぼし、それらを合算した頻度分布を、未測定月・地区も含めた海域全体の漁獲量で引きのぼした。6 海域それぞれの全長組成を合算して評価範囲全体の全長組成とした。

- 道北海域：稚内市～留萌市（主な調査地区は豊富町、羽幌町など）
- 石狩湾東部海域：増毛町～小樽市（主な調査地区は増毛町、小樽市など）
- 石狩湾西部海域：余市町～積丹町（主な調査地区は余市町など）
- 後志西部海域：神恵内村～寿都町（主な調査地区は寿都町など）
- 道南海域：島牧村～上ノ国町（主な調査地区は瀬棚町、上ノ国町など）
- 津軽海峡海域：松前町～函館市榎法華（主な調査地区は福島町、北斗市上磯など）

・漁獲物の年齢組成

後志総合振興局管内余市町に水揚げされた漁獲物を、盛漁期である 6～7 月と 11～12 月の 2 時期にサンプリングし、生物測定と耳石輪紋による年齢査定³⁾を行った。毎年・毎時期の標本ごとに、体長-年齢関係を推定し、採集月の余市町水揚げ物の全長組成（前記）を年齢組成に変換して、これを毎年の索餌期と産卵期における資源の年齢構成を指標するものとみなした。さらに、これら余市町の水揚げ物から得られた体長-年齢関係により、全海域の漁獲物全長組成を年齢組成に変換し、年度別・年齢別漁獲尾数を得た。

・資源量推定

年度別・年齢別漁獲尾数から VPA（次式）によって資源尾数や漁獲係数を推定した。年齢は 1～5 歳以上の 5 クラスとし、各年度の 4 歳と 5 歳以上に対する漁獲係数が等しいと仮定⁴⁾して計算した。

$$N_{a,y} = N_{a+1,y+1} \cdot e^M + C_{a,y} \cdot e^{0.5M} \quad (1)$$

$$N_{a,y} = \frac{C_{a,y}}{1 - e^{-F_{a,y}}} \cdot e^{0.5M} \quad (2)$$

$$F_{a,y} = \ln \frac{N_{a,y}}{N_{a+1,y+1}} - M \quad (3)$$

ここで、 a は年齢、 y は年度を表す。 $N_{a,y}$ は資源尾数、 $C_{a,y}$ は漁獲尾数、 $F_{a,y}$ は漁獲係数、 M は自然死亡係数を表す。自然死亡係数は、田内・田中⁵⁾の方法に基づき雌雄ごとに求め、雄が雌より寿命が短いことを考慮して、1-3 歳時には 0.30、4 歳以上には 0.29 の値を与えた（表 1）。雌雄込みの平均体重（表 1）を年齢別資源尾数に乗じて資源重量とした。

3. 資源評価

(1) 漁獲量および努力量の推移

1985年度からの漁獲量は1999年度を除いて500～1,000トンの範囲にあり、平均的には増加傾向で推移している(表2, 図2)。最低は1985年度の454トン, 最高は1999年度の1,343トンである。1991, 1999, 2007, 2011年度など, その前後を含めた数年間に漁獲が大きく増加する時期がみられた。南北両海域の漁獲動向は比較的似た傾向で推移しているが, 2012年度は南部海域で増加, 北部海域では減少して, 合計811トンであった。なお, 漁獲努力量を指標するデータは得られていない。

(2) 現在(評価年)までの資源状態

2005年度以降の漁獲物の全長組成(図3)から, 漁獲尾数としては400mmに満たないサイズの割合が多く, 漁獲量が大きく増加した2007年度(図2)は, 400mm台前半の漁獲が多かった。2012年度についても400mm台前半の割合が比較的大きかった。

余市港に水揚げされた漁獲物の最少年齢は1歳で, 2歳で本格的に加入し2～3歳時に漁獲の主対象となっている(図4)。産卵期である春漁の漁獲物は索餌期の秋漁に比べ高年齢魚の割合が大きく, 秋漁では2012年度を除いて4歳以上がほとんど漁獲対象となっていない。漁獲量が増加した2007年度は秋, 春漁ともに2歳魚(2005年級群)を中心に漁獲されており, 翌2008年度はこの2005年級群が3歳魚として漁獲の主体となった。同様に, 2011年度は2008年級群が3歳魚として漁獲量増加に寄与し, さらに2012年度には4歳魚として漁獲物の主体となった。

図5, 6から, 北海道海域のヒラメは, 資源量がおおよそ2,000トンから3,000トンの範囲を大きな年変動なく推移しており, 時折発生する豊度の高い年級群が2～3歳となる時期に資源量や漁獲量が増加し, それらが4歳以降になると漁獲量が減少する, という変動の特徴をもつとみられる。2000年代は2005年級と2008年級が, それぞれ1歳時の資源尾数329万尾, 372万尾と比較的高い豊度で加入したことで, 2007年度や2011年度を中心に漁獲量が増加した。

資源尾数に対する漁獲尾数の割合(漁獲割合)は2000年代以降漸減傾向にある。これは1, 2歳魚に対する漁獲割合の減少によるところが大きく(図7), その背景には魚価の安い小型魚の漁獲回避が進んでいる状況があると推察される。

加入尾数(毎年度の1歳資源尾数)には一方向的な増減の傾向は認められず, 2005年級が高豊度で加入したことで, それ以降の産卵親魚重量が増加し2008年級群が再び高豊度年級となったことがわかる(図8)。最近年の産卵親魚重量についてはVPAの前提条件に依存した不安定な推定値であるが, 少なくとも90年代よりは高い水準にあり, また, 今後1～2年間の資源を構成する2011年級も比較的高い豊度で加入した可能性がある。

(3) 評価年の資源水準：中水準

1997～2009年度の資源重量の平均値を100として±40の範囲を中水準, それより上下を高水準, 低水準と定義した。2012年度の水準指数値は106.6なので中水準と判断される(図

9)。

(4) 今後の資源動向 横ばい

漁獲量は1997年度以降、中水準の範囲内で変動しており、前記のように、2005年級および2008年級群の豊度が比較的高かったことで近年の資源量は相対的に高い水準となった。2008年級は2012年度においても4歳魚として漁獲対象となったが、これまでの傾向(図4)から、今後の漁獲主体となる可能性は小さい。一方、2011年級の資源量は比較的大きいと推定されている(図6)ことから、2013年度の漁獲主体となっていくことが予想される。これらのことから、2012年度から2013年度にかけては、主体となる年級群が代わるものの、資源量や漁獲量が大幅に増減する状況にはないと考えられる。よって、「横ばい」と判断される。

4. 文献

- 1) 社団法人北海道栽培漁業振興公社：平成24年度種苗生産事業報告書，13-49（2014）
- 2) 石野健吾：ヒラメ放流基礎調査. 平成24年度道総研中央水産試験場事業報告書，147-152（2013）
- 3) 厚地 伸，増田育司，赤毛 宏，伊折克生：耳石横断薄層切片を用いた鹿児島県近海産ヒラメの年齢と成長，日水誌70(5)，714-721(2004)
- 4) 平松一彦：VPA (Virtual Population Analysis)，平成12年度資源評価体制確立推進事業報告書－資源解析手法教科書－. 東京，日本水産資源保護協会，104-128（2001）
- 5) 田中昌一：水産生物の population dynamics と漁業資源管理. 東海水研報. 28, 1-200（1960）




表1 VPAの計算条件

項目	値	方法
自然死亡係数	1-3歳:0.30 4歳以降:0.29	田内・田中 ⁵⁾ 式を応用
計算方法	5歳以上と4歳に対する 漁獲係数が等しいと仮 定	平松 ⁴⁾
年齢別体重g	1歳118, 2歳535, 3歳 1,078, 4歳1,581, 5歳 以上2,197	過去の測定結果の平均

図1 北海道におけるヒラメの過去5カ年(2008～2012年度)

平均漁獲量の月変化

北部:稚内市～積丹町, 南部:神恵内村～函館市楡法華

表2 北海道海域におけるヒラメの漁獲量

単位:トン

	北部		南部		沖底漁業		合計
	8-12月	1-7月	8-12月	1-7月	8-12月	1-7月	
1985	64	114	155	116	4	1	454
1986	240	221	277	134	2	1	874
1987	148	172	161	101	7	1	590
1988	138	103	260	132	1	1	635
1989	68	137	117	146	3	5	475
1990	98	255	165	159	7	8	693
1991	190	353	218	159	2	16	939
1992	188	241	186	160	4	7	787
1993	89	220	89	112	10	14	533
1994	93	184	101	147	1	6	531
1995	89	222	135	139	5	13	603
1996	159	176	165	139	1	5	647
1997	220	297	169	174	19	18	897
1998	266	233	196	184	15	10	905
1999	345	386	288	257	45	22	1,343
2000	245	199	250	168	11	4	878
2001	186	149	245	189	3	7	780
2002	146	279	163	130	5	16	739
2003	181	268	164	124	10	19	765
2004	150	287	128	103	7	13	688
2005	177	234	146	141	4	11	713
2006	209	194	211	190	6	9	819
2007	287	291	206	156	40	5	984
2008	163	225	188	164	10	8	758
2009	152	253	148	155	5	8	720
2010	135	310	221	162	12	20	859
2011	257	343	211	177	15	15	1,018
2012	180	198	204	215	6	8	811

北部:稚内市～積丹町, 南部:神恵内村～函館市楡法華




図2 北海道海域におけるヒラメの漁獲量の変化

北部:稚内市～積丹町, 南部:神恵内村～函館市楡法華




図3 北海道海域におけるヒラメの全長組成




図4 余市町に水揚げされたヒラメの年齢組成
 ■:秋漁(11~12月), □:春漁(6~7月)




図5 北海道海域におけるヒラメの年齢別漁獲尾数の推移




図6 北海道海域におけるヒラメの資源尾数・資源重量の推移





図7 漁獲割合(漁獲尾数/資源尾数)の推移

図8 産卵親魚重量と加入尾数(1歳資源尾数)との関係






図9 北海道海域におけるヒラメの資源水準

生態表


魚種名：ヒラメ海域名：日本海～津軽海峡海域

図 ヒラメ（日本海～津軽海峡海域）の漁場図

1. 分布・回遊

宗谷総合振興局オホーツク海側から道西日本海，津軽海峡を経て胆振総合振興局・日高振興局海域に分布し，日本海と津軽海峡で主に漁獲される。季節的な深淺移動を行い，水温が上昇する春季に浅海域に移動し，秋季には沖合に分布域を移す。また，9月までは北方向への移動傾向を示し，11～12月には南下する個体が増大する。

2. 年齢・成長（加齢の基準日：8月1日）

（8月時点）

満年齢		1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
全長(cm)	オス	21	33	40	44	47	48			
	メス	22	36	46	53	58	62	65	67	68
体重(g)	オス	71	316	586	794	933	1,019			
	メス	165	779	1,688	2,667	3,572	4,337	4,952	5,430	5,792

（1996～2001年の漁獲物測定資料および試験調査船おやしお丸の標本）

3. 成熟年齢・成熟体長

- ・オス：2歳から成熟する個体がみられ，全長29cm以上で半数以上の個体が成熟する。
- ・メス：2歳から成熟する個体がみられ，全長41cm以上で半数以上の個体が成熟する。

4. 産卵期・産卵場

- ・産卵期：6月～8月である。
- ・産卵場：水深20～50mである。

5. その他

なし

6. 文献

なし