

魚種（海域）：ハタハタ（道東太平洋）

担当：釧路水産試験場（吉村圭三・山口浩志）

要約

評価年度：2015 年度（2015 年 1 月～2015 年 12 月）

2015 年度の漁獲量：247 トン（前年比 2.57）

資源量の指標	資源水準	資源動向
産卵期の親魚漁獲量	低水準	横ばい

漁獲量は約 247 トンで、過去最低であった 2014 年（96 トン）からやや回復した。釧路・根室群の産卵期の漁獲量を指標とした資源水準は、過去最低水準であった前年よりも増加したが、依然低い水準にある。2015 年の魚群分布調査による 0 歳魚の採集尾数は少なく、翌年の漁獲量の増加は見込めないことから、資源動向は横ばいと考えられる。また、近年、同調査による 0 歳採集尾数は多い傾向にあり、仔稚魚の生残条件が比較的良好になっていくことが示唆されるとともに、それを産み出す親魚量が十分に確保されている状況と考えられる。

1. 資源の分布・生態的特徴**(1) 分布・回遊**

当該海域に分布するハタハタは、索餌期（8月下旬～11月上旬）には水深 100m 以浅の海域に広く分布するが、11月中旬～12月になると成熟した個体は沿岸各地の産卵場に接岸し産卵する。索餌期には、釧路～霧多布沿岸（釧路群）と日高沿岸（日高群）で産卵する個体が混在していると考えられている¹⁻³⁾。また、比較的他海域との交流が少ない根室沿岸に分布する根室群が存在する⁴⁾。

(2) 年齢・成長（加齢の基準日：1月1日）

(1月時点)

満年齢		1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
体長(cm)	オス	11	15	17	
	メス	13	16	18	21
体重(g)	オス	24	56	82	
	メス	32	68	117	184

(2001年10月上旬における魚群分布調査による標本より)

(3) 成熟年齢・成熟体長

- オス：1 歳でほとんどの個体が成熟する。
- メス：1 歳でほとんどの個体が成熟する。

(2001年10月上旬における分布密度調査による標本より)

(4) 産卵期・産卵場

- ・産卵期：11月下旬～12月。
- ・産卵場：釧路～霧多布沿岸、根室沿岸、日高沿岸。

2. 漁業の概要

(1) 操業実勢

漁業	漁期	主漁場	主要な漁具	着業隻数（2014年度）
沖合底曳き網漁業	1～5月 9～12月	襟裳～釧路沖	かけまわし	広尾地区：2隻 釧路地区：7隻
ししゃもこぎ網漁業	10～11月	えりも町～厚岸町沿岸（水深30m以浅）		十勝管内：約90隻 釧路管内：約100隻
小定置網漁業 刺し網漁業	周年	厚岸町、根室半島、羅臼町沿岸		十勝・釧路管内：約70経営体 根室管内：約470経営体

(2) 資源管理に関する取り組み

- ・産卵場の保護、人工種苗の飼育、中間育成技術開発およびふ化仔魚の放流（広尾漁協）
- ・人工種苗育成と放流（釧路機船漁協）
- ・打ち上げブリコの回収、人工採卵およびふ化仔魚の放流（昆布森漁協）
- ・漁具の網目の拡大（刺し網漁業および定置網漁業）

3. 漁獲量および漁獲努力量の推移

(1) 漁獲量

道東海域のハタハタ漁獲量は1960年代～1970年代初期まで、1971年の6,511トンをピークに概ね2,000トン以上を維持していたが、1974年以降減少し1980年代までは1,000～2,000トン程度で推移した。1990年以降は1,000トンを下回る年が目立つようになり、2000年には過去最低の123トンまで減少した。その後、若干の回復をみせたものの1,000トンに達する年はなく、2003年以降さらに減少傾向を示している。2014年には1953年以降最低の96トンまで減少したが、2015年は247トンとやや回復した（表1、図1）。

沖合底びき網漁業の漁獲量は、1980年代～1990年代には数年の例外を除き300トン以上を維持し、1989年には1,437トンに達した。しかし、2000年および2001年に10トン台まで急減し、これ以降は100トンに達しない年が多い。2015年の漁獲量は17トンで2014年（15トン）と同様の水準に留まった。小海区別にみると、1990年代までは釧路～厚岸沖の漁獲が大部分を占めていたが、2002年以降急減し、近年は十勝海域の大津沖および襟裳・広尾沖の漁獲がほとんどである（図2）。

十勝海域の沿岸漁業（十勝沿岸）の漁獲量は1985～1993年までは数トン～10トン台で非

常に少なかったが 1994 年以降増加し、2006～2008 年には 200 トン前後に達した（図 3 上段）。しかし 2009 年以降減少し再び低い水準で推移している。漁獲のほとんどは 10～11 月のししゃもこぎ網漁業によるものである。2015 年の漁獲量は近年ではやや多い 63 トンであった。

釧路海域の沿岸漁業（釧路沿岸）の漁獲量は、1980～1990 年代には 100～500 トン台で変動していたが、2000 年に 48 トンまで急減した（図 3 中段）。2001 年以降はやや回復し、2008 年まで 100～200 トン台で推移したが、2009 年以降は再び 100 トンを下回っている。2015 年の漁獲量は 66 トンで 2014 年（22 トン）からやや回復した。漁業種類は刺し網、定置網およびししゃもこぎ網漁業が主体で、1990 年代後半以降はししゃもこぎ網の割合が大きい。漁獲時期は 9～12 月が大部分を占め（図 4 上段）、漁場は産卵場として知られる釧路町昆布森を中心とする数 10km の範囲である。これらから当海域では産卵のため接岸する釧路群を主対象としていると考えられる。

根室海域の沿岸漁業（根室沿岸）の漁獲量は、1985～1992 年には 87～241 トンで変動していたが、1993～1998 年に 400～700 トン台と高い水準に達した（図 3 下段）。ところが 2000 年には 48 トンにまで急減し、その後やや回復したものの 100 トンに達しない年が多い。2015 年の漁獲量は近年ではやや多い 102 トンであった。根室沿岸の漁獲量のほとんどは定置網（底建網）によるものである。釧路沿岸と同様に、漁獲時期は 9～12 月が大部分であり（図 4 下段）、当海域においても産卵期前後の根室群が主対象となっていると考えられる。

（2）漁獲努力量

沖合底曳き網漁業（かけまわし）は減船が続き 2013 年以降は現在の計 9 隻となっている。十勝・釧路管内のししゃもこぎ網漁業は総計約 190 隻で近年大きな変化はない。これらはいずれも他魚種を主対象としており、ハタハタの混獲は棲息域の水温や接岸時期にも影響されていると考えられる。ハタハタを専獲する秋期の刺し網漁業の着業者数は、秋田県で禁漁が行われた 1990 年代に著しく増加したが、近年は魚価安などにより地区あたり数隻以下まで減少していると思われる。根室管内では小定置網（底建網）が漁獲の大部分を占めているが、これらの漁業は経営体が極めて多く、様々な小型魚を対象としている。以上から、現状ではハタハタに対する漁獲努力量を正確に抽出することは困難である。

4. 資源状態

（1）今までの資源動向：産卵期漁獲量の推移

以下は釧路および根室海域における産卵期前後の沿岸漁業漁獲量等を用いて釧路群および根室群の資源状態を評価した。十勝海域の漁獲量等については日高群との分離が困難であると考えられるため、参考資料とする。日高群については資源評価書「日高群」を参照されたい。

釧路海域および根室海域における 9～12 月の沿岸漁獲量からみた資源状態は 1993～1998 年には比較的高い水準にあったことが伺われ、漁獲量で 600 トン以上を維持し 1995 年には 1,279 トンに達している（図 5）。しかし、1999 年以降急激に資源水準が低下したと考えられ、

2000 年に 75 トンまで急減、その後は 60~300 トン台で推移している。2015 年は 138 トンで 2014 年（約 57 トン）からやや回復した。

釧路海域の年齢別漁獲尾数は 1 歳が大部分を占めており、加入量が直接的に漁獲尾数に反映されている（図 6）。2007 年以降の 1 歳の漁獲尾数は 3 百万尾以下で推移しており、高豊度年級は出現していないと考えられる。2014 年は 1 歳（2013 年級）の漁獲量が極めて少なかったにも関わらず、翌年 2015 年の 2 歳以上が 32% を占め、2007 年とともに例外的な組成であった。2014 年の獲り残しが 2015 年に 2 歳で漁獲されたと解釈できる。

魚群分布調査による 2015 年の 1 歳の採集尾数は、2001, 2005, 2012 年に 3 千尾以上採集された以外は概ね千～2 千尾の間で推移している。2015 年は計 1,252 尾で前年（1,339 尾）とほぼ同程度の水準であった（図 7）。

（2）2015 年度の資源水準：低水準

過去 20 年間（1990～2009 年）の釧路海域および根室海域の 9～12 月の沿岸漁業漁獲量の平均値を 100 として各年の漁獲量を標準化（水準指数化）し、水準指数が 60 よりも低い場合を低水準、140 よりも高い場合を高水準と定義し資源水準を判断した。2015 年の水準指数は 38 で、「低水準」であった（図 8）。

（4）今後の資源動向：横ばい

これまで、釧路海域の魚群分布調査で採集される 0 歳魚採集尾数の変動が翌年以降の 1 歳魚以上の採集尾数や漁獲量に反映されることが認められ⁵⁾、資源動向を判断する根拠となってきた。しかし、2010～2014 年は比較的 0 歳採集尾数が多かったにも関わらず 2011 年以降の漁獲量に反映されていない。原因は不明である。2015 年の 0 歳魚採集尾数（図 9）は 581 尾と少なく、加入量が大幅に増加する兆候は認められない。したがって、今後の資源動向を「横ばい」と判断した。

5. 資源の利用状況

（1）分布調査における当歳魚採集尾数

釧路海域における魚群分布調査による 0 歳魚採集尾数は、2006～2009 年には 400～1,400 尾の低い水準であったのに対し、2010 年以降は 3,000 尾を超える年が多くなっている（図 9）。したがって、仔稚魚の生残条件が比較的良好になっていることが示唆されるとともに、それを産み出す親魚量が十分に確保されている状況と考えられることから、現状の資源利用状況は適切であると考えられる。一方、比較的高い水準で出現した 0 歳魚が、翌年以降の漁獲量増加に結びつかない原因として、漁獲努力量の減少や調査時期以降に減耗している可能性が考えられることから、漁業実態の把握を進めるとともに、加入状況を注視する必要がある。

評価方法とデータ

(1) 資源評価に用いた漁獲統計

沿岸漁獲量	・漁業生産高報告（ただし 2015 年度の値は暫定値） ・釧路市漁協のししゃもこぎ網漁業によるハタハタ銘柄別漁獲量
沖底漁獲量	・北海道沖合底曳網漁業漁場別漁獲統計年報（北水研・水産庁）の中海区「道東」に属する 8 小海区の値

(2) 年齢別漁獲尾数の推定方法

2003～2012 年の 10～11 月に釧路市前浜で行われたシシャモ漁期中調査⁶⁾（水深 7～20m 地点における小型底びき網を用いた漁獲調査）で採集されたハタハタの生物測定を行い、得られた年齢組成と平均体重および 9～12 月の釧路沿岸漁業漁獲量から同海域の年齢別漁獲尾数を推定した。2013～2015 年 11 月に釧路市前浜でししゃもこぎ網により漁獲されたハタハタの生物測定を行い、同様に 9～12 月の釧路沿岸漁業における年齢別漁獲尾数を推定した。

(3) 魚群分布調査

1999～2015 年 8～9 月に庶野・十勝海域（百人浜～大津沖の水深 10～70m）の 26 調査点、9～10 月に釧路海域（厚内沖～跡永賀沖の水深 5～80m）の 26 点調査点において小型底曳網の 10 分間曳網による漁獲調査を行い、採集されたハタハタの生物測定を行った（付図）。得られた資料のうち釧路海域の年齢別採集尾数等を釧路群の資源状態の指標とした。また十勝海域で採集されたハタハタについては上述のとおり日高群との分離が困難と考えられるため参考資料とした。

文 献

- 1) 小林時正：北海道周辺海域のハタハタの産卵群の計数形質変異から推定される系群構造について。北水研報. 46, 69–83 (1981)
- 2) 小林時正：北海道のハタハタの系統群構造。第2回ハタハタ研究協議会報告書。秋田県水産振興センター. 55–60 (1988)
- 3) 安永倫明, 石田良太郎, 後藤陽子：道東太平洋海域に分布するハタハタの移動について。平成16年度日本水産学会北海道支部例会講演要旨集. 75 (2004)
- 4) 平野和夫・石田良太郎：II-5 根室群 北海道のハタハタ資源。技術資料. No. 7, 91–92 (2011)
- 5) 石田良太郎, 平野和夫, 森岡泰三：釧路産卵群ハタハタ資源はどうして変動するのか？北水試だより. 72, 7–12 (2006)
- 6) 平野和夫：I.1-1-1 シシャモ。平成19年度北海道立釧路水産試験場事業報告書, 1–11 (2009)

表1 十勝、釧路、根室振興局管内の沿岸漁業および沖合底びき網漁業の漁獲量(1-12月)
(単位:トン)

年	十勝沿岸	釧路沿岸	根室沿岸	沖底	合計
1985	3	473	167	536	1,178
1986	2	338	241	413	994
1987	5	389	171	423	988
1988	5	397	132	523	1,057
1989	2	440	218	1,437	2,097
1990	7	444	198	669	1,317
1991	19	221	180	182	602
1992	16	136	87	202	442
1993	9	171	664	754	1,598
1994	99	348	532	435	1,413
1995	74	569	763	349	1,756
1996	107	224	495	102	927
1997	161	269	636	331	1,397
1998	163	402	594	372	1,531
1999	143	120	182	463	909
2000	11	48	48	16	123
2001	61	189	65	10	324
2002	86	266	90	273	715
2003	70	168	199	125	562
2004	95	201	75	228	600
2005	186	216	162	60	625
2006	257	226	105	90	678
2007	235	100	105	103	544
2008	204	130	56	95	484
2009	115	93	68	30	306
2010	16	81	69	174	341
2011	61	82	61	72	276
2012	21	69	110	155	354
2013	9	44	47	49	149
2014	11	22	48	15	96
2015	63	66	102	17	247

漁業生産高報告および沖底統計(沖合底びき網漁業)に基づく
2015年の沿岸漁業の値は水試集計速報値




図1 道東海域におけるハタハタ漁獲量の経年変化(単位:トン)

1984年以前の海域全体の漁獲量:北海道農林水産統計年報, 1985年以降の沖合底びき網漁業の漁獲量:北海道沖合底曳網漁業漁場別漁獲統計年報, 1985~2014年の沿岸漁業の漁獲量:漁業生産高報告, 2015年の沿岸漁業の漁獲量:水試集計速報値。




図2 沖合底びき網漁業の小海区別ハタハタ漁獲量の経年変化(単位:トン)

北海道沖合底曳網漁業漁場別漁獲統計年報による。




図3 十勝沿岸(上段), 釧路沿岸(中段)および根室沿岸(下段)の漁業種類別
ハタハタ漁獲量

漁獲量:漁業生産高報告。 2015年の値は水試集計速報値。





図4 釧路沿岸(上段)および根室沿岸(下段)の時期別漁獲量

漁獲量:漁業生産高報告。2015年の値は水試集計速報値。




図5 釧路群および根室群における産卵親魚の漁獲量(9~12月の釧路海域および根室海域における沿岸漁業の漁獲量)




図6 鉾路海域沿岸漁業における推定年齢別漁獲尾数(9~12月)の経年変化




図7 魚群分布調査(鉾路海域9~10月)で採集されたハタハタの年齢別採集尾数(漁獲対象である1歳以上の採集尾数を示した)




図8 道東太平洋海域におけるハタハタの資源水準

資源状態を示す指標：9~12月の鉾路沿岸および根室沿岸の漁獲量)





図9 魚群分布調査(釧路海域9~10月)におけるハタハタ0歳魚採集尾数の経年変化

付図 道東太平洋海域におけるハタハタ魚群分布調査地点図
●:調査地点