

魚種（海域）：キチジ（オホーツク海海域）

担当水試：網走水産試験場

要約表

評価年の基準 (2012年度)	資源評価方法	2012年度の 資源状態	2012年～2013年 の資源動向
2012年1月1日～ 2012年12月31日	はえなわCPUE (漁獲量/隻数)	中水準	不明

*生態については、別紙資料「生態表」を参照のこと。

1. 漁業

(1) 漁業の概要

オホーツク海において、キチジは「きちじはえなわ（以下、延縄）」と、「きちじ刺し網」によって主に漁獲されている。両漁業はもともと自由漁業であったものが1986年に承認漁業、1990年4月に知事許可漁業とされた（表1）。また、斜里の「その他刺し網」でも比較的多くのキチジが漁獲されている。さらに、沖合底びき網（以下、沖底）やその他の刺し網漁業でも若干漁獲されている。

知床半島東側（根室海峡）では、羅臼漁協所属の漁船が延縄および刺し網によってキチジを漁獲しており、標識放流の結果からこのキチジはオホーツク海で漁獲されているキチジと同一系群であると考えられる¹⁾。さらに、オホーツク海ロシア水域ではロシア船も操業し、1996年以降、網走港にキチジを水揚げしている。この輸入キチジは北見大和堆から北方につながる海底斜面で漁獲しているものと考えられ²⁾、同一系群である可能性が高い。

・操業時期・隻数

延縄・きちじ刺し網とも、流氷がない限り周年操業しており特に盛漁期といった時期はない。両漁業の着業隻数は2010年に延縄が1隻減船され、それ以降3隻となった。きちじ刺し網は2隻であった（表1）。

・漁具

延縄の許可内容は、1隻につき5放しで合計32,500m以内とされている。1鉢の長さは約52mでそれに72～73本の針がつけられている。したがって、総針数は約45,000本となる。1航海は基本的に2泊3日ですべての延縄を敷設し、揚縄する。一方、きちじ刺し網の許可内容は網の目合が内径で84～113mmであり、規模は1隻につき1放しが50反で5放しまで、合計11,000m以内とされている。これらを漁場各地に敷設し、1操業ごとに1～3放し分を揚網する。留め網は最低4日であり、時化等で9～10日間敷設されることもある。

・漁場

延縄漁業は網走を根拠港として北見大和堆周辺で営まれている³⁾。主漁場を4海域に分け、3隻で1週間ごとに隣の漁場に移っていくという漁場のローテーションを行っている。きちじ刺

し網漁業はウトロを根拠港として知床半島沖で営まれている。斜里の「その他刺し網」は共同漁業権区域内で営まれている。上述のとおり、知床半島東岸の根室海峡でも同系群の可能性が高いキチジが漁獲されている。

・漁獲物の特徴

延縄漁獲物は体長 20～25 cm の個体の割合が高く、体長 15 cm より小型の個体はほとんどみられない（図 1）。キチジの年齢査定は東北太平洋岸で行われているが^{4, 5)}、服部⁴⁾は大型魚での年齢査定は困難であることを報告している。当海域の漁獲物は前述のとおり、大型魚に偏る傾向があるため輪紋の計数が困難であること、また当海域において輪紋形成の年周期性などが未確認であるため年齢査定は行っていない。

(2) 現在取り組まれている資源管理方策

現在取り組まれている資源管理方策は、「1-(1) 漁業の概要」で述べた延縄ときちじ刺し網の許可制度による隻数と漁具数がある。詳細については、「1-(1) 漁業の概要」を参照のこと。

2. 評価方法とデータ

・漁獲量

漁獲量は 1985～2011 年は漁業生産高報告、2012 年は水試集計速報値を用いた。また、ロシア船の網走港への水揚げ数量は網走漁協所有のデータを基に、努力量（着業隻数）はオホーツク総合振興局および漁協からの聞き取りを基に、水試が集計した。

・漁獲努力量と CPUE

漁獲努力量として延縄ときちじ刺し網の着業隻数を示した（表 1）。また、延縄・きちじ刺し網ともに、1 隻あたりの年間漁獲量を CPUE として算出した（図 4）。

・資源水準判断基準

1985 年以降という長い期間データが蓄積されており、漁獲量のように隻数の変化の影響を受けにくい延縄 CPUE を資源水準判断の基準とした。1985～2004 年間の延縄 CPUE の平均値を 100 とし（平成 24 年度評価票）、平均 \pm 40 の範囲を「中水準」、それ以下を「低水準」、それ以上を「高水準」と定義して、資源水準を判断した。

・資源の将来予測

当海域のキチジについては資源動向を予測する方法がないため、将来予測は行わなかった。

3. 資源評価

(1) 漁獲量および努力量の推移

オホーツク総合振興局管内のキチジ漁獲量は、1950 年代から 1980 年代にかけては大きく変動しつつも、増加傾向にあった（図 2、表 2）。1984 年～1987 年には 4 年連続で 800 トンを超える漁獲がみられたが、その後漁獲量は減少し、2001 年には 271 トンにまで落ち込んだ。それ以降は 3 年連続で漁獲量は増加し、2004 年では 403 トンに達したが、その後、再び漁獲量は減

少に転じ、2010年の漁獲量は延縄船の減船の影響もあり203トンで過去最低を更新した。2011年の漁獲量は281トンと増加に転じたが、2012年の漁獲量は258トンで前年より若干減少した(図3)。漁業種別には、沖底の漁獲量の減少が顕著で1985年～1987年では100トン以上であったがその後減少し、1991年には50トンを、2000年には10トンを割り込み、2002年以降では2トン未満で推移している。延縄の漁獲量は、1986年～1991年には400トンを上回る漁獲があったがその後減少し、1997年以降90～200トンの間で推移している。きちじ刺し網は、1986年には200トンを上回る漁獲があったが、それ以外では60～170トンの間で推移している。また、斜里の「その他の刺し網」では、1995年以降30～50トンの安定した漁獲がみられる。

根室海峡における漁獲量は、1986年に1,212トンであったが、それ以降減少を続け、1994年には500トンを割り込み、2001年には99トンにまで落ち込んだ(図3、表2)。その後、オホーツク総合振興局管内と同様に漁獲量は増加し2003年には134トンに達したが、その後、再度減少に転じ2009年には過去最低の40トンとなった後、連続して増加し2012年の漁獲量は88トンであった。

ロシアからのキチジの輸入は1996年の82トンから始まり、1998年以降では2002年に輸入許可の関係から135トンと減少したのを除けば、2006年まで200トン以上が輸入されてきた。しかし2007年以降、輸入量は減少し2009年にはまったく輸入されなくなり(図3、表2)、その後、2010年には若干輸入されたものの(19トン)、2011～2012年の輸入量も0であった。

努力量として着業隻数をみると、1980～1991年では合計21～31隻と相対的に着業隻数は多かった(表1)。1992年以降は減少し1999年には合計15隻となった。この間、延縄の隻数が7から6と1隻減少し、ウトロの刺し網の隻数も4から2へと2隻減少していたが、羅臼漁協から知床半島西岸へ入会していた刺し網船の隻数の減少の影響が最も大きい。2000年以降は延縄船が2隻減船され4隻となったほか、羅臼漁協からの入会が解消されたためさらに合計隻数は減少した。その後、2007年には斜里地区の刺し網船が減船され、2010年には延縄船が1隻減船され合計5隻となった。

(2) 現在(評価年)までの資源状態

1986～1995年の延縄CPUEは47～68トン/隻と比較的高いレベルで推移していたが、1996年以降は連続して低下し、2001年には26トン/隻まで落ち込んだ。その後、連続して上昇し2004年には47トン/隻まで改善したが、その後再度低下し2007年以降では27～34トン/隻と低いレベルで推移している。このように、漁獲量・延縄CPUEともに2007年以降、当海域のキチジ資源が低い資源状態にあることを示していた。

(3) 評価年の資源水準：中水準

延縄CPUEを指標とした場合、2012年の延縄CPUEは31トン/隻、資源水準指数は67と算出され、資源状態は「中水準」と判断された(図5)。

(4) 今後の資源動向：不明

当海域のキチジについては翌年以降の資源動向を予測する方法がないため、資源の将来予測は困難である。したがって、今後の資源動向は不明とした。

4. 文献

- 1) 木下貴裕, 国広靖志, 多部田修: 標識放流に基づくオホーツク海南部におけるキチジの回遊. 日水誌. 65, 73-77 (1999)
- 2) 國廣靖志: I-4 キチジ資源評価基礎調査, 平成8年度北海道立網走水産試験場事業報告書, 100-118 (1998)
- 3) 國廣靖志: 「オホーツク海のキチジの漁業と生態」その1. 北水試だより. 28, 2-8 (1995)
- 4) 服部努: 東北太平洋岸沖におけるキチジの年齢と成長様式. 漁業資源研究会議 底魚部会報. 1, 3-10 (1998)
- 5) 後藤友明: 岩手県沖合域に生息するキチジ *Sebastes macrochir* の年齢, 成長, 成熟および食性. 岩手水技セ研報. 4, 39-47 (2004)

表1 網走支庁管内におけるキチジ漁業等の着業隻数の推移

許可名	年	延縄 網走	きちじ刺網			合計
			斜里	ウトロ	羅臼 (入会い)	
	1963	13				13
	1964	7				7
	1965	7				7
	1966	7				7
	1967	7				7
	1968	7				7
	1969	7				7
	1970	5				5
	1971	5				5
	1972	5				5
自由 漁業 等	1973	5				5
	1974	6				6
	1975	6				6
	1976	6				6
	1977	6				6
	1978	6				6
	1979	6			14	20
	1980	7			18	25
	1981	7			20	27
	1982	7			23	30
	1983	7			22	29
	1984	7		4	19	30
	1985	7	1	4	19	31
1986	7	1	4	18	30	
承認 漁業	1987	7	1	4	18	30
	1988	7	1	4	17	29
	1989	7	1	4	16	28
	1990	7	1	4	9	21
知事 許可 漁業	1991	7	1	4	9	21
	1992	7	1	2	9	19
	1993	7	1	2	6	16
	1994	7	1	2	9	16
	1995	6	1	2	6	15
	1996	6	1	2	6	15
	1997	6	1	2	6	15
	1998	6	1	2	6	15
	1999	6*1	1	2	6	15
	2000	4*2	1	2	0	7
	2001	4	1	2	0	7
	2002	4	1	2	0	7
	2003	4	1	2	0	7
	2004	4	1	2	0	7
	2005	4	1*3	2	0	7
	2006	4	1	2	0	7
	2007	4	0*4	2	0	6
	2008	4	0	2	0	6
2009	4	0	2	0	6	
2010	3	0	2	0	5	
2011	3	0	2	0	5	
2012	3	0	2	0	5	

*1：実際には1隻は休漁状態(H11年度事業報告書)。

*2：実際にはもう1隻が半年間操業を行った(H12年度事業報告書)。

*3：2月以降、着業していなかった。

*4：許可は1隻だが、着業していなかった。




図1 きちじはえなわ漁獲物の体長組成

4半期ごとの測定結果と標本船の年間銘柄別漁獲割合、延縄による総漁獲量から推定




図2 オホーツク海における1953年以降のキチジ漁獲量の推移




図3 オホーツク海および根室海峡におけるキチジ漁獲量(トン)の推移

表2 オホーツク海および根室海峡における漁業種別漁獲量

(単位:トン)

年	延縄 網走	きちじ刺網			その他の刺網					沖底			網走 合計	底延縄 羅臼	刺網		羅臼 合計	羅臼 網走 合計	保稅品 網走
		斜里	ウトロ	小計	斜里	ウトロ	網走	紋別	小計	紋別	網走	小計			羅臼 (共)	羅臼 (知)			
1985	317		175	175									825						
1986	415		269	269	24	0	0		24			148	136	136	845	10	1,202	1,212	2,056
1987	476		177	177	59	26			85				126	126	866	128	740	868	1,735
1988	409	127		127									90	90	625	226	748	974	1,599
1989	453	96	66	163		33			33				61	61	709	188	371	565	1,274
1990	420	26	66	93	8	44			52				68	68	634	84	447	532	1,165
1991	419	53	65	118		45			45				41	41	623	118	378	496	1,120
1992	343	39	119	158		36			36				26	26	564	163	391	555	1,119
1993	345	37	79	116	0	0			0				35	35	497	133	504	636	1,133
1994	328	53	93	145	17	11	0		28				27	27	529	58	395	453	981
1995	355	49	127	176	33	7	0		40				27	27	598	114	211	412	1,010
1996	264	39	117	156	32	15			47				72	72	539	121	242	437	976
1997	194	33	67	100	32	9	1		43				93	93	430	177	189	61	426
1998	173	38	66	104	28	15	23		66				20	20	363	179	67	62	307
1999	138	28	45	73	29	13	26		69				12	12	292	142	104		247
2000	156	36	60	95	40	9	26	7	81			0	5	5	337	67	89		156
2001	103	24	72	96	40	5	19	3	68				4	4	271	8	91		99
2002	137	30	76	106	32	5	18	5	60				1	1	305	2	103		105
2003	152	41	89	130	45	6	15	6	73				2	2	356	0	134		134
2004	187	41	102	143	50	3	14	5	72				1	1	403	0	122		123
2005	165	1	85	87	55	2	12	4	74				0	1	326	1	96		97
2006	153	22	73	96	41	1	13	2	57				1	1	307		69		69
2007	119	72	72		38	2	8	0	48				0	0	239		59		59
2008	125	65	65		32	0	13		45				0	0	236		55		56
2009	106	77	77		33	0	14	0	47				0	0	231		40		40
2010	90	67	67		30	0	15		46				0	0	203		49		49
2011	117	85	85		55	0	23		79				1	0	281		75	0	75
2012	92	88	88		41		36		77				1	1	258		88		88

(2012年は水試集計速報値)




図4 オホーツク海における延縄と刺し網のCPUE(1隻当りの漁獲量)の推移




図5 オホーツク海海域におけるキチジの資源水準指数の推移
 資源状態を示す指標は延縄CPUE(棒グラフ), 従来の指標(折れ線)は1996年以降の網走管内総漁獲量。水準分けは1985~2004年の延縄CPUEの平均値を100とし、平均±40の範囲を「中水準」、それ以下を「低水準」、それ以上を「高水準」と定義した。


生態表 魚種名：キチジ 海域名：オホーツク海海域

図 キチジ（オホーツク海海域）の漁場図

1. 分布・回遊

オホーツク海海域の大陸斜面の水深400～1,200mを中心に分布する。5～12月では浅所に、1～4月では深所に移動する傾向がみられる。

2. 年齢・成長（加齢の基準日：1月1日）

輪数	2輪	3輪	4輪	5輪	6輪	7輪	8輪	9輪	10輪	11輪	12輪	13輪
体長(cm)	15	16	16	18	18	20	21	22	22	24	24	24
内臓除去重量(g)	88	106	115	163	179	249	291	335	349	447	461	483

（平成21年度網走水産試験場事業報告書¹⁾より：当海域の漁獲物は大型魚に偏っており、輪紋の計数が困難であり、1年間の輪紋の形成回数也未確認であるため、年齢査定法は確立されていない。）

3. 成熟年齢・成熟体長

- ・オス：漁獲物の大部分は未熟であるため、成熟年齢は確定できない。
- ・メス：漁獲物の大部分は未熟であるため、成熟年齢は確定できない。

4. 産卵期・産卵場

- ・産卵期：4～5月頃と推定される。
- ・産卵場：産卵直前の個体はみられるが、極めて少なく産卵場を特定できる段階に至らない。

5. その他

卵は浮遊性の卵塊として産み出される²⁾。

6. 文献

- 1) 城幹昌：I-1.1.4 キチジ。平成21年度北海道立網走水産試験場事業報告書，19-25(2010)
- 2) 深滝弘：太平洋北西部から採集されたキチジの浮性卵囊。日水研研報，11，91-100(1994)