

**魚種（海域）：キチジ（オホーツク海海域）**

担当：網走水産試験場（佐々木 潤）

**要 約**

評価年度：2017年度（2017年1月～2017年12月）

2017年度の漁獲量：184トン（前年比1.02）

来遊水準の指標	北海道への来遊水準
はえなわ CPUE（漁獲量/隻数）	低水準

2017年度のオホーツク海海域におけるキチジの漁獲量は、184トンと前年（181トン）並みだった。2017年度の北海道への来遊状況を表す、延縄CPUEを指標とした資源水準指数は41と算出され、来遊水準は「低水準」と判断された。当資源はオホーツク海南西部の大陸棚斜面に分布範囲が広がっており、漁獲対象魚は本道の漁船が操業可能な水域に来遊した一部に限られると想定されることから、資源全体の動向は不明である。

**1. 資源の分布・生態的特徴****(1) 分布・回遊**

本海域のキチジは、オホーツク海南西部の大陸棚斜面に分布し、北見大和堆の群の多くは、北側のロシア水域から南下回遊してくると考えられている。この群は年を経るごとに知床岬周辺へ移動し、なかには太平洋側の歯舞から青森県三沢沖まで移動するものがいるが、ほとんど北見大和堆から移動しないものもいる。北見大和堆のはえ縄漁場は水深300～1,300mにあり、6～10月では水深600～800m、2～4月では800～1,000mと漁場水深が変化することから、冬に深み、夏に浅みへと深浅移動すると考えられている<sup>1)</sup>。

**(2) 年齢・成長（加齢の基準日：1月1日時点）**

輪数	2輪	3輪	4輪	5輪	6輪	7輪	8輪	9輪	10輪	11輪	12輪	13輪
体長(cm)	15	16	16	18	18	20	21	22	22	24	24	24
内臓除去重量(g)	88	106	115	163	179	249	291	335	349	447	461	483

（平成21年度網走水産試験場事業報告書<sup>2)</sup>より：当海域の漁獲物は大型魚に偏っており、耳石輪紋数の計数が困難であり、1年間の輪紋の形成回数も未確認であるため、年齢査定法は確立されていない。）

**(3) 成熟年齢・成熟体長**

- オス：漁獲物の大部分は未熟であるため、成熟年齢は確定できない。

- ・メス：漁獲物の大部分は未熟であるため、成熟年齢は確定できない。

#### (4) 産卵期・産卵場

- ・産卵期：4～5月頃と推定される<sup>1)</sup>。
- ・産卵場：産卵直前の個体はみられるが、極めて少なく産卵場を特定できる段階に至らない<sup>1)</sup>。卵は浮遊性の卵塊として産み出される<sup>3)</sup>。

## 2. 漁業の概要

### (1) 操業実勢

漁業	漁期	主漁場	主要な漁具	着業規模（2016年度）
きちじはえなわ漁業	周年	北見大和堆	はえなわ	3隻
きちじ刺し網漁業	周年	北見大和堆	刺し網	2隻

オホーツク海においてキチジは、「きちじはえなわ（以下、延縄）」漁業と、「きちじ固定式刺し網（以下、きちじ刺し網）」漁業によって主に漁獲されている。両漁業はもともと自由漁業であったものが1986年に承認漁業、1990年4月に知事許可漁業とされた（表1）。また、斜里の「その他刺し網」でも比較的多くのキチジが漁獲されている。さらに、沖合底びき網（以下、沖底）やその他の刺し網漁業でも若干量が漁獲されている。

知床半島東側（根室海峡）では、羅臼漁協所属の漁船が延縄および刺し網によってキチジを漁獲しており、さらに、オホーツク海ロシア水域ではロシア船も操業し、1996年以降、網走港にキチジを水揚げしていたが2010年以降はみられなくなった（表2：保税品網走）。

#### ・操業時期・隻数

延縄・きちじ刺し網とも、流氷がない限り周年操業しており特に盛漁期といった時期はない。両漁業の着業隻数は2010年に延縄が1隻減船され、それ以後3隻となった。きちじ刺し網は2隻である（表1）。

#### ・漁具

延縄の許可内容は、1隻につき5放しで合計32,500m以内とされている。1鉢の長さは約52mでそれに72～73本の針がつけられている。したがって、総針数は約45,000本となる。1航海は基本的に2泊3日ですべての延縄を敷設し、揚縄する。一方、きちじ刺し網の許可内容は網の目合が内径で84～113mmであり、規模は1隻につき1放しが50反で5放しまで、合計11,000m以内とされている。これらを漁場各地に敷設し、1操業ごとに1～3放し分を揚網する。留め網は最低4日であり、時化等で9～10日間敷設されることもある。

#### ・漁場

延縄漁業は網走を根拠港として北見大和堆周辺で操業されている<sup>4)</sup>。操業形態は、主漁場を4海域に分け、3隻で1週間ごとに隣の漁場に移っていくという漁場のローテーションを行っている。きちじ刺し網漁業はウトロを根拠港として知床半島沖で営まれている。斜里の「その他刺し網」は共同漁業権区域内で操業されている。知床半島東岸の根室海峡で

も同系群のキチジが漁獲されている可能性が高い。

#### ・漁獲物の特徴

延縄漁獲物は体長 20~25 cm の個体の割合が高く、体長 15 cm より小型の個体はほとんどみられない（図 1）。キチジの年齢査定は東北太平洋岸で行われているが<sup>5, 6)</sup>、服部<sup>5)</sup>は大型魚での年齢査定は困難であることを報告している。当海域の漁獲物は、大型魚に偏る傾向があるため輪紋の計数が困難であること、また当海域において輪紋形成の年周期性などが未確認であるため年齢査定は行っていない。なお、2012 年度以降は生物測定を行っていない。

#### （2）資源管理に関する取り組み

延縄ときちじ刺し網の知事許可制度による隻数と漁具数の規制が行われている。

### 3. 漁獲量および漁獲努力量の推移

#### （1）漁獲量

オホーツク総合振興局管内のキチジ漁獲量は、1950 年代から 1980 年代にかけては大きく変動しつつも、増加傾向にあった（図 2、表 2）。1984~1987 年には 4 年連続で 800 トンを超える漁獲がみられたが、その後漁獲量は減少し、2001 年には 271 トンにまで落ち込んだ。それ以降は 3 年連続で漁獲量は増加し、2004 年では 403 トンに達したが、その後、再び漁獲量は減少に転じ、2010 年の漁獲量は延縄船の減船の影響もあり 203 トンで 1985 年以降最低となった（図 3）。2011 年の漁獲量は 281 トンと増加に転じたが、その後再度減少を続け、2017 年の漁獲量は 135 トンとなった。漁業種別には、沖底の漁獲量の減少が顕著で 1985~1987 年では 100 トン以上であったがその後減少し、1991 年には 50 トンを、2000 年には 10 トンを割り込み、2002 年以降では 2 トン未満で推移している。延縄の漁獲量は、1986~1991 年には 400 トンを上回る漁獲があったがその後減少し、1997 年以降 200~100 トン未満へと緩やかに減少している。きちじ刺し網は、1986 年には 200 トンを上回る漁獲があったが、それ以外では 40~170 トンの間で推移している。また、斜里の「その他の刺し網」では、1995 年以降 30~50 トンの安定した漁獲がみられたが、2016 年以降はほぼ半減している。

根室海峡における漁獲量は、1986 年に 1,212 トンであったが、それ以降減少を続け、1994 年には 500 トンを割り込み、2001 年には 99 トンにまで落ち込んだ（図 3、表 2）。その後、オホーツク総合振興局管内と同様に漁獲量は増加し 2003 年には 134 トンに達したが、その後、再度減少に転じ 2009 年には過去最低の 40 トンとなった。しかし 2010 年以降、漁獲量は増加したが、近年は再び減少傾向となり 2017 年は 49 トンとなった。

ロシア船により網走港に水揚げされたキチジは 1996 年の 82 トンに始まり、1998 年以降では 2002 年に輸入許可の関係から 135 トンと減少したのを除けば、2006 年まで 200 トン以上が水揚げされてきた。しかし 2007 年以降は減少を続け、2009 年以降は 2010 年の若干量を除き水揚げされなくなった（図 3、表 2：保税品網走：網走漁協の保税倉庫の通関前のロシア漁船による漁獲物の重量）。

## (2) 漁獲努力量

漁獲努力量として着業隻数の推移をみると、1980～1991年では合計21～31隻と相対的に着業隻数は多かった（表1）。1992年以降は減少し1999年には合計15隻となった。この間、延縄の隻数が7から6へと1隻減少し、ウトロの刺し網の隻数も4から2へと2隻減少していたが、羅臼漁協から知床半島西岸へ入会いしていた刺し網船の隻数の減少の影響が最も大きい。2000年以降は延縄船が2隻減船され4隻となったほか、羅臼漁協からの入会いが解消されたためさらに合計隻数は減少した。その後、2007年には斜里地区の刺し網船が減船され、2010年には延縄船が1隻減船され合計5隻となり2017年まで変化していない。

## 4. 資源状態

当資源はオホーツク海南西部の大陸棚斜面に分布範囲が広がっており、漁獲対象となっているのは本道の漁船が操業可能な水域に来遊した一部に限られると想定されることから、資源全体の動向は不明である。

## 5. 北海道への来遊状況

### (1) 2017年度の北海道への来遊状況：低水準

1986～1995年の延縄CPUEは47～68トン/隻と比較的高いレベルで推移していたが、1996年以降は連續して低下し、2001年には26トン/隻まで落ち込んだ。その後、連續して上昇し2004年には47トン/隻まで上昇して、その後再度低下し2007年以降では27～34トン/隻の範囲で推移していたが、2017年は14トン/隻まで低下した（図4）。

北海道への来遊状況の指標として、歴史的に漁獲量が最も多い理由から延縄CPUEを水準判断に用いた。1995～2014年の間の延縄CPUEの平均値を100とし、平均±40の範囲を「中水準」、それ以下を「低水準」、それ以上を「高水準」と定義して、資源水準を判断した。その結果、2017年度の北海道への来遊状況の資源水準指数は41と算出され、「低水準」と判断された（図5）。

### (2) 今後の動向：不明

当海域のキチジについては、今後の動向を予測する方法がないため、不明であるが、近年急激にCPUEが減少していることから、今後の動向を注視する必要がある。

## 評価方法とデータ

### (1) 資源評価に用いた漁獲統計

漁獲量	漁業生産高報告（ただし 2017 年度の値は水試集計速報値）
努力量	きちじ固定式刺網漁業漁獲成績報告書, きちじはえ縄漁業漁獲成績報告書

### (2) CPUE

延縄・きちじ刺し網とともに、1隻あたりの年間漁獲量を CPUE として算出した。

## 文 献

- 1) 國廣靖志：“キチジ”. 漁業生物図鑑新北のさかなたち. 監修 水島敏博・鳥澤雅, 札幌, 北海道新聞社 (2003)
- 2) 城幹昌 : I-1.1.4 キチジ. 平成21年度北海道立網走水産試験場事業報告書, 19-25 (2010)
- 3) 深滝弘:太平洋北西部から採集されたキチジの浮性卵嚢. 日水研研報, 11, 91-100 (1994)
- 4) 國廣靖志:「オホーツク海のキチジの漁業と生態」その1. 北水試だより. 28, 2-8 (1995)
- 5) 服部努:東北太平洋岸沖におけるキチジの年齢と成長様式. 漁業資源研究会議 底魚部会報. 1, 3-10 (1998)
- 6) 後藤友明:岩手県沖合域に生息するキチジ *Sebastolobus macrochir* の年齢, 成長, 成熟および食性. 岩手水技セ研報. 4, 39-47 (2004)

表1 オホーツク海および根室海峡におけるキチジ漁業等の着業隻数の推移

許可名	年	延縄 網走	きちじ刺網			合計
			斜里	ウトロ	羅臼 (入会い)	
	1963	13				13
	1964	7				7
	1965	7				7
	1966	7				7
	1967	7				7
	1968	7				7
	1969	7				7
	1970	5				5
	1971	5				5
	1972	5				5
自由 漁業 等	1973	5				5
	1974	6				6
	1975	6				6
	1976	6				6
	1977	6				6
	1978	6				6
	1979	6		14		20
	1980	7		18		25
	1981	7		20		27
	1982	7		23		30
	1983	7		22		29
	1984	7	4	19		30
	1985	7	1	4	19	31
	1986	7	1	4	18	30
	1987	7	1	4	18	30
承認 漁業	1988	7	1	4	17	29
	1989	7	1	4	16	28
	1990	7	1	4	9	21
	1991	7	1	4	9	21
	1992	7	1	2	9	19
	1993	7	1	2	6	16
	1994	7	1	2	9	16
	1995	6	1	2	6	15
知事 許可 漁業	1996	6	1	2	6	15
	1997	6	1	2	6	15
	1998	6	1	2	6	15
	1999	6*1	1	2	6	15
	2000	4*2	1	2	0	7
	2001	4	1	2	0	7
	2002	4	1	2	0	7
	2003	4	1	2	0	7
	2004	4	1	2	0	7
	2005	4	1*3	2	0	7
	2006	4	1	2	0	7
	2007	4	0*4	2	0	6
	2008	4	0	2	0	6
	2009	4	0	2	0	6
	2010	3	0	2	0	5
	2011	3	0	2	0	5
	2012	3	0	2	0	5
	2013	3	0	2	0	5
	2014	3	0	2	0	5
	2015	3	0	2	0	5
	2016	3	0	2	0	5
	2017	3	0	2	0	5

\*1：実際には1隻は休漁状態(H11年度事業報告書)。

\*2：実際にはもう1隻が半年間操業を行った(H12年度事業報告書)。

\*3：2月以降、着業していなかった。

\*4：許可是1隻だが、着業していなかった。




図1 きちじ延縄漁獲物の体長組成

4半期ごとの測定結果と標本船の年間銘柄別漁獲割合、延縄による総漁獲量から推定  
漁獲物の生物測定が2012年度で終了となった。




図2 オホーツク海における1953年以降のキチジ漁獲量の推移




図3 オホーツク海および根室海峡におけるキチジ漁獲量(トン)の推移

(保税品網走:網走漁協の保税倉庫の通関前のロシア漁船による漁獲物の重量)

表2 オホーツク海および根室海峡における漁業種別漁獲量

(単位:トン)

年	延縄 網走	きちじ刺し網			その他の刺し網					沖底			オホーツク 網走	底延縄 羅臼	刺し網		根室海峡 合計	保税品 網走
		斜里	ウトロ	小計	斜里	ウトロ	網走	紋別	小計	網走	小計	合計			羅臼 (共)	羅臼 (知)		
1985	317	175	175	175					148	179	327	825						
1986	415	269	269	269	24	0	0	0	24	136	136	845	10	1,202		1,212	2,056	
1987	476	177	177	177	59	26			85	126	126	866	128	740		868	1,735	
1988	409	127		127						90	90	625	226	748		974	1,599	
1989	453	96	66	163					33	61	61	709	188	371		565	1,274	
1990	420	26	66	93	8	44			52	68	68	634	84	447		532	1,165	
1991	419	53	65	118					45	41	41	623	118	378		496	1,120	
1992	343	39	119	158					36	26	26	564	163	391		555	1,119	
1993	345	37	79	116	0	0			0	35	35	497	133	504		636	1,133	
1994	328	53	93	145	17	11	0		28	27	27	529	58	395		453	981	
1995	355	49	127	176	33	7	0		40	27	27	598	114	211	87	412	1,010	
1996	264	39	117	156	32	15			47	72	72	539	121	242	74	437	976	
1997	194	33	67	100	32	9	1		43	93	93	430	177	189	61	426	856	
1998	173	38	66	104	28	15	23		66	20	20	363	179	67	62	307	670	
1999	138	28	45	73	29	13	26		69	12	12	292	142	104		247	538	
2000	156	36	60	95	40	9	26	7	81	0	5	5	337	67	89		156	
2001	103	24	72	96	40	5	19	3	68		4	4	271	8	91		370	
2002	137	30	76	106	32	5	18	5	60	0	1	1	305	2	103		105	
2003	152	41	89	130	45	6	15	6	73	0	2	2	356	0	134		134	
2004	187	41	102	143	50	3	14	5	72		1	1	403	0	122		123	
2005	165	1	85	87	55	2	12	4	74	0	1	1	326	1	96		97	
2006	153	22	73	96	41	1	13	2	57		1	1	307	69	69		376	
2007	119	72	72	38	2	8	0		48	0	0		239	59	59		298	
2008	125	65	65	32	0	13			45	0	0	0	236	55	56		291	
2009	106	77	77	33	0	14	0		47	0	0	1	231	40	40		271	
2010	90	67	67	30	0	15			46	0	0	0	203	49	49		252	
2011	117	85	85	55	0	23			79	1	0	1	281	75	0		356	
2012	92	88	88	41					77	1	1		258	88	88		346	
2013	91	70	70	41					71	0	0		232	77	77		309	
2014	69	74	74	37					65	2	2		209	77	0		287	
2015	63	57	57	31					53	2	2		174	56	0		231	
2016	46	56	56	14					31	2	2		134	46	0		181	
2017	43	65	65	14	0	10			23	3	3		135	49	0		184	

(2017年は水試集計速報値)




図4 オホーツク海における延縄ときちじ刺し網のCPUE(1隻当たりの漁獲量)の推移




図5 オホーツク海海域におけるキチジの来遊水準指数の推移

資源状態を示す指標は延縄CPUE。水準分けは1995～2014年の延縄CPUEの平均値を100とし、平均±40の範囲を「中水準」、それ以下を「低水準」、それ以上を「高水準」と定義した。