

令和6年度 定期作況報告

(8月20日現在)

北海道立総合研究機構 農業研究本部
畜産試験場

I 気 象 概 況

7月下旬：平均気温は22.9℃（平年差+1.3℃）で平年よりやや高かった。降水量は81.5mm（平年比188%）で平年よりやや多かった。日照時間は40.9時間（平年比89%）で平年並であった。

8月上旬：平均気温は23.4℃（平年差+2.0℃）で平年よりやや高かった。降水量は21.5mm（平年比32%）で平年よりやや少なかった。日照時間は24.4時間（平年比63%）で平年よりかなり少なかった。

8月中旬：平均気温は22.0℃（平年差+2.6℃）で平年よりかなり高かった。降水量は49.0mm（平年比49%）で平年よりやや少なかった。日照時間は21.2時間（平年比67%）で平年よりかなり少なかった。

以上のことから、本期間は平年と比較して気温はかなり高く、降水量はやや少なく、日照時間はかなり少なかった。

	7月下旬			8月上旬			8月中旬		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温（℃）	22.9	21.6	1.3	23.4	21.4	2.0	22.0	19.4	2.6
最高気温（℃）	27.9	26.4	1.5	28.7	26.2	2.5	26.9	23.9	3.0
最低気温（℃）	19.1	17.7	1.4	20.1	17.6	2.5	19.0	15.8	3.2
降 水 量（mm）	81.5	43.4	38.1	21.5	66.3	△44.8	49.0	100.6	△51.6
降水日数（日）	7.0	4.6	2.4	5.0	4.7	0.3	9.0	5.8	3.2
日照時間（時間）	40.9	45.9	△5.0	24.4	38.9	△14.5	21.2	31.8	△10.6

注1) 各数値は旬の平均または合計。△は減を示す。

注2) 平年値は前10か年の平均値。

Ⅱ 作 況

1. 牧草 採草型チモシー

2 番 草 作 況 : 不良

3 番 草 作 況 : やや良

事 由 :

<2 番草>

収穫時の草丈は、2 年目草地で平年並、3 年目草地でやや高かったが、2、3 年目草地の平均では平年並であった。2 番草の乾物収量は、対平年比が2 年目草地で81%、3 年目草地で92%、2、3 年目草地の平均では86%であった。

以上のことから、2 番草の作況は「不良」である。

<3 番草>

8 月 20 日現在の草丈は、2 年目草地で平年並、3 年目草地で平年より高く、2、3 年目草地の平均ではやや高かった。

以上のことから、3 番草の目下の作況は「やや良」である。

調査項目	2年目草地			3年目草地		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較
2番草収穫日(月・日)	8.5	8.3	2	8.5	8.3	2
生育日数 (日)	53	50	3	53	50	3
収穫時草丈 (cm)	77	78	△ 1	82	74	8
生草収量 (kg/10a)	854	960	△ 106	924	849	75
乾物率 (%)	18.7	21.2	△ 2.5	19.1	23.2	△ 4.1
乾物収量 (kg/10a)	159.6	196.4	△ 36.8	176.0	191.9	△ 15.9
同上平年比 (%)	81	100	△ 19	92	100	△ 8
1～2番草通算						
乾物収量 (kg/10a)	955.1	852.2	102.9	846.0	787.4	58.6
同上平年比 (%)	112	100	12	107	100	7
3番草草丈 (cm) (8月20日)	40	39	1	39	31	8

注 1) 平年値は2年目草地が前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値、3年目草地は前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(平成29年)を除く5カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

2. サイレージ用とうもろこし

作 況：平年並

事 由：

本年の雄穂開花期は7月25日、絹糸抽出期は7月23日で、いずれも平年より6日早かった。8月20日現在、葉数は16.6枚で平年と等しく、稈長は平年より14cm低い229cmであったが、差は標準偏差内であった。

以上のことから、目下の作況は「平年並」である。

調査項目	本年	平年	比較
雄穂開花期（月．日）	7.25	7.31	△ 6
絹糸抽出期（月．日）	7.23	7.29	△ 6
稈 長（cm）	229	243	△ 14
葉 数（枚）	16.6	16.6	0.0

注 1) 平年値は前7カ年のうち最豊年(令和2年)と最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。
2) △は減または早を示す。
3) 供試品種は「KD320」。