

平成 24 年度

(2012)

赤潮・特殊プランクトン 予察調査報告書

平成 25 年 3 月

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

北海道

目次

<貝毒プランクトンモニタリング調査>

1. 調査の概要

（１）目的	1
（２）調査海域，調査期間および担当機関	1
（３）調査項目および調査方法	2

2. 調査結果と考察

A ホタテガイの毒化および出荷規制状況	2
（１）麻痺性貝毒による毒化および出荷規制期間	3
（２）下痢性貝毒による毒化および出荷規制期間	3
B 貝毒プランクトンの出現状況	
（１）日本海南部，石狩湾，日本海北部 （江差，浜益，増毛）	5
（２）宗谷北部・南部，網走北部・中部・南部，サロマ湖，能取湖海域 （猿払，頓別，紋別，常呂，網走，サロマ湖，能取湖）	5
（３）根室海峡，太平洋東部・西部海域 （標津，厚岸，静内）	5
（４）噴火湾東部・西部・湾口部，津軽海峡海域 （虻田，八雲および森，鹿部，知内）	5
（５）貝毒プランクトン種別の出現と毒化との関係	13
C その他二枚貝の毒化状況	13

3. 要約	14
付表（貝毒プランクトンの出現状況と海洋条件）	16
付図（麻痺性貝毒および下痢性貝毒の年間最高毒性値の経年変動）	32

＜貝毒プランクトンモニタリング調査＞

北海道立総合研究機構中央水産試験場資源管理部 品田晃良，嶋田宏

同 函館水産試験場調査研究部 馬場勝寿，金森誠，佐藤政俊

同 網走水産試験場調査研究部 平野和夫，清河進

株式会社日本海洋生物研究所，北海道立衛生研究所，日本冷凍食品検査協会札幌検査所

檜山南部・石狩・留萌南部・稚内・稚内（枝幸支所）・網走西部・網走東部・根室（標津支所）・釧路・

日高（静内支所）・胆振・渡島北部・渡島中部 各地区水産技術普及指導所

1. 調査の概要

（１）目的

北海道全域における貝毒プランクトン出現と貝毒発生の傾向を把握して，貝類の計画的出荷をサポートすることを目的とする。

（２）調査海域，調査期間および担当機関

北海道沿岸における貝毒規制海域区分と貝毒プランクトン調査定点を図1に示した。定点の位置および担当機関を表1に示した。1999年にオホーツク海南部から能取湖海域が分離し，2005年にオホーツク海北部が宗谷北部・同南部に，オホーツク海南部が網走北部・同中部・同南部にそれぞれ細分化された結果，貝毒規制海域は19海域となっている。貝毒プランクトン調査は，1989年から2005年4月まで，ホタテガイ主産地（オホーツク海，根室海峡，噴火湾，日本海）における10定点で実施されてきた。ところが2005年4月上旬に太平洋東部海域産マガキに麻痺性貝毒が発生したことを機に，ホタテガイ主産地以外の海域を含めた貝毒プランクトン出現と貝毒発生の傾向を包括的に把握する必要が生じた。このため2005年5月から2007年3月に、ホタテガイ主産地以外の調査点を加えた21定点で貝毒プランクトン調査が実施された。この結果をふまえて，海況および貝毒プランクトンの出現傾向が隣接する海域と類似している3定点（寿都，広尾，様似）を廃止した。以後，2009年3月に苫小牧定点を廃止して4月に静内定点を新設，2010年3月に小平定点を廃止して4月に増毛定点を新設している。現在は，17海域18定点で貝毒プランクトン調査を実施している（図1，表1）。




図1 貝毒規制の海域区分とプランクトン調査点（2012年）

表1 2012年の貝毒プランクトン調査定点一覧

海域区分	定点	位置	担当機関			
			N	E	現地調査	検鏡
日本海南部	江差	江差町鷗島沖3.7km	41-52	140-05	檜山南部水指	中央水試
石狩湾	浜益	浜益漁港沖3.8km	43-36	141-22	石狩水指	中央水試
日本海北部	増毛	増毛漁港沖6.9km	43-55	141-31	留萌南部水指	中央水試
宗谷北部	猿払	猿払村浜鬼志別漁港沖5.6km	45-23	142-14	稚内水指	中央水試
宗谷南部	頓別	浜頓別町頓別漁港沖6.8km	45-08	142-23	稚内水指枝幸支所	網走水試
網走北部	紋別	紋別港沖6.7km	44-21	143-19	網走西部水指	網走水試
網走中部	常呂	サロマ湖第2湖口沖2.7km	44-10	143-57	網走東部水指	中央水試
サロマ湖	サロマ湖	サロマ湖中央部	44-08	143-52	網走東部水指	中央水試
能取湖	能取湖	能取湖中央部	44-02	144-08	西網走漁協	網走水試
網走南部	網走	網走川河口沖7.5km	44-03	144-19	網走漁協	網走水試
根室海峡	標津	標津町伊茶仁沖5.4km	43-43	145-10	標津漁協	中央水試
太平洋東部	厚岸	厚岸湾中央部	42-59	144-47	釧路水指	中央水試
太平洋中部	静内	春立漁港沖2.5km	42-15	142-28	日高水指静内支所	函館水試
噴火湾東部	虻田	虻田漁港沖1.8km	42-31	140-46	胆振水指	函館水試
噴火湾西部	八雲	八雲漁港沖5.4km	42-17	140-21	函館水試	函館水試
噴火湾西部	森	森漁港沖3km	42-05	140-33	渡島北部水指	函館水試
噴火湾口部	鹿部	鹿部漁港沖2.7km	42-01	140-49	渡島北部水指	函館水試
津軽海峡	知内	中の川漁港沖2km	41-39	140-27	渡島中部水指	函館水試

(3) 調査項目および調査方法

a) 水温および塩分

水温と塩分は原則としてメモリーSTD（アレック電子社製）を用いて測定した。

b) 貝毒プランクトン（麻痺性貝毒原因種 *Alexandrium tamarense*,

下痢性貝毒原因（被疑）種 *Dinophysis fortii*, *D. acuminata* ほか *Dinophysis* 属の種）

各定点各層から採水した海水 1～2 リットルを目合い 10 μ m または 20 μ m のプランクトンネットですく過して、1～10ml まで濃縮し、1～3%中性フォルマリンまたはグルタルアルデヒドで固定して、検鏡試料を得た。この試料 1/10 について Calcofluorwhite または Whitec BB 染色を施し、落射蛍光顕微鏡を用いて紫外線励起下で検鏡して、貝毒プランクトンを計数した。計数結果の取りまとめに際しては、外部形態が類似している

D. acuminata と *D. ovum* を *D. acuminata* として整理した。

2. 調査結果と考察

A ホタテガイの毒化および出荷規制状況

貝毒検査は、北海道沿岸 19 海域区分において実施されている（図 1）。貝毒検査には自主検査および行政検査があり、それぞれ、漁業協同組合および北海道水産林務部が日本冷凍食品検査協会にマウスアッセイによる検査を依頼している。この他に北海道立衛生研究所が適宜、検査を実施している。本報告で用いた貝毒力の測定結果は北海道漁業協同組合連合会および北海道水産林務部が発表した資料である。

各海域における麻痺性および下痢性貝毒による海域別ホタテガイ毒化状況を図 2 に、生鮮ホタテガイの出荷自主規制期間を表 2 にそれぞれ示し、北海道沿岸におけるホタテガイの毒化状況と生鮮貝の出荷規制状況の

概要を述べる。なお、過去の麻痺性および下痢性貝毒による海域別毒化状況については、巻末の付図 1～3 に示した。

(1) 麻痺性貝毒による毒化および出荷規制期間

麻痺性貝毒による出荷自主規制値（4MU/g-可食部）を超える毒化は、7月に網走南部海域と網走中部海域で認められた。出荷自主規制の期間は、網走南部海域では7月下旬から8月中旬、網走中部海域では7月下旬から9月上旬であった。それ以外の海域では、麻痺性貝毒による出荷自主規制を超える毒化は認められなかった。

(2) 下痢性貝毒による毒化および出荷規制期間

下痢性貝毒による出荷自主規制値（0.05MU/g-可食部）を超える毒化は、7月に根室海峡海域と噴火湾湾口海域で認められた。出荷自主規制の期間は、根室海峡海域では7月上旬から8月上旬、噴火湾湾口海域では7月上旬から11月下旬であった。それ以外の海域では、下痢性貝毒による出荷自主規制を超える毒化は認められなかった。

表2 2012年の生鮮ホタテガイの出荷自主規制の期間

海域区分	麻痺性貝毒	下痢性貝毒
	規制開始年月日～解除年月日	規制開始年月日～解除年月日
噴火湾東部	なし	なし
噴火湾西部	なし	なし
噴火湾湾口	なし	2012/7/5-11/30
津軽海峡	なし	なし
日本海南部	なし	なし
日本海中部	なし	なし
石狩湾	なし	なし
日本海北部	なし	なし
宗谷北部	なし	なし
宗谷南部	なし	なし
網走北部	なし	なし
網走中部	2012/7/26-9/6	なし
網走南部	2012/7/24-8/18	なし
サロマ湖	なし	なし
能取湖	なし	なし
根室海峡	なし	2012/7/5-8/4
太平洋東部	なし	なし
太平洋中部	なし	なし
太平洋西部	なし	なし




図2 2012年の海域別ホタテガイ毒化状況および生鮮ホタテガイの出荷自主規制期間（上段：麻痺性貝毒（中腸線），中段：麻痺性貝毒（可食部），下段：下痢性貝毒（可食部））。北海道漁業協同組合連合会および北海道水産林務部発表の資料に基づき，毒力を示した。出荷自粛期間は省略。

B 貝毒プランクトンの出現状況

2012 年の 18 定点における水温・塩分、*Alexandrium tamarense* および *Dinophysis* 属数種の鉛直分布の季節変化を図 3～8 に示した。

(1) 日本海南部，石狩湾，日本海北部海域

(江差，浜益，増毛，図 3)

表面水温は 4 月に 6～9℃で，最高水温は 8～9 月に 23～27℃を記録した。塩分は表層を除き，他の海域より高めの 33～34psu 前後で推移した。これは対馬暖流系水（塩分>33.6psu）の卓越によるものと推察される。

Alexandrium tamarense は出現しなかった。

Dinophysis 属のうち，*D. fortii* は 4 月と 7 月にわずかに出現した（10 細胞/L）。*D. acuminata* は 4 月と 6 月に出現し，最高出現数は 4/18 の浜益と 4/25 の増毛で 30 細胞/L であった。

(2) 宗谷北部・南部，網走北部・中部・南部，サロマ湖，能取湖海域

(猿払，頓別，紋別，常呂，網走，サロマ湖，能取湖，図 4～6)

表面水温は 4 月に 0～6℃で，最高水温は 8～9 月に 18～23℃を記録した。表面塩分は 5 月以降上昇して 6～7 月には外海で 33.5psu 以上に達した。この塩分上昇は宗谷暖流系水（>33.6psu）の卓越によるものと推察される。湖内の塩分は外海と比較して約 0.5～1.5psu 低めに推移した。

Alexandrium tamarense は 6～7 月に出現し，最高出現数は 7/21 の紋別で 130 細胞/L であった。

Dinophysis 属のうち，*D. fortii* は 6～11 月に出現し，最高出現数は 9/3 のサロマ湖で 90 細胞/L であった。*D. acuminata* は 4～8 月および 10～12 月に出現し，最高出現数は 5/15 の能取湖で 580 細胞/L であった。

(3) 根室海峡，太平洋東部・中部海域

(標津，厚岸，静内，図 6～7)

表面水温は 4 月に 1～7℃で，最高水温は 9 月に 19～23℃を記録した。表面塩分は 8 月以降に高い値を取り，根室海峡では 10 月に約 33.5psu，太平洋東部では 10 月に約 32.5psu，太平洋中部では 12 月に約 33.9psu に達した。この塩分上昇は，根室海峡では宗谷暖流の卓越，太平洋東部海域では宗谷暖流の影響を受けた沿岸親潮（道東沿岸流）の卓越，太平洋中部海域では津軽暖流水（塩分>33.6psu）の卓越によるものと推察される。

Alexandrium tamarense は 5～8 月に出現し，最高出現数は 7/12 の標津で 90 細胞/L であった。

Dinophysis 属のうち，*D. fortii* は 7～11 月に出現し，最高出現数は 7/3 の静内で 190 細胞/L であった。*D. acuminata* は 1～3 月および 5～12 月に出現し，最高出現数は 8/6 の厚岸で 130 細胞/L であった。*D. norvegica* は 4～10 月に出現し，最高出現数は 6/28 の厚岸で 370 細胞/L であった。

(4) 噴火湾東部・西部・湾口部，津軽海峡海域

(虻田，八雲および森，鹿部，知内，図 7～8)

表面水温は 4 月に 3～8℃で，最高水温は 9 月に 23～26℃を記録した。表面塩分は津軽海峡海域を除いて 5 月に 28～31.5psu と低めであったが 10 月以降は高い値をとり約 33psu に達した。この塩分上昇は津軽暖流水（塩分>33.6）の卓越によるものと推察される。津軽海峡海域の塩分は期間を通じて全層が 33.5psu 以上で

あった。

Alexandrium tamarense は3～7月に出現し、最高出現数は5/1の森で160細胞/Lであった。

Dinophysis 属のうち、*D. fortii* は6～8月に出現し、最高出現数は7/30の虻田で160細胞/Lであった。*D. acuminata* は1～8月に出現し、最高出現数は6/25の八雲で420細胞/Lであった。*D. norvegica* は4～8月に出現し、最高出現数は6/25の八雲で300細胞/Lであった。*D. tripos* は6～11月に出現し、最高出現数は9/8の虻田で200細胞/Lであった。




図3 日本海南部(江差)、石狩湾(浜益)、日本海北部(増毛)海域における水温・塩分と *A. tamarensis* および *Dinophysis* 属の鉛直分布の季節変化




図4 宗谷北部(猿払)、同南部(頓別)、網走北部(紋別)海域における水温・塩分と *A. tamarensis* および *Dinophysis* 属の鉛直分布の季節変化




図5 網走中部(常呂)、サロマ湖、能取湖海域における水温・塩分と *A. tamarensis* および *Dinophysis* 属の鉛直分布の季節変化




図6 網走南部(網走)、根室海峡(標津)、太平洋東部(厚岸)海域における水温・塩分と *A. tamarensis* および *Dinophysis* 属の鉛直分布の季節変化




図7 太平洋中部(静内)、噴火湾東部(虻田)、同西部(八雲)海域における水温・塩分と *A. tamarensis* および *Dinophysis* 属の鉛直分布の季節変化




図8 噴火湾西部(森)、同湾口(鹿部)、津軽海峡(知内)海域における水温・塩分と *A. tamarensis* および *Dinophysis* 属の鉛直分布の季節変化

（５）貝毒プランクトン種別の出現と毒化の関係（図 2～8）

a) *Alexandrium tamarense*

2012 年における本種の出現動向は、夏季の網走南部・中部海域における麻痺性貝毒毒力の推移と良く一致していた。本年は本種の出現が網走南部・中部海域としては高水準であったため、麻痺性毒性値が出荷自主規制値（4MU/g-可食部）を超えて上昇したものと推察される。また、噴火湾 3 海域の最高出現数は 160 細胞/L で、2011 年の 1400 細胞/L の 10 分の 1 程度であった。これを反映して、2012 年の噴火湾 3 海域では麻痺性毒性値が出荷自主規制値（4MU/g-可食部）を超えなかった（2008 年以来 4 年ぶりの現象）。噴火湾、道東・道南太平洋、オホーツク海各海域の底泥から発芽した本種の培養株から、C2（約 60%）、GTX-3 および 4（約 30%）、neoSTX（約 10%）を主成分とした毒成分がいずれも検出されている（嶋田ら，2011）。本種は北海道における麻痺性貝毒の主な原因種であり、重要な監視対象種である。

b) *Dinophysis fortii*

2012 年における本種の出現動向と、下痢性貝毒の発生との間には明瞭な関係は認められなかった。しかしながら 2005～2006 年の噴火湾産の本種の細胞から毒成分（主成分 PTX-2 および DTX-1）が検出されている（宮園ら，2008）。本種は 1980 年代に下痢性貝毒の主な原因種であったと考えられており（西浜，1994）、監視が必要である。

c) *Dinophysis acuminata*

2012 年における本種の出現動向は、夏季の噴火湾湾口部における出荷自主規制値（0.05MU/g-可食部）を超える毒化および春季の宗谷北部海域、網走北部海域および噴火湾西部・湾口部海域と、夏季の噴火湾東部海域における微量（0.025MU/g-可食部）の毒化と一致していた。2005 年における噴火湾産の本種の細胞から毒成分（主成分 PTX-2）が検出されている（宮園ら，2008）。本種は最近の調査結果から、下痢性貝毒の主要な原因種の一つであると考えられており、監視が必要である。

d) *Dinophysis norvegica*

2012 年における本種の出現動向は、夏季の噴火湾湾口部における出荷自主規制値（0.05MU/g-可食部）を超える毒化および春季の噴火湾西部・湾口部海域と、夏季の噴火湾東部海域における微量（0.025MU/g-可食部）の毒化と一致していた。2005～2006 年の噴火湾産の本種の細胞から毒成分（主成分 PTX-2）が検出されており（宮園ら，2008）、*D. fortii* および *D. acuminata* といった代表原因種とともに本種が副次的に毒化に関与する可能性がある。本種は単独で下痢性貝毒の原因種となる事例は少ないが、監視が必要である。

e) 他 *Dinophysis* 属

2012 年における主な出現種は、*D. rotundata*、*D. mitra*、*D. tripos* であった。このうち *D. tripos* の出現動向は夏季の噴火湾東部における微量（0.025MU/g-可食部）の毒化と一致していた。2006 年における噴火湾産の *D. tripos* の細胞から毒成分（主成分 PTX-2）が検出されており（宮園ら，2008）、2010 年夏から秋季の噴火湾 3 海域における下痢性貝毒の毒化は本種の関与が示唆されている（2010 年度の本報告書）。今のところ無毒とされる種も含め、*Dinophysis* 属各種の監視は、今後も継続すべきである。

C その他二枚貝の毒化状況

北海道沿岸で漁獲されたホタテガイを除く二枚貝 11 種（アサリ、アズマニシキ（アカザラガイ）、イガイ、ウバガイ（ホッキガイ）、エゾキンチャクガイ、オオミゾガイ、サラガイ、バカガイ（エゾバカガイ）、マガキ）の軟体部あたりの麻痺性貝毒および下痢性貝毒が検査された。検査日は漁期であり、貝毒の季節変化を計画的に調べたものではない。

麻痺性貝毒については、出荷自主規制値（4MU/g-可食部）を超える貝毒は検出されなかった。

下痢性貝毒については、出荷自主規制値（0.05MU/g-可食部）を超える貝毒は検出されなかった。

3. 要約

①2012 年 1 月から 12 月まで、北海道沿岸の 18 定点（江差、浜益、増毛、猿払、頓別、紋別、常呂、サロマ湖、能取湖、網走、標津、厚岸、静内、虻田、八雲、森、鹿部、知内）において、麻痺性貝毒プランクトン *Alexandrium tamarense* および下痢性貝毒プランクトン *Dinophysis* 属の出現状況を調査した。調査結果は逐次、関係機関に速報した。

②麻痺性貝毒による出荷自主規制値（4MU/g-可食部）を超える毒化は、7 月に網走南部・中部海域で認められた。出荷自主規制の期間は、網走南部海域ではから 7 月下旬から 8 月中旬で、網走中部海域では 7 月下旬から 9 月上旬であった。それ以外の海域では、麻痺性貝毒による出荷自主規制値を超える毒化は認められなかった。毒化原因種は *Alexandrium tamarense* であると推察された。

③下痢性貝毒による出荷自主規制値（0.05MU/g-可食部）を超える毒化は、7 月に根室海峡海域と噴火湾湾口海域で認められた。出荷自主規制の期間は、根室海峡海域では 7 月上旬から 8 月上旬、噴火湾湾口海域では 7 月上旬から 11 月下旬であった。それ以外の海域では下痢性貝毒による出荷自主規制値を超える毒化は認められなかった。毒化原因種については噴火湾湾口海域では *Dinophysis acuminata* と *D. norvegica* であると推察された。根室海峡海域では出荷規制開始直前の調査で *Dinophysis* 属の出現が認められなかったことから不明と判断した。

④噴火湾 3 海域では、麻痺性貝毒プランクトンである *Alexandrium tamarense* は 5 月をピークとして 3～7 月に出現した。最高出現数は 5/1 森の 160 細胞/L であった。

⑤噴火湾以外の海域では、麻痺性貝毒プランクトンである *Alexandrium tamarense* は 5～8 月に出現し、最高出現数は 7/21 紋別の 130 細胞/L であった。津軽海峡および日本海では *A. tamarense* は出現しなかった。

⑥噴火湾 3 海域における下痢性貝毒プランクトンの主な出現種は *D. fortii*, *D. acuminata*, *D. norvegica*, *D. tripos* であった。*D. fortii* は 7/30 の虻田で 160 細胞/L, *D. acuminata* は 6/25 の八雲で最高 420 細胞/L, *D. norvegica* は 6/25 の八雲で最高 300 細胞/L, *D. tripos* は 9/8 の虻田で最高 200 細胞/L それぞれ出現した。

⑦噴火湾以外の海域のうち津軽海峡～日本海～オホーツク海～根室海峡では、主な出現種は *D. fortii*,

*D. acuminata*であった。*D. fortii*は9/3のサロマ湖で90細胞/L、*D. acuminata*は5/15の能取湖で最高580細胞/Lそれぞれ出現した。一方、太平洋では、主な出現種は*D. fortii*、*D. acuminat*、*D. norvegica*であった。*D. fortii*は7/3の静内で190細胞/L、*D. acuminata*は8/6の厚岸で最高130細胞/L、*D. norvegica*は6/28の厚岸で最高370細胞/Lそれぞれ出現した。

付表1 日本海南部(江差)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位: 細胞/L (計数: 中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Dinophysis属											
						Alexandrium属	A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others
江差	4/20	5.5	0	9.1	31.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/20		10	8.9	33.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/20		20	8.8	34.06	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/20		30	8.4	34.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/25	6.0	0	11.5	31.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/25		10	9.5	33.23	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/25		20	8.9	33.78	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
江差	4/25		30	8.5	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/15	7	0	10.3	33.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/15		10	9.8	33.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/15		20	9.3	34.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/15		30	8.5	34.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/29	7	0	12.2	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/29		10	12.0	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/29		20	10.5	34.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	5/29		30	10.1	34.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/12	14	0	15.5	34.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/12		10	13.7	34.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/12		20	9.9	34.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/12		30	8.5	34.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/28	14	0	17.2	34.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/28		10	14.6	34.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/28		20	12.0	34.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	6/28		30	10.2	34.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	7/10	15.5	0	19.4	34.19	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
江差	7/10		10	18.0	34.22	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	
江差	7/10		20	13.3	34.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	7/10		30	10.5	34.21	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
江差	7/24	11	0	20.7	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
江差	7/24		10	20.5	33.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	7/24		20	20.5	33.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	7/24		30	20.5	33.74	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
江差	8/22	17	0	26.6	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	8/22		10	25.5	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	8/22		20	23.3	33.90	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
江差	8/22		30	16.6	34.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	9/24	24	0	26.1	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	9/24		10	25.7	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	9/24		20	25.6	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	9/24		30	25.2	33.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	10/17	10	0	20.3	33.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	10/17		10	20.1	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	10/17		20	19.6	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	10/17		30	13.9	34.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	11/15	15	0	16.6	33.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	11/15		10	16.7	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	11/15		20	16.5	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
江差	11/15		30	15.7	34.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表2 石狩湾(石狩河口・浜益)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件
 単位: 細胞/L (計数: 中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
浜益	4/18	3.2	0	5.6	29.52	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	4/18		10	6.1	31.91	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	4/18		20	6.3	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	4/18		30	5.7	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	5/24	5.0	0	12.0	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	5/24		10	10.4	33.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	5/24		20	9.9	33.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	5/24		30	8.1	33.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	6/25	7.5	0	17.3	32.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	6/25		10	13.5	33.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	6/25		20	12.8	33.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	6/25		30	11.5	33.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	7/24	4.0	0	21.1	32.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	7/24		10	20.5	33.32	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
浜益	7/24		20	17.7	34.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	7/24		30	15.5	34.11	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	8/21	3.8	0	23.3	29.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	8/21		10	22.0	33.15	0	0	0	0	0	20	0	0	10	0	0	
浜益	8/21		20	21.3	33.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	8/21		30	19.8	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	10/2	6.5	0	22.7	32.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	10/2		10	22.8	33.45	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
浜益	10/2		20	23.0	33.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	10/2		30	23.0	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	10/31	6.0	0	15.3	32.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	10/31		10	15.8	33.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浜益	10/31		20	15.9	33.89	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
浜益	10/31		30	14.9	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表3 日本海北部(小平)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位: 細胞/L (計数: 中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
増毛	1/17	10.0	0	5.2	33.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	1/17		10	5.2	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	1/17		20	5.3	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	1/17		30	5.3	33.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/1	10.0	0	3.9	33.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/1		10	4.5	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/1		20	4.5	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/1		30	4.5	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/23	10.0	0	4.6	33.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/23		10	4.6	33.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/23		20	4.7	34.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	2/23		30	4.6	33.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	3/14	10.0	0	4.5	33.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	3/14		10	4.5	33.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	3/14		20	4.4	33.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	3/14		30	4.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	4/25	9.0	0	8.5	31.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	4/25		10	7.9	32.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	4/25		20	7.9	33.04	0	0	0	30	0	10	0	0	0	0	0	
増毛	4/25		30	8.0	33.24	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/14	16.0	0	9.9	33.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/14		10	8.9	33.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/14		20	8.5	33.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/14		30	7.9	33.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/29	17.5	0	12.7	32.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/29		10	10.1	33.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/29		20	9.6	33.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	5/29		30	8.7	33.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/11	15.0	0	17.5	32.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/11		10	13.1	33.48	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/11		20	11.4	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/11		30	10.2	33.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/21	19.0	0	15.6	33.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/21		10	13.8	33.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/21		20	12.0	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	6/21		30	10.5	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/12	21.0	0	18.8	33.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/12		10	16.8	33.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/12		20	16.4	34.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/12		30	13.2	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/24	20.0	0	20.0	33.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/24		10	19.6	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/24		20	17.7	34.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	7/24		30	16.5	34.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	8/17	10.0	0	22.0	32.62	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
増毛	8/17		10	21.7	33.96	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
増毛	8/17		20	21.6	33.96	0	0	0	0	0	10	0	0	20	0	0	
増毛	8/17		30	18.8	34.01	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
増毛	9/12	22.0	0	23.7	33.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	9/12		10	23.6	33.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	9/12		20	23.4	33.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	9/12		30	22.1	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	11/14	13.0	0	13.7	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	11/14		10	13.7	33.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	11/14		20	13.8	33.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増毛	11/14		30	13.9	33.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表4 宗谷北部(猿払)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位:細胞/L (計数:中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉梨絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Dinophysis属											
						Alexandrium属	A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others
猿払	4/17	-	0	4.2	33.55	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	4/17		10	4.2	33.57	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	4/17		15	4.2	33.57	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	4/17		20	4.2	33.57	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/8	-	0	8.1	33.28	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	
猿払	5/8		10	8.1	33.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/8		15	8.1	33.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/8		20	8.0	33.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/22	-	0	7.6	33.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/22		10	7.5	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/22		15	7.5	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	5/22		20	7.5	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/5	-	0	10.5	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/5		10	10.4	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/5		15	10.4	33.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/5		20	10.4	33.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/18	-	0	11.1	33.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/18		10	10.8	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/18		15	10.7	33.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	6/18		20	10.4	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	7/3	-	0	13.5	33.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	7/3		10	13.1	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	7/3		15	10.6	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	7/3		20	10.6	33.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	7/17	-	0	13.4	33.83	0	0	30	0	0	0	10	0	0	0	0	
猿払	7/17		10	13.2	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	7/17		15	12.8	33.81	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	
猿払	7/17		20	12.5	33.85	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	8/7	-	0	18.0	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	8/7		10	18.0	33.86	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	
猿払	8/7		15	18.0	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	8/7		20	18.0	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	9/11	-	0	22.0	33.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	9/11		10	21.8	33.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	9/11		15	21.8	33.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	9/11		20	21.5	33.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	10/17	-	0	18.5	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	10/17		10	18.6	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	10/17		15	18.6	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	10/17		20	18.6	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	11/6	-	0	13.1	33.92	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	11/6		10	12.9	33.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	11/6		15	12.5	33.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
猿払	11/6		20	12.1	34.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表5 宗谷南部(頓別)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位: 細胞/L (計数: 網走水試調査研究部 平野和夫・清河進, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
頓別	4/11	－	0	1.9	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	4/11		10	1.9	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	4/11		20	2.0	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	4/11		30	2.0	33.85	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	5/14	－	0	6.3	33.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	5/14		10	5.9	33.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	5/14		20	5.8	33.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	5/14		30	5.8	33.94	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	6/13	－	0	9.9	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	6/13		10	9.9	33.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	6/13		20	9.1	33.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	6/13		30	9.0	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	7/11	－	0	16.7	33.65	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
頓別	7/11		10	15.2	33.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	7/11		20	14.3	33.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	7/11		30	12.8	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	8/17	－	0	18.2	33.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	8/17		10	18.0	33.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	8/17		20	17.4	33.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頓別	8/17		30	16.9	33.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表6 網走北部(紋別)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位: 細胞/L (計数: 網走水試調査研究部 平野和夫・清河進, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Dinophysis属											
						Alexandrium属		Dinophysis属									
単位: 細胞/L (計数) 網走小試験調査所 紋別 干封和天・洞河延、RRI日本海洋生物研究所 小樽未来経						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
紋別	4/16	5	0	2.9	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	4/16		15	-1.1	32.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	4/16		25	-0.7	32.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	4/16		36.8	-0.7	32.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	5/14	7	0	7.4	33.32	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	5/14		15	7.4	33.46	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	5/14		25	7.4	33.46	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	5/14		35.6	7.4	33.44	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	6/15	9	0	12.1	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	6/15		15	9.1	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	6/15		25	8.6	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	6/15		35.8	8.5	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	7/21	7	0	14.3	33.44	130	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
紋別	7/21		15	12.0	33.74	110	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
紋別	7/21		25	11.9	33.74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	7/21		35.8	10.3	33.73	40	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
紋別	8/17	10	0	18.4	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	8/17		15	17.5	33.49	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
紋別	8/17		25	16.6	33.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紋別	8/17		37.4	14.8	33.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表7 網走中部(常呂)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位: 細胞/L (計数: 中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属			Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others		
常呂	4/9	18.0	0	-0.2	32.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/9		10	-0.4	32.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/9		20	-0.2	32.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/9		30	-0.1	32.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/23	15.0	0	5.6	29.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/23		10	6.1	31.91	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/23		20	6.3	33.61	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	4/23		30	5.7	33.83	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/7	9.0	0	8.5	32.82	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/7		10	8.0	32.85	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/7		20	6.9	33.43	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/7		30	6.6	33.61	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/21	8.0	0	7.4	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/21		10	5.2	32.83	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/21		20	5.1	33.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	5/21		30	5.1	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/4	9.5	0	12.0	33.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/4		10	9.0	33.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/4		20	8.9	33.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/4		30	8.8	33.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/18	9.5	0	11.9	33.46	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/18		10	10.2	33.76	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	6/18		20	9.4	33.82	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0		
常呂	6/18		30	9.4	33.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/2	13.0	0	13.6	33.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/2		10	11.5	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/2		20	11.0	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/2		30	10.6	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/17	12.0	0	16.2	33.29	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/17		10	14.0	33.52	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
常呂	7/17		20	11.2	33.67	60	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	7/17		30	9.3	33.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	8/20	15.0	0	18.7	33.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	8/20		10	16.9	33.54	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
常呂	8/20		20	16.5	33.62	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
常呂	8/20		30	16.5	33.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	9/3	11.0	0	21.1	33.57	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
常呂	9/3		10	19.4	33.64	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0		
常呂	9/3		20	18.3	33.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	9/3		30	17.6	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	10/15	14.0	0	17.4	33.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	10/15		10	17.4	33.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	10/15		20	17.3	33.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	10/15		30	17.3	33.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	11/12	5.0	0	9.3	32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	11/12		10	9.1	32.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	11/12		20	10.9	32.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常呂	11/12		30	11.1	33.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

付表8 サロマ湖における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位：細胞/L (計数：中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
サロマ湖	4/23	2.0	0	3.8	28.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	4/23		3	3.6	29.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	4/23		6	1.3	31.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	4/23		9	0.0	32.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	4/23		12	-0.2	32.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	4/23		15	-1.3	32.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/7	6.0	0	9.5	31.50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/7		3	9.2	31.50	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/7		6	8.3	31.61	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/7		9	4.9	30.80	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/7		12	1.5	32.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/7		15	0.9	32.54	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/21	4.5	0	9.2	29.41	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/21		3	8.8	30.16	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/21		6	8.2	31.67	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/21		9	7.7	31.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/21		12	6.4	32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	5/21		15	6.2	32.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/4	5.5	0	13.1	31.41	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/4		3	11.6	31.41	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/4		6	8.1	32.22	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/4		9	8.7	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/4		12	9.0	32.94	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/4		15	8.7	33.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/18	6.0	0	13.4	32.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/18		3	13.2	32.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/18		6	12.1	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/18		9	11.2	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/18		12	10.0	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	6/18		15	8.7	33.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/2	7.5	0	15.8	33.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/2		3	15.8	33.04	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/2		6	13.8	32.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/2		9	12.7	33.14	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/2		12	11.7	33.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/2		15	11.2	33.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/17	5.0	0	18.0	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/17		3	17.8	32.57	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
サロマ湖	7/17		6	17.8	32.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/17		9	15.9	33.31	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/17		12	14.4	33.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	7/17		15	13.8	33.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	8/20	5.0	0	21.1	32.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	8/20		3	20.5	32.22	0	0	30	10	0	10	0	0	0	0	0	
サロマ湖	8/20		6	19.0	32.80	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	8/20		9	18.3	33.23	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	8/20		12	16.9	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	8/20		15	15.8	33.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	9/3	6.5	0	22.1	33.09	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
サロマ湖	9/3		3	22.0	33.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	9/3		6	21.1	33.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	9/3		9	20.1	33.17	0	0	20	0	0	0	0	0	10	0	0	
サロマ湖	9/3		12	18.9	33.15	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	
サロマ湖	9/3		15	16.5	33.21	0	0	90	0	0	30	0	0	0	0	0	
サロマ湖	10/15	3.8	0	16.4	32.14	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	10/15		3	16.8	32.80	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	10/15		6	16.8	32.82	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	10/15		9	16.8	32.84	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	10/15		12	16.8	32.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	10/15		15	16.6	32.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	11/5	3.0	0	11.3	32.70	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	11/5		3	11.3	32.71	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	11/5		6	11.3	32.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	11/5		9	11.3	32.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	11/5		12	11.4	32.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	11/5		15	11.4	32.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	12/3	5.5	0	4.1	30.91	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	12/3		3	4.1	30.93	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	12/3		6	4.1	30.93	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
サロマ湖	12/3		9	4.0	30.98	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	

付表9 能取湖における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位：細胞/L (計数：網走水試調査研究部 平野和夫・清河進, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
能取湖	4/19	2.7	0	3.2	28.20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
能取湖	4/19		10	-0.2	32.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	4/27	3.6	0	3.9	32.06	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	4/27		10	3.5	31.88	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	
能取湖	5/15	4.6	0	8.8	30.99	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	5/15		10	7.0	32.11	0	0	0	580	10	0	0	0	0	0	0	
能取湖	5/29	5.9	0	10.2	31.87	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	5/29		10	8.2	32.45	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	6/7	7.7	0	13.3	32.22	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	6/7		10	10.2	33.15	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	6/25	5.6	0	12.9	32.93	0	0	10	50	10	10	0	0	0	0	0	
能取湖	6/25		10	11.5	33.29	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	7/5	8.1	0	17.4	33.24	10	0	20	60	0	0	0	10	0	0	0	
能取湖	7/5		10	13.7	33.66	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	7/24	6.2	0	15.6	32.75	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	7/24		10	14.6	33.41	0	0	50	80	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	8/29	3.6	0	22.5	32.70	0	0	0	20	0	0	0	0	10	0	0	
能取湖	8/29		10	18.6	33.30	0	0	70	170	0	80	0	0	0	0	0	
能取湖	9/21	7.4	0	22.0	33.03	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	
能取湖	9/21		10	21.3	33.35	0	0	20	0	0	20	0	0	40	0	0	
能取湖	10/30	5.7	0	12.7	33.38	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	
能取湖	10/30		10	12.7	33.38	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	
能取湖	11/28	4	0	5.2	31.49	0	0	10	150	0	0	0	0	0	0	0	
能取湖	11/28		10	5.7	31.71	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	

付表10 網走南部（網走）における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況と海洋条件

単位：細胞/L (計数：網走水試調査研究部 平野和夫・清河進, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
網走	4/9	11	0	-0.1	32.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	4/9		10	-0.7	32.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	4/9		20	-0.4	32.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	4/9		30	-0.3	32.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	5/21	7	0	8.0	32.38	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	
網走	5/21		10	6.6	33.12	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
網走	5/21		20	5.7	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	5/21		30	5.6	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	6/25	8	0	10.9	33.58	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	
網走	6/25		10	10.7	33.65	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
網走	6/25		20	10.5	33.65	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
網走	6/25		30	9.8	33.66	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
網走	7/24	13	0	14.6	33.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	7/24		10	12.3	33.45	10	0	10	30	10	0	0	20	0	0	0	
網走	7/24		20	11.8	33.59	30	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	
網走	7/24		30	11.3	33.57	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	
網走	8/20	7	0	18.5	33.09	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	
網走	8/20		10	15.8	33.44	0	0	30	10	0	30	0	10	0	0	0	
網走	8/20		20	14.1	33.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
網走	8/20		30	12.7	33.54	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	

付表11 根室海峡(標津)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件
 単位: 細胞/L (計数: 中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
標津	1/17	6.0	0	1.6	32.07	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
標津	1/17		5	1.6	32.06	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
標津	1/17		10	1.6	32.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	1/17		15	1.6	32.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	2/10	-	0	-1.3	31.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	2/10		5	-1.3	31.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	2/10		10	-1.3	31.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	2/10		15	-1.3	31.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	3/27	1.7	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	3/27		5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	3/27		10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	3/27		15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/16	3.5	0	1.2	30.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/16		5	-0.7	32.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/16		10	-0.7	32.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/16		15	-0.7	32.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/24	4.0	0	3.2	31.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/24		5	1.7	31.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/24		10	-0.5	32.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	4/24		15	-0.8	32.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/14	7.0	0	4.8	31.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/14		5	3.9	31.81	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
標津	5/14		10	3.6	31.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/14		15	3.6	31.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/29	4.5	0	4.8	31.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/29		5	3.9	31.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/29		10	3.6	31.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	5/29		15	3.6	31.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	6/14	6.0	0	8.9	31.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	6/14		5	8.2	32.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	6/14		10	7.3	32.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	6/14		15	6.3	32.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	7/12	6.0	0	11.2	32.05	90	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
標津	7/12		5	10.5	32.20	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	
標津	7/12		10	8.2	32.95	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	
標津	7/12		15	8.0	32.98	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
標津	7/26	6.0	0	15.7	32.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	7/26		5	14.5	32.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	7/26		10	13.4	33.17	0	0	30	20	0	0	0	40	0	0	0	
標津	7/26		15	12.5	33.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	8/17	7.5	0	16.7	32.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	8/17		5	15.6	32.81	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
標津	8/17		10	14.3	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	8/17		15	14.0	33.20	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
標津	9/18	5.0	0	18.9	32.66	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	
標津	9/18		5	18.7	32.69	0	0	30	0	0	10	0	0	0	0	0	
標津	9/18		10	18.7	32.71	0	0	10	30	0	0	0	0	0	0	0	
標津	9/18		15	18.5	33.18	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	
標津	10/25	7.0	0	14.5	33.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	10/25		5	14.5	33.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	10/25		10	14.5	33.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	10/25		15	14.5	33.48	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	11/13	2.0	0	10.9	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	11/13		5	11.1	32.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	11/13		10	11.1	32.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	11/13		15	11.1	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	12/15	6.0	0	5.7	32.45	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
標津	12/15		5	5.7	32.46	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
標津	12/15		10	5.7	32.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
標津	12/15		15	5.7	32.47	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	

付表12 太平洋東部(厚岸)における*Alexandrium*属および*Dinophysis*属プランクトンの出現状況と海洋条件
 単位: 細胞/L (計数: 中央水試資源管理部 品田晃良・嶋田宏, KK日本海洋生物研究所 小海茉莉絵)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	<i>Alexandrium</i> 属		<i>Dinophysis</i> 属									
						<i>A. tam.</i>	others	<i>D. for.</i>	<i>D. acu.</i>	<i>D. nor.</i>	<i>D. rot.</i>	<i>D. rud.</i>	<i>D. inf.</i>	<i>D. mit.</i>	<i>D. tri.</i>	others	
厚岸	1/16	6.0	0	-0.8	32.10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	1/16		5	-0.7	32.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	1/16		10	0.6	32.34	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	1/16		13	0.7	32.34	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	2/13	4.0	0	-1.6	31.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	2/13		5	-1.5	32.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	2/13		10	-1.4	32.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	2/13		13	-1.4	32.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	3/8	1.7	0	-1.1	31.98	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	3/8		5	-1.2	32.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	3/8		10	-1.3	32.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	3/8		13	-1.3	32.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/3	2.0	0	1.1	31.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/3		5	0.8	32.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/3		10	0.5	32.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/3		13	0.2	32.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/23	2.1	0	4.7	29.97	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/23		5	3.7	30.62	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/23		10	1.9	32.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	4/23		13	1.7	32.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/7	1.0	0	8.0	28.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/7		5	4.6	31.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/7		10	3.8	31.90	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/7		13	3.4	32.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/24	5.0	0	7.8	31.30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/24		5	7.0	31.25	10	0	0	10	30	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/24		10	4.5	32.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	5/24		13	3.9	32.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/13	4.0	0	10.6	31.45	60	0	0	30	290	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/13		5	9.6	31.59	60	0	0	30	240	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/13		10	6.9	32.16	20	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/13		13	6.2	32.19	20	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/28	4.6	0	13.5	30.60	30	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/28		5	8.8	32.10	10	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/28		10	6.9	32.31	0	0	0	10	210	0	0	0	0	0	0	
厚岸	6/28		13	6.0	32.44	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/10	5.8	0	14.7	31.33	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/10		5	11.5	31.88	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/10		10	8.1	32.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/10		13	7.3	32.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/25	3.5	0	14.4	31.17	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/25		5	11.5	31.99	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/25		10	9.4	32.29	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
厚岸	7/25		13	8.0	32.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/6	4.0	0	15.7	31.17	10	0	10	60	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/6		5	12.9	32.13	0	0	0	130	110	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/6		10	10.4	32.28	0	0	0	50	30	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/6		13	9.2	32.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/22	4.0	0	18.7	31.28	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/22		5	14.2	32.36	10	0	0	50	40	0	20	0	0	0	0	
厚岸	8/22		10	11.4	32.61	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	8/22		13	10.9	32.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	9/3	4.5	0	20.1	31.86	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	9/3		5	16.9	32.38	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	
厚岸	9/3		10	14.2	32.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	9/3		13	13.0	32.71	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	
厚岸	10/4	4.0	0	17.3	32.25	0	0	140	110	10	0	0	0	10	0	0	
厚岸	10/4		5	17.3	32.35	0	0	100	10	0	30	0	0	10	0	0	
厚岸	10/4		10	17.1	32.79	0	0	40	70	0	10	0	0	30	0	0	
厚岸	10/4		13	16.6	33.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	11/9	1.5	0	10.6	27.55	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	11/9		5	10.9	32.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	11/9		10	10.9	33.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	11/9		13	10.9	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	12/11	2.5	0	4.6	31.77	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
厚岸	12/11		5	5.2	32.62	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	12/11		10	5.7	32.75	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
厚岸	12/11		14	5.9	32.76	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	

付表13 太平洋西部・中部(苫小牧・静内)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況

と海洋条件			単位：細胞/L (計数：函館水試調査研究部 馬場勝寿・金森誠・佐藤政俊)														
調査点	調査	透明	深度	水温	塩分	Alexandrium属			Dinophysis属								
2012	月日	度m	m	℃	psu	A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
静内	1/10	13	0	4.3	32.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	1/10		10	4.3	32.96	0	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	
静内	1/10		20	4.4	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	1/10		30	4.4	32.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	2/6	6.5	0	1.0	32.41	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
静内	2/6		10	1.2	32.53	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
静内	2/6		20	1.2	32.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	2/6		30	1.2	32.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	3/5	11	0	0.9	32.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	3/5		10	1.0	32.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	3/5		20	1.0	32.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	3/5		30	1.0	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/19	3	0	3.8	29.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/19		10	1.8	32.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/19		20	1.7	32.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/19		30	1.6	32.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/25	2.5	0	7.1	28.32	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/25		10	2.0	32.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	4/25		20	1.7	32.52	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
静内	4/25		30	1.7	32.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	5/8	3	0	7.8	30.76	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
静内	5/8		10	4.2	32.51	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
静内	5/8		20	3.4	32.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	5/8		30	3.5	32.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	5/21	4.6	0	7.4	30.62	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
静内	5/21		10	4.8	31.51	0	20	0	0	150	20	0	0	0	0	0	
静内	5/21		20	3.5	32.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	5/21		30	2.8	32.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	6/7	9.5	0	10.1	32.27	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	6/7		10	10.2	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	6/7		20	9.5	32.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	6/7		30	4.7	32.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	6/19	7.5	0	10.8	31.69	10	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	
静内	6/19		10	8.3	32.13	0	0	0	30	190	10	0	0	0	0	0	
静内	6/19		20	4.7	32.85	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	
静内	6/19		30	4.1	32.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	7/3	12	0	17.0	32.79	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
静内	7/3		10	15.4	33.50	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	0	
静内	7/3		20	13.4	33.52	0	0	40	0	0	0	0	10	0	20	0	
静内	7/3		30	12.2	33.66	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	7/17	7	0	17.6	33.01	0	0	10	0	0	0	0	0	0	20	0	
静内	7/17		10	15.9	33.44	0	0	80	0	0	0	0	0	0	40	0	
静内	7/17		20	13.3	33.63	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	
静内	7/17		30	12.5	33.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	8/6	12	0	20.7	32.84	0	0	0	0	0	10	0	0	20	0	0	
静内	8/6		10	19.7	33.24	0	0	0	10	0	20	10	0	20	30	0	
静内	8/6		20	15.7	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
静内	8/6		30	12.8	33.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	9/10	20	0	23.1	33.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	9/10		10	23.3	33.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	9/10		20	22.6	33.66	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
静内	9/10		30	17.4	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	10/10	10	0	19.8	33.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	10/10		10	19.2	33.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	10/10		20	19.1	33.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	10/10		30	18.4	33.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	11/13	17	0	16.0	33.65	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
静内	11/13		10	16.0	33.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	11/13		20	16.1	33.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	11/13		30	16.0	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	12/13	19.5	0	11.0	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	12/13		10	11.0	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	12/13		20	10.7	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静内	12/13		30	10.7	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表14 噴火湾東部(蛇田)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況
と海洋条件 単位：細胞/L (計数：函館水試調査研究部 馬場勝寿・金森誠・佐藤政俊)

C.海汁条件			単位: 細胞/L		(訂数: 函館水試調査研究部 島根勝洋・宮林誠・佐藤政俊)										
調査点	透明	深度	水温	塩分	Alexandrium属					Dinophysis属					
2012	月日	度m	℃	psu	A.tam	others	D.for.	D.acu.	D.nor.	D.rot.	D.rud.	D.inf.	D.mit.	D.tri.	others
蛇田	1/10	12	0	6.0	33.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	1/10		5	6.0	33.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	1/10		10	6.0	33.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	1/10		15	6.0	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	1/10		20	6.0	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	1/10		25	6.0	33.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	2/6	6	0	1.8	31.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	2/6		5	2.4	32.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	2/6		10	2.5	32.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	2/6		15	2.5	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	2/6		20	3.0	33.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	2/6		25	3.4	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	3/5	8	0	2.5	32.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	3/5		5	2.5	33.13	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
蛇田	3/5		10	2.6	33.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	3/5		15	2.5	33.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	3/5		20	2.6	33.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	3/5		25	2.7	33.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/9	6	0	2.9	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/9		5	2.9	32.86	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/9		10	3.0	32.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/9		15	3.0	32.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/9		20	2.9	32.92	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
蛇田	4/9		25	2.5	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/23	6.3	0	5.7	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/23		5	5.1	32.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/23		10	5.1	32.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/23		15	5.1	32.29	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
蛇田	4/23		20	5.0	32.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	4/23		25	4.6	32.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	5/7	4	0	8.4	28.15	80	0	0	270	70	0	0	0	0	0
蛇田	5/7		5	7.6	30.85	10	0	0	250	80	0	0	0	0	0
蛇田	5/7		10	7.2	31.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	5/7		15	6.8	31.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	5/7		20	5.2	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	5/7		25	4.2	32.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	5/21	8	0	10.8	29.89	30	0	0	10	0	0	0	0	0	0
蛇田	5/21		5	8.1	31.45	0	0	0	50	10	0	0	0	0	0
蛇田	5/21		10	6.2	31.88	0	0	0	50	210	0	0	0	0	0
蛇田	5/21		15	5.5	32.16	0	40	0	40	120	0	0	0	0	0
蛇田	5/21		20	5.1	32.28	0	10	0	30	210	0	0	0	0	0
蛇田	5/21		25	4.6	32.35	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
蛇田	6/4	11	0	11.8	31.26	20	0	0	30	0	0	0	0	0	0
蛇田	6/4		5	11.6	31.37	0	0	0	250	10	0	0	0	0	0
蛇田	6/4		10	11.0	31.43	0	0	0	310	90	0	0	0	0	0
蛇田	6/4		15	8.5	31.69	0	10	0	150	200	0	0	0	0	0
蛇田	6/4		20	7.5	31.97	0	0	0	70	90	0	0	0	0	0
蛇田	6/4		25	5.0	32.39	10	0	0	30	70	0	0	0	0	0
蛇田	6/18	9.5	0	14.7	30.98	0	0	0	110	10	0	0	0	0	0
蛇田	6/18		5	13.6	31.31	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0
蛇田	6/18		10	12.7	31.38	0	0	0	120	250	0	0	0	0	0
蛇田	6/18		15	11.2	31.58	0	0	0	80	130	0	0	0	0	0
蛇田	6/18		20	10.1	31.67	0	20	0	150	230	0	0	0	0	0
蛇田	6/18		25	8.7	31.89	0	0	0	220	110	0	0	0	0	0
蛇田	7/10	-	0	-	-	0	0	0	130	0	0	0	10	0	0
蛇田	7/10		5	-	-	0	0	10	100	0	0	0	60	0	0
蛇田	7/10		10	-	-	10	0	0	40	60	0	0	20	0	0
蛇田	7/10		15	-	-	30	0	0	40	30	0	0	10	0	0
蛇田	7/10		20	-	-	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0
蛇田	7/10		25	-	-	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
蛇田	7/30	11.5	0	21.2	31.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	7/30		5	16.8	31.85	0	0	0	20	0	0	0	0	0	90
蛇田	7/30		10	15.5	32.51	0	0	0	90	0	0	0	0	0	120
蛇田	7/30		15	15.5	33.11	0	0	40	70	0	0	0	40	0	140
蛇田	7/30		20	13.9	33.27	0	0	160	180	0	0	0	50	0	10
蛇田	7/30		25	12.9	33.31	0	0	90	220	0	0	0	10	0	0
蛇田	8/9	9	0	21.3	31.62	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20
蛇田	8/9		5	21.2	31.69	0	0	0	10	0	0	0	0	0	40
蛇田	8/9		10	19.2	31.87	0	0	0	30	0	0	0	0	0	20
蛇田	8/9		15	18.1	31.95	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0
蛇田	8/9		20	18.6	32.73	0	0	40	80	0	0	0	10	0	40
蛇田	8/9		25	15.6	32.69	0	0	20	60	0	10	0	30	0	60
蛇田	9/8	16.5	0	24.0	31.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	9/8		5	23.9	32.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	9/8		10	22.2	32.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	9/8		15	19.3	32.80	0	0	0	0	0	0	0	0	20	200
蛇田	9/8		20	15.6	32.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	9/8		25	15.5	33.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	10/9	12.5	0	20.7	32.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	10/9		5	20.7	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
蛇田	10/9		10	21.1	33.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
蛇田	10/9		15	20.4	33.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	10/9		20	20.1	33.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	10/9		25	18.2	33.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
蛇田	11/5	12.5	0	14.3	33.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	11/5		5	14.2	33.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	11/5		10	14.1	33.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	11/5		15	14.0	33.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	11/5		20	14.1	33.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	11/5		25	14.1	33.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	12/12	15	0	8.8	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	12/12		5	8.7	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	12/12		10	8.8	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	12/12		15	8.4	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	12/12		20	7.9	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇田	12/12		25	7.7	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表15 噴火湾西部(八雲)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況
と海洋条件 単位:細胞/L (計数:函館水試調査研究部 馬場勝寿・金森誠・佐藤政俊)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属			Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others		
八雲	1/19	11	0	4.3	33.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	1/19		5	4.3	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	1/19		10	4.5	33.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	1/19		15	4.5	33.64	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	1/19		20	4.6	33.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	1/19		25	5.0	33.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	1/19		30	5.0	33.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14	9	0	2.4	33.18	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14		5	2.2	33.24	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14		10	2.3	33.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14		15	2.4	33.26	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14		20	2.4	33.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14		25	2.6	33.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	2/14		30	2.6	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16	4.5	0	3.0	32.96	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16		5	2.6	33.00	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16		10	2.6	33.03	20	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16		15	2.7	33.07	10	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16		20	2.6	33.10	10	20	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16		25	2.5	33.15	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	3/16		30	2.3	33.18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12	6.9	0	3.8	31.60	20	10	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12		5	3.4	32.77	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12		10	2.9	32.91	10	30	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12		15	2.7	32.95	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12		20	2.6	33.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12		25	2.6	33.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	4/12		30	2.7	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14	7.6	0	10.3	30.29	60	0	0	160	20	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14		5	8.0	31.11	0	0	0	230	20	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14		10	6.9	31.29	40	0	0	30	20	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14		15	5.3	32.02	0	30	0	10	130	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14		20	4.6	32.51	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14		25	3.7	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	5/14		30	3.6	32.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	6/25	12.8	0	15.1	31.42	0	0	0	420	50	10	0	10	0	0	0	0	
八雲	6/25		5	14.3	31.41	0	0	0	250	80	0	0	40	0	10	0	0	
八雲	6/25		10	12.5	31.52	10	0	0	90	150	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	6/25		15	12.3	31.64	0	10	0	240	300	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	6/25		20	11.3	31.88	0	30	0	230	220	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	6/25		25	10.1	31.97	0	10	0	140	70	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	6/25		30	7.2	32.10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	7/17	13	0	19.7	31.70	0	0	0	90	0	0	0	10	0	0	0	0	
八雲	7/17		5	18.1	31.87	0	0	0	290	0	0	0	10	0	30	0	0	
八雲	7/17		10	15.9	31.93	0	0	0	110	0	0	0	10	0	60	0	0	
八雲	7/17		15	12.5	31.93	0	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	7/17		20	11.3	32.10	40	0	0	60	40	0	0	20	0	20	0	0	
八雲	7/17		25	9.0	32.22	0	0	0	10	70	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	7/17		30	6.6	32.41	0	10	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	
八雲	8/14	13.1	0	22.9	31.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	8/14		5	22.2	31.88	0	0	0	0	0	0	10	0	10	40	0	0	
八雲	8/14		10	19.7	32.47	0	0	0	30	0	0	10	0	20	20	0	0	
八雲	8/14		15	15.6	32.31	0	0	0	20	0	0	0	0	0	30	0	0	
八雲	8/14		20	12.4	32.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	
八雲	8/14		25	9.9	32.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	8/14		30	7.4	32.44	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	9/20	5.2	0	25.0	30.54	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	
八雲	9/20		5	24.8	31.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
八雲	9/20		10	24.2	31.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	0	
八雲	9/20		15	23.8	32.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	9/20		20	23.3	32.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	9/20		25	21.4	32.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	
八雲	9/20		30	17.1	32.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	10/22	12.3	0	17.4	32.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	10/22		5	17.4	32.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	
八雲	10/22		10	17.3	32.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	10/22		15	15.2	33.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	10/22		20	14.9	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	10/22		25	14.5	33.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	10/22		30	13.7	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	11/13	4.7	0	12.7	31.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	
八雲	11/13		5	13.6	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	
八雲	11/13		10	13.6	33.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
八雲	11/13		15	13.6	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	
八雲	11/13		20	13.6	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	11/13		25	13.6	33.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	
八雲	11/13		30	13.6	33.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21	19	0	7.5	33.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21		5	7.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21		10	7.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21		15	7.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21		20	7.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21		25	7.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲	12/21		30	7.5	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表16 噴火湾西部(森)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況

調査点		と海洋条件		単位:細胞/L		(計数: 函館水試調査研究部 馬場勝寿・金森誠・佐藤政俊)												
2012	調査月日	透明度m	深度m	水温℃	塩分psu	Alexandrium属			Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others		
森	3/15	5.5	0	2.6	32.80	0	10	0	30	0	0	0	0	0	0	0		
森	3/15		10	2.5	33.23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	3/15		20	2.5	33.25	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	3/15		30	2.5	33.26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	4/5	7	0	2.5	32.90	0	10	0	30	0	10	0	0	0	0	0		
森	4/5		10	2.5	32.90	0	10	0	40	10	0	0	0	0	0	0		
森	4/5		20	2.4	32.90	10	0	0	30	10	0	0	0	0	0	0		
森	4/5		30	2.4	32.95	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0		
森	4/25	9	0	7.6	27.81	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	4/25		10	4.0	32.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	4/25		20	3.7	32.67	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	4/25		30	3.4	32.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	5/1	8.5	0	8.7	30.64	160	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0		
森	5/1		10	5.9	32.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	5/1		20	4.4	32.59	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	5/1		30	4.0	32.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	5/24	11	0	10.5	31.26	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0		
森	5/24		10	6.8	31.95	0	0	0	10	90	10	0	0	0	0	0		
森	5/24		20	5.3	32.29	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0		
森	5/24		30	4.9	32.54	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0		
森	6/6	9	0	11.1	31.50	20	0	0	50	20	0	0	0	0	0	0		
森	6/6		10	8.8	31.74	10	0	0	60	90	0	0	0	0	0	0		
森	6/6		20	6.6	32.02	0	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0		
森	6/6		30	4.8	32.43	0	0	0	30	20	0	0	0	0	0	0		
森	6/26	12	0	16.0	31.18	0	0	0	140	10	0	0	0	0	0	0		
森	6/26		10	12.5	31.49	0	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0		
森	6/26		20	11.7	31.80	0	0	0	70	60	0	0	0	0	0	0		
森	6/26		30	10.4	32.14	0	0	0	90	30	0	0	0	0	0	0		
森	7/4	11	0	16.4	31.26	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0		
森	7/4		10	12.9	31.58	0	0	10	150	150	0	0	10	0	0	0		
森	7/4		20	11.8	32.11	0	0	10	60	60	0	0	10	0	0	0		
森	7/4		30	10.8	32.38	0	0	0	70	50	0	0	0	0	0	0		
森	7/25	9.5	0	17.8	31.75	0	0	0	80	0	0	0	0	0	50	0		
森	7/25		10	13.3	32.05	0	0	0	70	0	0	0	10	0	10	0		
森	7/25		20	9.2	32.46	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		
森	7/25		30	5.8	32.62	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0		
森	8/17	12	0	21.8	31.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0		
森	8/17		10	21.0	31.92	0	0	0	40	0	30	0	0	0	120	0		
森	8/17		20	16.7	32.62	0	0	10	10	0	0	0	0	0	50	0		
森	8/17		30	11.4	32.54	0	0	10	20	0	0	0	10	0	30	0		
森	9/20	12	0	24.4	30.79	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0		
森	9/20		10	24.0	31.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0		
森	9/20		20	19.9	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0		
森	9/20		30	10.3	32.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	10/15	11.5	0	19.9	32.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0		
森	10/15		10	19.9	32.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
森	10/15		20	19.9	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
森	10/15		30	19.9	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
森	11/19	9	0	12.2	33.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0		
森	11/19		10	12.7	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0		
森	11/19		20	13.1	33.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
森	11/19		30	13.0	33.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0		


付表17 噴火湾湾口部(鹿部)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況

と海洋条件		単位: 細胞/L		(計数: 函館水試調査研究部 馬場勝寿・金森誠・佐藤政俊)												
調査点	調査	透明	深度	水温	塩分	<i>Alexandrium</i> 属		<i>Dinophysis</i> 属								
2012	月日	度m	m	°C	psu	<i>A. tam.</i>	others	<i>D. for.</i>	<i>D. acu.</i>	<i>D. nor.</i>	<i>D. rot.</i>	<i>D. rud.</i>	<i>D. inf.</i>	<i>D. mit.</i>	<i>D. tri.</i>	others
鹿部	3/23	5	0	2.3	33.06	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		5	2.3	32.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		10	2.1	32.96	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		15	2.1	32.95	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		20	2.1	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		25	2.1	32.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		30	2.1	32.95	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	3/23		40	2.1	32.97	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20	8	0	4.4	32.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		5	3.6	32.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		10	4.0	33.06	0	10	0	30	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		15	2.8	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		20	3.4	33.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		25	3.4	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		30	3.4	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	4/20		40	3.2	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	5/21	9	0	9.4	31.51	0	0	0	40	20	0	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		5	8.2	31.96	0	0	0	10	20	10	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		10	6.3	32.20	0	0	0	30	20	10	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		15	5.7	32.37	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		20	5.4	32.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		25	4.7	32.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		30	3.5	32.67	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
鹿部	5/21		40	3.4	32.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	6/29	12.5	0	17.1	31.42	0	0	10	130	10	0	0	10	0	0	0
鹿部	6/29		5	14.1	31.46	0	0	0	150	10	0	0	10	0	0	0
鹿部	6/29		10	12.7	31.63	0	0	10	40	100	10	0	10	0	0	0
鹿部	6/29		15	11.6	31.92	0	0	0	20	110	0	0	10	0	0	0
鹿部	6/29		20	10.3	32.26	0	0	0	70	40	0	10	0	0	0	0
鹿部	6/29		25	9.2	32.48	0	0	0	130	80	0	0	0	0	0	0
鹿部	6/29		30	7.9	32.72	0	0	0	100	110	0	0	0	0	0	0
鹿部	6/29		40	5.9	32.67	0	0	0	30	130	0	0	0	0	0	0
鹿部	7/25	9.5	0	17.9	31.87	0	0	0	230	0	0	0	20	0	80	0
鹿部	7/25		5	14.8	32.10	0	0	0	90	0	0	0	0	0	80	0
鹿部	7/25		10	11.7	32.42	0	0	10	70	0	0	0	0	0	30	0
鹿部	7/25		15	9.8	32.80	10	0	20	80	20	0	0	0	0	0	0
鹿部	7/25		20	8.9	32.90	0	0	10	20	20	0	0	0	0	0	0
鹿部	7/25		25	8.2	32.94	0	0	0	40	50	0	0	0	0	0	0
鹿部	7/25		30	7.1	32.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	7/25		40	5.6	32.95	0	0	0	10	110	0	0	0	0	0	0
鹿部	8/22	12.5	0	23.0	32.07	0	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0
鹿部	8/22		5	22.6	32.56	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
鹿部	8/22		10	20.2	33.14	0	0	0	10	0	0	0	0	0	110	0
鹿部	8/22		15	18.0	33.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
鹿部	8/22		20	15.2	33.58	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	8/22		25	13.5	33.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
鹿部	8/22		30	11.1	33.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	8/22		40	8.7	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	9/25	13.5	0	23.2	32.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	9/25		5	23.2	32.52	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
鹿部	9/25		10	23.1	33.42	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
鹿部	9/25		15	22.9	33.51	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
鹿部	9/25		20	22.8	33.58	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
鹿部	9/25		25	22.6	33.61	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
鹿部	9/25		30	16.2	33.25	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
鹿部	9/25		40	11.5	32.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
鹿部	10/26	14	0	16.6	33.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	10/26		5	16.6	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
鹿部	10/26		10	16.6	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	10/26		15	16.5	33.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
鹿部	10/26		20	16.6	33.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
鹿部	10/26		25	16.6	33.40	0	0	0	0	0	0	0	10	0	40	0
鹿部	10/26		30	16.6	33.44	0	0	0	0	0	10	0	0	0	30	0
鹿部	10/26		40	16.0	33.68	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
鹿部	11/30	11.5	0	11.1	33.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
鹿部	11/30		5	11.1	33.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	11/30		10	11.1	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	11/30		15	11.1	33.61	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
鹿部	11/30		20	11.1	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	11/30		25	11.1	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	11/30		30	11.3	33.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿部	11/30		40	11.7	33.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表18 津軽海峡(知内)における*Dinophysis*属および*Alexandrium*属プランクトンの出現状況


と海洋条件 単位:細胞/L (計数:函館水試調査研究部 馬場勝寿・金森誠・佐藤政俊)

調査点 2012	調査 月日	透明 度m	深度 m	水温 ℃	塩分 psu	Alexandrium属		Dinophysis属									
						A. tam.	others	D. for.	D. acu.	D. nor.	D. rot.	D. rud.	D. inf.	D. mit.	D. tri.	others	
知内	1/16	21	0	8.5	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	1/16		10	8.5	33.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	1/16		20	8.5	33.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	2/28	11	0	6.5	33.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	2/28		10	6.5	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	2/28		20	6.5	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	3/19	10	0	6.6	33.87	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
知内	3/19		10	6.7	33.85	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
知内	3/19		20	6.7	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	4/11	13	0	8.0	33.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	4/11		10	8.0	33.88	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
知内	4/11		20	8.0	33.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	5/10	7	0	10.4	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	5/10		10	10.1	33.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	5/10		20	10.0	33.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	6/19	9	0	13.3	33.34	0	0	0	20	10	20	0	0	0	0	0	
知内	6/19		10	12.4	33.67	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	
知内	6/19		20	12.3	33.68	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
知内	7/18	13	0	19.4	33.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	7/18		10	11.8	34.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	7/18		20	11.1	34.22	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
知内	8/8	15	0	22.8	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	8/8		10	22.3	33.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	8/8		20	21.1	33.97	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
知内	9/7	19	0	26.1	33.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	9/7		10	25.9	33.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	9/7		20	24.7	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	10/24	13	0	17.8	33.63	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
知内	10/24		10	17.6	33.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	10/24		20	17.5	33.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	11/16	11	0	16.5	33.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	11/16		10	16.5	33.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	11/16		20	16.5	33.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	12/11	12	0	11.2	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	12/11		10	11.2	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内	12/11		20	11.2	33.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	




付図1 1980～2012年の北海道における海域別の
年間最高麻痺性毒性値(ホタテガイ, MU/g-中腸線)の経年変動

注) 1999年太平洋東部(厚岸)で養殖マガキ14.8MU/g-可食部, 2005年太平洋東部(厚岸)で
養殖マガキ14.3MU/g-可食部を記録(◎で表示)。



付図2 1980～2012年の北海道における海域別の
年間最高麻痺性毒性値(ホタテガイ, MU/g-可食部)の経年変動

注) 1999年太平洋東部(厚岸)で養殖マガキ14.8MU/g-可食部, 2005年太平洋東部(厚岸)で
養殖マガキ14.3MU/g-可食部を記録(◎で表示)。



付図2 1980～2012年の北海道における海域別の
年間最高下痢毒性値(ホタテガイ, MU/g-可食部)の経年変動