

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK8)
(函館水試担当地区)

2025年5月1日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種										備考
					At 細胞/L	Ao 細胞/L	Df 細胞/L	Da 細胞/L	Dn 細胞/L	Dt 細胞/L	Dm 細胞/L	Dc 細胞/L	Di 細胞/L	Dru 細胞/L	Dro 細胞/L		
虻田 噴火湾東部	4/22	0	6.6	32.64	330	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	6.5	32.74	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	6.4	32.77	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	6.1	33.00	120	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
		20	6.0	33.07	290	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	6.0	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鹿部 噴火湾湾口部	4/24	0	7.3	33.01	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	7.0	32.91	1,670	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
		20	6.0	33.24	1,630	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
		30	5.6	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40	5.5	33.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピーシーズ コンプレックス (旧A. tamarenseと旧A. catenellaを含む)

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンディブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジエイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロトンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当: 馬場勝寿・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報 (HK7)
(函館水試担当地区)

2025年4月25日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (°C)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種									備考
					At	Ao	Df	Da	Dn	Dt	Dm	Dc	Di	Dru	Dro	
静内 太平洋中部	4/22	0	2.6	32.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	2.5	32.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	2.7	32.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	3.3	32.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピートンズ コンプレックス (旧A. tamarenseと旧A. catenellaを含む)

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルドイ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンディブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジエイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロトンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当: 馬場勝寿・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK6)
(函館水試担当地区)

2025年4月22日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種										備考
					At	Ao	Df	Da	Dn	Dt	Dm	Dc	Di	Dru	Dro		
					細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L		
八雲 噴火湾北西部	4/18	0	7.0	30.20	40	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	6.9	32.77	210	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	6.8	32.88	580	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	6.6	32.94	90	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	6.4	32.99	40	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	6.2	33.21	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	5.9	33.26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内 津軽海峡	4/21	0	9.5	33.39	0	0	20	0	0	0	0	0	10	0	0		
		10	9.2	34.20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	9.2	34.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンDRリウム タマレンセ スピｰｼｰｽﾞ コンプレックス (旧 A. tamarense と旧 A. catenella を含む)
Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンDRリウム オステンフェルディイ
Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティイ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス アキュミナータ
Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリホス
Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ディノフィシス コウダータ
Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジエイ
Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当: 馬場勝寿・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報 (HK5)
(函館水試担当地区)

2025年4月14日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種										備考
					At	Ao	Df	Da	Dn	Dt	Dm	Dc	Di	Dru	Dro		
					細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L		
静内 太平洋中部	4/9	0	3.6	32.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10	3.3	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		20	2.7	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		30	2.5	32.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピース コンプレックス (旧A. tamarenseと旧A. catenellaを含む)
Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルディ
Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ
Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリホス
Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ディノフィシス コウダータ
Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンディブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジエイ
Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当: 夏池真史・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK4)
(函館水試担当地区)

2025年4月10日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種										備考
					At 細胞/L	Ao 細胞/L	Df 細胞/L	Da 細胞/L	Dn 細胞/L	Dt 細胞/L	Dm 細胞/L	Dc 細胞/L	Di 細胞/L	Dru 細胞/L	Dro 細胞/L		
虻田 噴火湾東部	4/2	0	5.5	33.22	140	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	5.5	33.23	110	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	5.5	33.23	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	5.5	33.22	160	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	5.5	33.23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	5.5	33.24	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
森 噴火湾南西部	4/7	0	5.6	33.33	450	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	5.4	33.23	350	0	0	50	10	0	0	0	0	0	0	0	
		20	5.3	33.27	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	5.2	33.35	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピース コンプレックス (旧A. tamarenseと旧A. catenellaを含む)

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリホス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンディブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジエイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当:夏池真史・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK3)
(函館水試担当地区)

2025年4月1日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痹性原因種		下痢性原因種										備考
					At 細胞/L	Ao 細胞/L	Df 細胞/L	Da 細胞/L	Dn 細胞/L	Dt 細胞/L	Dm 細胞/L	Dc 細胞/L	Di 細胞/L	Dru 細胞/L	Dro 細胞/L		
静内 太平洋中部	3/4	0	4.3	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	4.9	33.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	5.0	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	5.0	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
虻田 噴火湾東部	3/4	0	5.3	33.30	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	4.8	33.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	4.7	33.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	4.7	33.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	4.9	33.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	5.3	33.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲 噴火湾北西部	3/18	0	4.9	33.11	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	4.5	33.15	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	4.6	33.22	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	4.6	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	4.7	33.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	4.7	33.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	4.7	33.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
森 噴火湾南西部	3/10	0	4.8	33.33	40	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	4.5	33.39	60	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	4.5	33.43	10	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	4.5	33.43	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鹿部 噴火湾湾口部	3/24	0	5.1	33.21	290	10	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	5.1	33.20	330	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	4.9	33.28	290	10	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	4.9	33.31	140	10	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40	4.9	33.34	60	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内 津軽海峡	3/19	0	7.3	33.07	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	7.7	34.03	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	7.7	34.05	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピーシーズ コンプレックス (旧A. tamarenseと旧A. catenellaを含む)

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルドイ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンディブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジエイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロトゥンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当:夏池真史・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK2)
(函館水試担当地区)

2025年2月28日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種										備考
					At 細胞/L	Ao 細胞/L	Df 細胞/L	Da 細胞/L	Dn 細胞/L	Dt 細胞/L	Dm 細胞/L	Dc 細胞/L	Di 細胞/L	Dru 細胞/L	Dro 細胞/L		
静内 太平洋中部	2/3	0	2.1	32.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	2.1	32.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	2.3	32.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	3.2	32.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
虻田 噴火湾東部	2/3	0	4.9	33.35	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	4.9	33.40	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	4.9	33.40	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	4.9	33.41	20	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	4.9	33.41	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	5.0	33.42	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八雲 噴火湾北西部	2/17	0	4.4	33.11	20	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	4.6	33.34	50	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	4.6	33.37	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	4.7	33.40	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	4.7	33.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	4.7	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
知内 津軽海峡	2/20	0	8.9	33.82	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	8.9	34.01	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	9.0	34.02	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピーシーズ コンプレックス (旧 A. tamarense と旧 A. catenella を含む)
Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルドイ
Df=Dinophysis fortii ティノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ティノフィシス アキュミナータ
Dn=Dinophysis norvegica ティノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos ティノフィシス トリホス
Dm=Dinophysis mitra ティノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata ティノフィシス コウダータ
Di=Dinophysis infundibula ティノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ティノフィシス ルジエイ
Dro=Dinophysis rotundata ティノフィシス ロテュンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当:夏池真史・水上卓哉)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK1)
(函館水試担当地区)

2025年2月13日

函館水産試験場調査研究部

地 点	月 日	深度 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	麻痺性原因種		下痢性原因種										備考
					At 細胞/L	Ao 細胞/L	Df 細胞/L	Da 細胞/L	Dn 細胞/L	Dt 細胞/L	Dm 細胞/L	Dc 細胞/L	Di 細胞/L	Dru 細胞/L	Dro 細胞/L		
静内 太平洋中部	1/10	0	4.6	32.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	4.9	32.96	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	4.9	32.98	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	5.0	33.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
虻田 噴火湾東部	1/14	0	6.7	32.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	7.0	33.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	7.1	33.77	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	7.1	33.77	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	7.0	33.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	7.0	33.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八雲 噴火湾北西部	1/23	0	6.1	33.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	6.1	33.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	6.3	33.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	6.3	33.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	6.3	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	6.3	33.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	6.3	33.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知内 津軽海峡	1/23	0	10.1	33.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	10.0	33.85	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20	10.0	33.85	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense species complex アレキサンドリウム タマレンセ スピーシーズ コンプレックス (旧 A. tamarense と旧 A. catenella を含む)

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサンドリウム オステンフェルドイ

Df=Dinophysis fortii テイノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata テイノフィシス アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica テイノフィシス ノルウェジカ, Dt= Dinophysis tripos テイノフィシス トリホス

Dm=Dinophysis mitra テイノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudata テイノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula テイノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei テイノフィシス ルジエイ

Dro=Dinophysis rotundata テイノフィシス ロテュンダータ

過去の知見から、噴火湾のホタテガイの麻痺性貝毒毒性値上昇の暫定的な注意喚起水準をAtが50細胞/L、警戒喚起水準をAtが100細胞/L以上出現したときとして、注意喚起水準を超えた場合には太字で、警戒喚起水準を超えた場合には赤太字で表中に示します。

(担当:夏池真史・水上卓哉)