

令和 7 年度 定期作況報告

(6 月 2 0 日現在)

北海道立総合研究機構 農業研究本部

畜産試験場

I 気 象 概 況

5月下旬：気温は13.3℃（平年差－1.4℃）で平年よりやや低かった。降水量は33.0mm（平年比117%）、日照時間は75.7時間（平年比103%）で、いずれも平年並であった。

6月上旬：気温は16.2℃（平年差＋1.7℃）で平年よりやや高かった。降水量は8.0mm（平年比21%）で平年よりかなり少なかった。日照時間は61.4時間（平年比111%）で平年並であった。

6月中旬：気温は19.9℃（平年差＋4.4℃）で平年よりかなり高かった。降水量は28.5mm（平年比73%）で平年並であった。日照時間は83.8時間（平年比193%）で平年よりかなり多かった。

以上のことから、本期間は平年と比較して気温はかなり高く、降水量はやや少なく、日照時間はかなり多かった。

	5月下旬			6月上旬			6月中旬		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温（℃）	13.3	14.7	△1.4	16.2	14.5	1.7	19.9	15.5	4.4
最高気温（℃）	19.8	20.6	△0.8	23.1	20.5	2.6	26.6	20.4	6.2
最低気温（℃）	6.7	8.6	△1.9	9.2	9.1	0.1	13.5	11.3	2.2
降 水 量（mm）	33.0	28.1	4.9	8.0	38.3	△30.3	28.5	39.1	△10.6
降水日数（日）	5.0	4.5	0.5	3.0	4.2	△1.2	4.0	3.7	0.3
日照時間(時間)	75.7	73.4	2.3	61.4	55.1	6.3	83.8	43.5	40.3

注 1) 各数値は旬の平均または合計。△は減を示す。

注 2) 平年値は前10か年の平均値。

Ⅱ 作 況

1. 牧草 採草型チモシー（1 番草）

作 況：やや良

事 由：出穂始は、2、3 年目草地の平均で6 月 12 日と平年より 1 日遅かった。1 番草収穫時の草丈は平年並であった。1 番草の乾物収量は、平年比が2 年目草地で97%、3 年目草地で121%と多かったが、2、3 年目草地の平均では108%と平年より 8%多かった。

以上のことから、目下の作況は「やや良」である。

調査項目	2年目草地			3年目草地		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較
出穂始 (月. 日)	6.13	6.11	2	6.11	6.11	0
1 番草収穫日 (月. 日)	6.16	6.14	2	6.16	6.14	2
収穫時草丈 (cm)	108	114	△ 6	108	107	1
生草収量 (kg/10a)	3,785	3,754	31	3,593	3,212	381
乾物率 (%)	18.2	18.9	△ 0.7	21.2	19.6	1.6
乾物収量 (kg/10a)	688.9	706.7	△ 17.8	761.3	630.0	131.3
同上平年比 (%)	97	100	△ 3	121	100	21

注 1) 平年値は2年目草地が前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値、3年目草地は前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

2. サイレージ用とうもろこし

作 況：良

事 由：播種期は平年より 8 日早い5 月 9 日、発芽期は平年より 10 日早い5 月 18 日であった。6 月 20 日現在の草丈は平年値より 29cm 高い63cm、葉数は平年値より 1.2 枚多い7.7 枚であった。対平年差は草丈および葉数とも標準偏差を上回った。

以上のことから、目下の作況は「良」である。

調査項目	本年	平年	比較
播種期 (月. 日)	5. 9	5.17	△ 8
発芽期 (月. 日)	5.18	5.28	△ 10
草丈 (cm)	63	34	29
葉数 (枚)	7.7	6.5	1.2

注 1) 平年値は前7カ年のうち最豊年(令和2年)と最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。

注 2) △は減または早を示す。

注 3) 供試品種は「KD320」。