

# 令和7年度 定期作況報告

(8月20日現在)

北海道立総合研究機構 農業研究本部  
畜産試験場

## I 気 象 概 況

7月下旬：気温は25.3℃（平年差+3.5℃）で平年よりかなり高かった。降水量は77.0mm（平年比175%）で平年よりやや多かった。日照時間は59.5時間（平年比137%）で平年よりかなり多かった。

8月上旬：気温は23.2℃（平年差+1.7℃）で平年よりやや高かった。降水量は25.5mm（平年比41%）で平年よりやや少なかった。日照時間は27.6時間（平年比75%）で平年よりやや少なかった。

8月中旬：気温は23.4℃（平年差+3.8℃）で平年よりかなり高かった。降水量は46.5mm（平年比51%）で平年よりやや少なかった。日照時間は63.7時間（平年比204%）で平年よりかなり多かった。

以上のことから、本期間は平年と比較して気温はかなり高く、降水量はやや少なく、日照時間はかなり多かった。

|           | 7月下旬 |      |      | 8月上旬 |      |       | 8月中旬 |      |       |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
|           | 本年   | 平年   | 比較   | 本年   | 平年   | 比較    | 本年   | 平年   | 比較    |
| 平均気温（℃）   | 25.3 | 21.8 | 3.5  | 23.2 | 21.5 | 1.7   | 23.4 | 19.6 | 3.8   |
| 最高気温（℃）   | 30.1 | 26.6 | 3.5  | 27.9 | 26.4 | 1.5   | 29.4 | 24.2 | 5.2   |
| 最低気温（℃）   | 21.6 | 18.0 | 3.6  | 20.1 | 17.7 | 2.4   | 18.4 | 16.1 | 2.3   |
| 降 水 量（mm） | 77.0 | 44.0 | 33.0 | 25.5 | 61.8 | △36.3 | 46.5 | 90.9 | △44.4 |
| 降水日数（日）   | 6.0  | 4.9  | 1.1  | 9.0  | 4.7  | 4.3   | 6.0  | 6.4  | △0.4  |
| 日照時間（時間）  | 59.5 | 43.4 | 16.1 | 27.6 | 36.6 | △9.0  | 63.7 | 31.2 | 32.5  |

注1) 各数値は旬の平均または合計。△は減を示す。

注2) 平年値は前10か年の平均値。

## Ⅱ 作 況

### 1. 牧草 採草型チモシー

2 番 草 作 況 : 不良

3 番 草 作 況 : やや不良

事 由 :

<2 番草>

収穫時の草丈は、2 年目草地で平年よりやや低く、3 年目草地で低かった。2 番草の乾物収量は、対平年比が2 年目草地で72%、3 年目草地で68%、2、3 年目草地の平均では70%であった。

以上のことから、2 番草の作況は「不良」である。

<3 番草>

8 月 20 日現在の草丈は、2 年目草地で平年並、3 年目草地で平年よりやや低く、2、3 年目草地の平均ではやや低かった。

以上のことから、3 番草の目下の作況は「やや不良」である。

| 調査項目               | 2年目草地 |       |        | 3年目草地 |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
|                    | 本年    | 平年    | 比較     | 本年    | 平年    | 比較     |
| 2番草収穫日(月・日)        | 8.6   | 8.4   | 2      | 8.6   | 8.4   | 2      |
| 生育日数 (日)           | 51    | 51    | 0      | 51    | 51    | 0      |
| 収穫時草丈 (cm)         | 63    | 76    | △ 13   | 57    | 74    | △ 17   |
| 生草収量 (kg/10a)      | 543   | 965   | △ 422  | 601   | 839   | △ 238  |
| 乾物率 (%)            | 26.1  | 20.9  | 5.2    | 20.4  | 22.3  | △ 1.9  |
| 乾物収量 (kg/10a)      | 141.6 | 195.4 | △ 53.8 | 122.5 | 181.1 | △ 58.6 |
| 同上平年比 (%)          | 72    | 100   | △ 28   | 68    | 100   | △ 32   |
| 1～2番草通算            |       |       |        |       |       |        |
| 乾物収量 (kg/10a)      | 830.5 | 902.1 | △ 71.6 | 883.8 | 811.1 | 72.7   |
| 同上平年比 (%)          | 92    | 100   | △ 8    | 109   | 100   | 9      |
| 3番草草丈 (cm) (8月20日) | 36    | 38    | △ 2    | 29    | 35    | △ 6    |

注 1) 平年値は2年目草地が前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値、3年目草地は前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

2. サイレージ用とうもろこし

作 況：やや良

事 由：

本年の雄穂開花期は平年より 13 日早い 7 月 17 日、絹糸抽出期は平年より 11 日早い 7 月 17 日であった。  
8 月 20 日現在、葉数は 16.3 枚で平年並、稈長は平年より 23cm 高い 259cm であった。

以上のことから、目下の作況は「やや良」である。

| 調査項目       | 本年   | 平年   | 比較    |
|------------|------|------|-------|
| 雄穂開花期（月．日） | 7.17 | 7.30 | △ 13  |
| 絹糸抽出期（月．日） | 7.17 | 7.28 | △ 11  |
| 稈 長（cm）    | 259  | 236  | 23    |
| 葉 数（枚）     | 16.3 | 16.6 | △ 0.3 |

注 1) 平年値は前7カ年のうち最豊年(令和2年)と最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。  
2) △は減または早を示す。  
3) 供試品種は「KD320」。