

令和8年度 定期作況報告

(7月20日現在)

北海道立総合研究機構 農業研究本部
畜産試験場

I 気 象 概 況

6月下旬：気温は16.0℃（平年差-1.9℃）で平年よりやや低かった。降水量は66.0mm（平年比153%）で平年よりやや多かった。日照時間43.2時間（平年比84%）で平年並であった。

7月上旬：気温は18.4℃（平年差-1.2℃）で平年よりやや低かった。降水量は32.5mm（平年比77%）で平年並であった。日照時間は33.9時間（平年比76%）で平年よりやや少なかった。

7月中旬：気温は22.6℃（平年差+2.4℃）で平年よりかなり高かった。降水量は175.5mm（平年449%）で平年よりかなり多かった。日照時間は27.4時間（平年比75%）で平年よりやや少なかった。

以上のことから、本期間は平年と比較して気温は並、降水量はかなり多く、日照時間はかなり少なかった。

	6月下旬			7月上旬			7月中旬		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温（℃）	16.0	17.9	△1.9	18.4	19.6	△1.2	22.6	20.2	2.4
最高気温（℃）	21.7	23.1	△1.4	24.1	24.5	△0.4	27.3	25.1	2.2
最低気温（℃）	12.2	13.2	△1.0	14.6	15.4	△0.8	19.0	16.4	2.6
降 水 量（mm）	66.0	43.1	22.9	32.5	42.1	△9.6	175.5	39.1	136.4
降水日数（日）	6.0	4.5	1.5	4.0	4.8	△0.8	6.0	5.8	0.2
日照時間（時間）	43.2	51.4	△8.2	33.9	44.9	△11.0	27.4	36.4	△9.0

注1．各数値は旬の平均または合計。△印は減を示す。

注2．平年値は前10か年の平均値。

Ⅱ 作 況

1. 牧草 採草型チモシー（2 番草）

作 況：2 番草 良

事 由：7 月 20 日現在の草丈は、平年と比べ 2 年目草地、3 年目草地ともに高かった。2 年目草地については、前年 5 月 13 日に播種したものの高温の影響により定着しなかったため、平年よりも 103 日遅い 8 月 22 日に再播種を行った。このため、個体サイズが平年と比べ小さく、収量が 3 年目草地より少なかった。これらを踏まえ、2 年目草地は参考値とし、作況の判断は 3 年目草地に基づいて行うものとする。

以上のことから、目下の 2 番草の作況は「良」である。

調査項目	2年目草地			3年目草地		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較
草丈（cm）（7月20日）	72	46	26	77	44	33
生育日数（日）	39	35	4	40	35	5

注 1) 平年値は 2 年目草地が前 7 カ年のうち最豊年（令和 2 年）及び最凶年（令和 1 年）を除く 5 カ年の平均値、
3 年目草地は前 7 カ年のうち最豊年（令和 2 年）及び最凶年（令和 1 年）を除く 5 カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

2. サイレージ用とうもろこし

作 況：並

事 由：7 月 20 日現在の草丈は、平年より 37cm 高い 253cm、葉数は 0.1 枚少ない 14.7 枚であった。草丈は平年比 117%と順調な生育が認められたが、播種日が平年より早かったことにより、生育が進んだと考えられた。

以上のことから、目下の作況は「並」である。

調査項目	本年	平年	比較
草丈（cm）	253	216	37
葉数（枚）	14.7	14.8	△ 0.1

注 1) 平年値は前 7 カ年のうち最豊年（令和 2 年）と最凶年（令和 1 年）を除く 5 カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

3) 供試品種は「KD320」。