

令和8(2026)年度 十勝農試 定期作況報告 ばれいしょ

月	作況	事由
6月20日	平年並	植付期は平年より3日早く、萌芽期は平年より1～2日早かった。茎長は平年並であり、茎数は「男爵薯」が平年を上回り、「トヨシロ」が平年を下回っている。 以上のことから、現在の作況は平年並である。
7月20日	良	開花始は平年並～3日早かった。茎長は平年並～やや下回っている。6月下旬および7月中旬の降水量が平年より多かったため、上いも重は「男爵薯」が平年比183%、「トヨシロ」が同138%と平年を上回っている。 以上のことから、現在の作況は良である。
8月20日	良	8月上旬～中旬の降水量が少なく、最高気温が高く経過したことから、枯凋期は平年より6～10日早かった。収穫期の平年値と比較して、「男爵薯」では、上いもの平均重は軽かったが、上いも数が多かったことから、上いも重は平年比115%と上回った。でん粉価は平年より0.5ポイント低かった。「トヨシロ」では、上いも数が平年並で、上いもの平均重が重かったことから、上いも重は平年比127%と上回った。でん粉価は平年より0.8ポイント高かった。 以上のことから、現在の作況は良である。
11月20日		

生育データ

品種名		男爵薯			トヨシロ		
項目／年次		本年	平年	比較	本年	平年	比較
植付期(月日)		5.7	5.10	△ 3	5.7	5.10	△ 3
萌芽期(月日)		5.27	5.29	△ 2	5.29	5.30	△ 1
開花始(月日)		6.22	6.25	△ 3	6.26	6.26	0
枯凋期(月日)		8.9	8.19	△ 10	8.20	8.26	△ 6
茎長 (cm)	6月20日	30.2	28.4	1.8	22.7	26.5	△ 3.8
	7月20日	46.5	51.9	△ 5.4	67.0	65.6	1.4
	8月20日	46.5	52.5	△ 6.0	67.3	67.1	0.2
茎数 (本/株)	6月20日	5.4	4.4	1.0	2.5	3.2	△ 0.7
	7月20日	5.4	4.7	0.7	2.6	3.3	△ 0.7
7月20日	上いも重(kg/10a)	4,159	2,272	1,887	3,885	2,807	1,078
8月20日	上いも重(kg/10a)	4,534	3,965	569	5,395	4,247	1,148
	同上平年比(%)	114	100	14	127	100	27
	でん粉価(%)	13.7	14.2	△ 0.5	16.4	15.9	0.5
収穫期	上いも数(個/株)	15.9	12.6	3.3	10.9	10.5	0.4
	上いもの平均重(g)	64	71	△ 7	112	93	19
	上いも重(kg/10a)	4,534	3,936	598	5,395	4,245	1,150
	中以上いも重(kg/10a)	3,342	2,909	433	5,013	3,687	1,326
	でん粉価(%)	13.7	14.2	△ 0.5	16.4	15.6	0.8
平年比(%)	上いも重	115	100	15	127	100	27

備考1) 平年値は、前7か年中、令和5年(豊作年)および令和6年(凶作年)を除く5か年平均である。

2) △は平年より早、少、短、軽、低を表す。

耕種概要

一区面積 (m ²)	区制	前作物	畦幅 (cm)	株間 (cm)	株数 (株/10a)	植付日 (月日)
18	3	えん麦 野生種	75	30	4,444	5.7
施肥量(kg/10a)						
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	堆肥	その他	
8	20	14	5	3,000	なし	