令和8（2026）年度　十勝農試 定期作況報告　ばれいしょ

月	作況	事由
6月20日	平年並	植付期は平年より3日早く、萌芽期は平年より1～2日早かった。茎長は平年並であり、茎数は「男爵薯」が平年を上回り、「トヨシロ」が平年を下回っている。 以上のことから、現在の作況は平年並である。
7月20日	良	開花始は平年並～3日早かった。茎長は平年並～やや下回っている。6月下旬および7月中旬の降水量が平年より多かったため、上いも重は「男爵薯」が平年比183%、「トヨシロ」が同138%と平年を上回っている。 以上のことから、現在の作況は良である。
8月20日	良	8月上旬～中旬の降水量が少なく、最高気温が高く経過したことから、枯凋期は平年より6～10日早かった。収穫期の平年値と比較して、「男爵薯」では、上いもの平均重は軽かったが、上いも数が多かったことから、上いも重は平年比115%と上回った。でん粉価は平年より0.5ポイント低かった。「トヨシロ」では、上いも数が平年並で、上いもの平均重が重かったことから、上いも重は平年比127%と上回った。でん粉価は平年より0.8ポイント高かった。 以上のことから、現在の作況は良である。
11月20日	良	植付期は平年より3日早く、萌芽期は平年より1～2日早かった。開花始は平年並～3日早かった。茎長は、平年並～やや下回った。6月下旬および7月中旬の降水量が平年より多かったことから塊茎の肥大は順調に進んだ。8月上旬～中旬の降水量が少なかったことから、枯凋期は平年より6～10日早かった。 「男爵薯」では、上いもの平均重は軽かったが、上いも数が多かったことから、上いも重は平年比115%と上回った。でん粉価は平年より0.5ポイント低かった。「トヨシロ」では、上いも数が平年並で、上いもの平均重が重かったことから、上いも重は平年比127%と上回った。でん粉価は平年より0.8ポイント高かった。 以上のことから、本年の作況は良である。

生育データ

品種名			男爵薯			トヨシロ		
項目／年次			本年	平年	比較	本年	平年	比較
植付期(月日)			5.7	5.10	△ 3	5.7	5.10	△ 3
萌芽期(月日)			5.27	5.29	△ 2	5.29	5.30	△ 1
開花始(月日)			6.22	6.25	△ 3	6.26	6.26	0
枯凋期(月日)			8.9	8.19	△ 10	8.20	8.26	△ 6
茎長 (cm)		6月20日	30.2	28.4	1.8	22.7	26.5	△ 3.8
		7月20日	46.5	51.9	△ 5.4	67.0	65.6	1.4
		8月20日	46.5	52.5	△ 6.0	67.3	67.1	0.2
茎数 (本/株)		6月20日	5.4	4.4	1.0	2.5	3.2	△ 0.7
		7月20日	5.4	4.7	0.7	2.6	3.3	△ 0.7
7月20日	上いも重(kg/10a)		4,159	2,272	1,887	3,885	2,807	1,078
8月20日	上いも重(kg/10a)		4,534	3,965	569	5,395	4,247	1,148
	同上平年比(%)		114	100	14	127	100	27
	でん粉価(%)		13.7	14.2	△ 0.5	16.4	15.9	0.5
収穫期	上いも数(個/株)		15.9	12.6	3.3	10.9	10.5	0.4
	上いもの平均重(g)		64	71	△ 7	112	93	19
	上いも重(kg/10a)		4,534	3,936	598	5,395	4,245	1,150
	中以上いも重(kg/10a)		3,342	2,909	433	5,013	3,687	1,326
	でん粉価(%)		13.7	14.2	△ 0.5	16.4	15.6	0.8
平年比(%)	上いも重		115	100	15	127	100	27

備考1）平年値は、前7か年中、令和5年（豊作年）および令和6年（凶作年）を除く5か年平均である。
2）△は平年より早、少、短、軽、低を表す。

耕種概要

一区面積 (㎡)	区制	前作物	畦幅 (cm)	株間 (cm)	株数 (株/10a)	植付日 (月日)
18	3	えん麦 野生種	75	30	4,444	5.7

施肥量（kg／10a）					
N	P_2O_5	K_2O	MgO	堆肥	その他
8	20	14	5	3,000	なし