

令和7(2025)年度 十勝農試 定期作況報告 ばれいしょ

| 月      | 作況  | 事由                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6月20日  | やや良 | 植付期は平年より2日早く、萌芽期は1日遅かった。萌芽後、6月上中旬の気温は平年より高かったため、茎長は平年を上回っている。また、茎数も平年を上回っている。<br>以上のことから、現在の作況はやや良である。                                                                                                                                       |
| 7月20日  | 平年並 | 開花始は平年より4～6日早かった。6月下旬～7月中旬の降水量が平年より少なかったため、茎長は平年をやや下回っている。上いも重は、「男爵薯」が平年比96%、「トヨシロ」が同104%であり、平年並である。<br>以上のことから、現在の作況は平年並である。                                                                                                                |
| 8月20日  | 平年並 | 6月上旬以降の気温が平年より高く経過したことから、「男爵薯」では、枯凋期が平年より4日早かった。上いも重は、「男爵薯」が平年比105%、「トヨシロ」が同102%であり、平年並である。でん粉価は平年と比べて、「男爵薯」が3.1ポイント、「トヨシロ」が2.2ポイント低い。<br>以上のことから、現在の作況は平年並である。                                                                              |
| 9月20日  | 平年並 | 6月上旬以降の気温が平年より高く経過したことから、「トヨシロ」の枯凋期は平年より4日早かった。「男爵薯」では、上いも数が平年よりやや多く、上いもの平均重は平年並であったため、上いも重は平年比106%とやや上回った。でん粉価は平年より3.0ポイント低かった。「トヨシロ」では、上いも数は平年より少なく、上いもの平均重は平年より重かったため、上いも重は平年比103%と平年並であった。でん粉価は平年より1.5ポイント低かった。<br>以上のことから、現在の作況は平年並である。 |
| 11月20日 |     |                                                                                                                                                                                                                                              |

生育データ

| 品種名         |                | 男爵薯   |       |       | トヨシロ  |       |        |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 項目／年次       |                | 本年    | 平年    | 比較    | 本年    | 平年    | 比較     |
| 植付期(月日)     |                | 5.8   | 5.10  | △ 2   | 5.8   | 5.10  | △ 2    |
| 萌芽期(月日)     |                | 5.30  | 5.29  | 1     | 5.31  | 5.30  | 1      |
| 開花始(月日)     |                | 6.23  | 6.27  | △ 4   | 6.22  | 6.28  | △ 6    |
| 枯凋期(月日)     |                | 8.16  | 8.20  | △ 4   | 8.23  | 8.27  | △ 4    |
| 茎長<br>(cm)  | 6月20日          | 35.0  | 24.8  | 10.2  | 33.7  | 22.5  | 11.2   |
|             | 7月20日          | 45.4  | 51.9  | △ 6.5 | 55.8  | 66.9  | △ 11.1 |
|             | 8月20日          | 46.6  | 52.8  | △ 6.2 | 55.4  | 68.4  | △ 13.0 |
| 茎数<br>(本/株) | 6月20日          | 4.9   | 4.3   | 0.6   | 3.5   | 3.0   | 0.5    |
|             | 7月20日          | 5.0   | 4.5   | 0.5   | 3.8   | 3.1   | 0.7    |
| 7月20日       | 上いも重(kg/10a)   | 2,210 | 2,314 | △ 104 | 2,849 | 2,732 | 117    |
| 8月20日       | 上いも重(kg/10a)   | 4,084 | 3,907 | 177   | 4,249 | 4,155 | 94     |
|             | 同上平年比(%)       | 105   | 100   | 5     | 102   | 100   | 2      |
|             | でん粉価(%)        | 12.0  | 15.1  | △ 3.1 | 14.3  | 16.5  | △ 2.2  |
| 収穫期         | 上いも数(個/株)      | 13.1  | 12.1  | 1.0   | 9.5   | 10.7  | △ 1.2  |
|             | 上いもの平均重(g)     | 70    | 72    | △ 2   | 102   | 89    | 13     |
|             | 上いも重(kg/10a)   | 4,084 | 3,849 | 235   | 4,306 | 4,173 | 133    |
|             | 中以上いも重(kg/10a) | 3,139 | 2,899 | 240   | 3,927 | 3,598 | 329    |
|             | でん粉価(%)        | 12.0  | 15.0  | △ 3.0 | 14.5  | 16.0  | △ 1.5  |
| 平年比(%)      | 上いも重           | 106   | 100   | 6     | 103   | 100   | 3      |

備考1) 平年値は、前7か年中、令和5年(豊作年)および令和6年(凶作年)を除く5か年平均である。

2) △は平年より早、少、短、軽、低を表す。

耕種概要

| 一区面積<br>(㎡) | 区制                            | 前作物              | 畦幅<br>(cm) | 株間<br>(cm) | 株数<br>(株/10a) | 植付日<br>(月日) |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 18          | 3                             | えん麦<br>野生種       | 75         | 30         | 4,444         | 5.8         |
| 施肥量(kg/10a) |                               |                  |            |            |               |             |
| N           | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO        | 堆肥         | その他           |             |
| 8           | 20                            | 14               | 5          | 3,000      | なし            |             |